

विषय - गणित

Subject - Mathematics

मुद्रित: 100

समय: 3 घण्टे

सामान्य निर्देश:

- (i) सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
- (ii) इस प्रश्न-पत्र में 29 प्रश्न हैं जो चार खण्ड में विभाजित हैं:
अ. छ, स, तथा द। खण्ड अ में 4 प्रश्न हैं जिनमें से प्रत्येक
एक अंक छा है। खण्ड ब में 8 प्रश्न हैं जिनमें से प्रत्येक दो
अंक छा है। खण्ड स में 11 प्रश्न हैं जिनमें से प्रत्येक चार अंक
छा है। खण्ड द में 6 प्रश्न हैं जिनमें से प्रत्येक छः अंक छा है।
- (iii) खण्ड अ में सभी प्रश्नों के उत्तर एक शाठद, एक वाक्य अथवा
प्रश्न की आवध्यपूतानुसार दिए जा सकते हैं।
- (iv) पुरी प्रश्न-पत्र में विडल्प नहीं है, परीभी चार अंक वाले
3 प्रश्नों में तथा हः अंक वाले 3 प्रश्नों में आन्तरिक विडल्प हैं।
सभी प्रश्नों से से आपको एक ही विडल्प हल ढूँढ़ा है।
- (v) कलेक्युलेटर का उपयोग की अनुमति नहीं है।

General Instructions:

- (i) All questions are compulsory.
- (ii) The question paper consists of 29 questions divided into four sections A, B, C and D. Section A comprises of 4 questions of one mark each, Section B comprises of 8 questions of two marks each, Section C comprises of 11 questions of three marks each and Section D comprises of 6 questions of six marks each.

- (iii) All questions in section A are to be answered in one word, one sentence or as per the exact requirement of the question.
- (iv) There is no overall choice, However, internal choice has been provided in 3 questions of four marks each and 2 questions of six marks each. You have to attempt only one of the alternatives in all such questions.
- (v) Use of calculators is not permitted.

प्र० ३

SECTION - A

प्रश्न संख्या १ से ५ तक प्रत्येक प्रश्न १ अंक का है।

Question numbers 1 to 5 carry 1 mark each.

1. 2×2 कोटि के इस आव्यूह की जुल वितरी संख्या दोनों जिनकी प्रत्येक प्रविल ० या १ है?

The number of all possible matrices of order 2×2 with each entry 0 or 1 is ?

2. $\int \frac{1}{x^2+16} dx$ का मान निकाल।

write the value of $\int \frac{1}{x^2+16} dx$

3. निम्न अवधार एमीक्टर के लिए इसकी कोटि व घात का मानगणना कीजिए।

$$\left(\frac{ds}{dt}\right)^4 + 3 s \frac{d^3 s}{dt^3} = 0$$

Find the sum of the degree and the order for the following differential equation.

$$\left(\frac{ds}{dt}\right)^4 + 3 s \frac{d^3 s}{dt^3} = 0$$

4. सदिश $5\hat{i} - 5\hat{j} + 2\hat{k}$ के अनुदिश एक ऐसा सदिश सात अंक के जिसके परिमात्र 8 इकाई है।

Find a vector in the direction of vector $5\hat{i} - 5\hat{j} + 2\hat{k}$ which has magnitude 8 units.

2905-व
SECTION B

प्रश्न संख्या 5 से 12 तक प्रश्नों के उत्तर 2 मार्क हैं।
Question numbers 5 to 12 carry 2 marks each.

5. सिद्ध करें कि :

$$\tan^{-1} \frac{2}{11} + \tan^{-1} \frac{7}{24} = \tan^{-1} \frac{1}{2}$$

Prove that :

$$\tan^{-1} \frac{2}{11} + \tan^{-1} \frac{7}{24} = \tan^{-1} \frac{1}{2}$$

6.

$$\begin{vmatrix} a-b & b-c & c-a \\ b-c & c-a & a-b \\ c-a & a-b & b-c \end{vmatrix} \text{ का मान ज्ञात कीजिए।}$$

Find the value of

$$\begin{vmatrix} a-b & b-c & c-a \\ b-c & c-a & a-b \\ c-a & a-b & b-c \end{vmatrix}$$

7.

$$\text{फला } f(x) = \begin{cases} Kx+1, & \text{यदि } x \leq 5 \\ 3x-5, & \text{यदि } x > 5 \end{cases}$$

द्वाया परिभासित फला $x=5$ पर संतुत है, तो
K का मान ज्ञात कीजिए।

Find the value of K for which the function f is
defined as $f(x) = \begin{cases} Kx+1, & \text{if } x \leq 5 \\ 3x-5, & \text{if } x > 5 \end{cases}$

is continuous at $x=5$

8. यदि $x = \sin t$, $y = \cos 2t$ तो $\frac{dy}{dx}$ नात दीजिए।

Find $\frac{dy}{dx}$, if $x = \sin t$, $y = \cos 2t$.

9. पूर्णांक दीजिए :

$$\int \frac{\cos 2x}{(\cos x + \sin x)^2} dx$$

Evaluate :

$$\int \frac{\cos 2x}{(\cos x + \sin x)^2} dx$$

10. विंड का ले गुजरने वाले एक रेत वक्र असीमित नात दीजिए जिसका अक्षाय लम्फीकरण $\frac{dy}{dx} = x^2 + 1$, $x dy = (2x^2 + 1) dx$ ($x \neq 0$) है।

Find the equation of a curve passing through the point (1,1) and whose differential equation is $\frac{dy}{dx} = x^2 + 1$. $x dy = (2x^2 + 1) dx$ ($x \neq 0$)

11. दो समतलों $3x - 6y + 2z = 7$ और $2x + 2y - 2z = 5$ के बीच का अंतर नात दीजिए।

Find the angle between the two planes $3x - 6y + 2z = 7$ and $2x + 2y - 2z = 5$.

12. A और B दो घटनाएँ हैं जो $\frac{1}{2}$ के जएँ
 $P(A) = \frac{1}{2}$, $P(A \cup B) = \frac{3}{5}$ तथा $P(B) = k$ तो k

05 मान सात और यदि घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं।

Given that the events A and B are such that

$P(A) = \frac{1}{2}$, $P(A \cup B) = \frac{3}{5}$ and $P(B) = K$. Find K if they are mutually exclusive.

2005- स

SECTION - C

प्रश्न संख्या 13 से 23 तक प्रत्येक प्रश्न के 4 अंक हैं।

Question number 13 to 23 carry 4 marks each.

- 13 यदि विहीन फल $A = \{x \in \mathbb{Z} : 0 \leq x \leq 12\}$ तथा $R = \{(a,b) : |a-b| \text{ } \text{is a multiple of } 3\}$ हो तो इसका प्रत्येक संबंध R के तुल्यता संबंध है। 1 से संबंधित सभी अवयवों का लिस्ट बनाओ।

अश्वार

यदि $f(x) = \frac{4x+3}{6x-4}$, $x \neq \frac{2}{3}$, तो यह विहीन विस्तृत $x \neq \frac{2}{3}$ के लिए $f(f(x)) = x$ है। f का उत्तिलोम उत्तर प्राप्त हो?

Show that the relation R in the set $A = \{x \in \mathbb{Z} : 0 \leq x \leq 12\}$ given by $R = \{(a,b) : |a-b| \text{ is a multiple of } 4\}$, is an equivalence relation. Find the set of all elements related to 1 in each case.

OR

If $f(x) = \frac{4x+3}{6x-4}$, $x \neq \frac{2}{3}$, show that $f(f(x)) = x$,
for all $x \neq \frac{2}{3}$. What is the inverse of f ?

14. $\tan^{-1}\left(\frac{\cos x}{1-\sin x}\right)$, $-\frac{3\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ of इतना रूप में दर्शाएँ।

उत्तर

मानि $\tan^{-1}\frac{x-1}{x+2} + \tan^{-1}\frac{x+1}{x+2} = \frac{\pi}{4}$ तो x का मान
सात दर्शाएँ।

Express $\tan^{-1}\frac{\cos x}{1-\sin x}$; $-\frac{3\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ in the
simplest form.

OR

If $\tan^{-1}\frac{x-1}{x+2} + \tan^{-1}\frac{x+1}{x+2} = \frac{\pi}{4}$, then find the value of x .

15. मानि x, y, z फॉर्म एँ जिके $\Delta = \begin{vmatrix} x & x^2 & 1+x^3 \\ y & y^2 & 1+y^3 \\ z & z^2 & 1+z^3 \end{vmatrix} = 0$
तो दर्शाएँ कि $1+xyz=0$

If x, y, z one different and $\Delta = \begin{vmatrix} x & x^2 & 1+x^3 \\ y & y^2 & 1+y^3 \\ z & z^2 & 1+z^3 \end{vmatrix} = 0$,

then Show that $1+xyz=0$

16. मानि $y = x^{\sin x} + (\sin x)^{\cos x}$ एवं तो $\frac{dy}{dx}$ दर्शाएँ।

If $y = x^{\sin x} + (\sin x)^{\cos x}$ then find $\frac{dy}{dx}$.

17.

का अंतराल द्वारा दीजिए जिनमें $f(x) = 4x^3 - 6x^2 - 72x + 30$,
द्वाय पद्धति द्वारा (i) निम्नों वर्धमान (ii) निम्नों घटमान है।

मात्रवा

सिंह दीजिए कि यह शंकु के अंतर्गत महत्वपूर्ण
वाले ऐने वृत्तीय तंत्रों की लिज्या शंकु की लिज्या
की आधी होती है।

Find the intervals in which the function f given
by $f(x) = 4x^3 - 6x^2 - 72x + 30$ is (i) strictly increasing
(ii) strictly decreasing.

OR

Prove that the radius of the right circular cylinder
of greatest curved surface area which can be
inscribed in a given cone is half of that of the cone.

18.

द्वारा दीजिए-

$$\int e^x \left(\frac{1+\sin x}{1+\cos x} \right) dx$$

Find -

$$\int e^x \left(\frac{1+\sin x}{1+\cos x} \right) dx$$

19.

अवकल समीकरण

$$\frac{dy}{dx} + 2y \tan x = \sin x$$

का विशिष्ट इल द्वारा दीजिए, दिया इसके लिए $y=0$
मात्र $x = \frac{\pi}{3}$.

Find the particular solution of the differential equation

$$\frac{dy}{dx} + 2y \tan x = 8 \sin x$$

given that $y=0$ when $x = \frac{\pi}{3}$

20. यदि $\vec{A} = 2\hat{i} + 6\hat{j} + 2\hat{k}$ तो यदि $(2\hat{i} + 6\hat{j} + 2\hat{k}) \times (\hat{i} + \lambda\hat{j} + \mu\hat{k}) = \vec{0}$
 $= \vec{0}$

Find λ and μ if $(2\hat{i} + 6\hat{j} + 2\hat{k}) \times (\hat{i} + \lambda\hat{j} + \mu\hat{k}) = \vec{0}$

21. यदि $\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$ का, यदि वे $2\hat{i} + 4\hat{j} - 5\hat{k}$ और $\lambda\hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}$ के माध्यम से सारक यदि वे के साथ अद्वितीय त्रिकोणल तथा अवयव हैं तो λ का मान दोनों अद्वितीय।

The scalar product of the vector $\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$ with a unit vector along the sum of vectors $2\hat{i} + 4\hat{j} - 5\hat{k}$ and $\lambda\hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}$ is equal to one. Find the value of λ .

22. एक डॉक्टर को एक दोस्ती के देखते होना है। पहले के अनुभवों से यह सात है कि उसके हाल, जैसे, एक्सीज विशेषज्ञ वाणि से आने की प्रायिकता अस्त: $\frac{3}{10}, \frac{1}{5}, \frac{1}{10}$ मा $\frac{2}{5}$ है यदि वह हाल, जैसे या एक्सीज से आता है तो उसके हाल से आने की प्रायिकताएँ क्रमस्थ: $\frac{1}{3}, \frac{1}{3}$ मा $\frac{1}{2}$ हैं, ऐसे विशेषज्ञ वाणि के आने पर उसे हाल नहीं होती है। यदि वह हाल के अस्त, तो उसके हाल से आने की प्रायिकता बात अद्वितीय।

A doctor is to visit a patient. From the past experience, it is known that the probabilities that he will come by train, bus, scooter or by other means of transport are respectively $\frac{3}{10}, \frac{1}{5}, \frac{1}{10}$ and $\frac{2}{5}$. The probabilities that he will be late are $\frac{1}{4}, \frac{1}{3}$ and $\frac{1}{12}$ if he comes by train, bus and scooter respectively but if he comes by other means of transport, then he will not be late. When he arrives, he is late. What is the probability that he comes by train?

23. यदि न्याय सिक्षा की उपांति पर आठ चिठ्ठी की संख्या वा मात्र बात आयी।

Find the mean number of heads in three tosses of a fair coin.

2905 - ८

SECTION - D

प्रश्न संख्या 24 वा 29 तक उत्तेजित प्रश्न ६ अंक।
Question numbers 24 to 29 carry 6 marks each.

24. प्रारंभिक संकियां दो उपर्युक्त द्वारा निम्नलिखित मापूद का अनुकूल बात आयी-

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 5 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

By using elementary operations, find the inverse of the matrix

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 5 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

25. यदि $y = (\tan^{-1}x)^2$ तो दर्शाओ कि $(x^2+1)^2 y_2 + 2x(x^2+1) y_1 = 2$

If $y = (\tan^{-1}x)^2$, show that

$$(x^2+1)^2 y_2 + 2x(x^2+1) y_1 = 2$$

26. $\int_0^\pi \frac{x \sin x}{1+\cos^2 x} dx$ का मान ज्ञात कीजिए।

$$\text{Evaluate } \int_0^\pi \frac{x \sin x}{1+\cos^2 x} dx$$

27. परवल्प $y = x^2$ एवं $y = |x|$ से बिंदु का क्षतिपूल ज्ञात कीजिए।

मथवा

साइर्लन वा अपोग छर्ट इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष $(0,0), (2,2)$ एवं $(3,1)$ हैं।

Find the area of the region bounded by the parabola $y = x^2$ and $y = |x|$

OR

Using integration find the area of region bounded by the triangle whose vertices are $(-1, 0)$, $(1, 3)$ and $\cancel{(3, -2)}$, $(1, 0)$, $(2, 2)$ and $(3, 1)$.

28. रेखाओं ℓ_1, ℓ_2 तथा ℓ_3 के बीच की अवनति द्वारा घेरा गया क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

समिक्षा समीकरण $\frac{1}{2}$:

$$\vec{r} = \hat{i} + \hat{j} + \lambda (2\hat{i} - \hat{j} + \hat{k})$$

$$\text{तथा } \vec{r} = 2\hat{i} + \hat{j} - \hat{k} + \mu (3\hat{i} - 5\hat{j} + 2\hat{k})$$

अब यह

एक रेखा, एक तथा एक विकृत के बीच $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ के बीच की अवनति द्वारा घेरा गया क्षेत्र का क्षेत्रफल $\frac{4}{3}$ है तो सिद्ध कीजिए कि $\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma + \cos^2 \delta = \frac{4}{3}$

Find the shortest distance between the lines ℓ_1 and ℓ_2 whose vector equations are

$$\vec{r} = \hat{i} + \hat{j} + \lambda (2\hat{i} - \hat{j} + \hat{k})$$

$$\text{and } \vec{r} = 2\hat{i} + \hat{j} - \hat{k} + \mu (3\hat{i} - 5\hat{j} + 2\hat{k})$$

OR

A line makes angles α, β, γ and δ with the diagonals of a cube. Prove that

$$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma + \cos^2 \delta = \frac{4}{3}$$

29. यह प्रश्ना कि 200 g आटा तथा 25 g वसा(fat)
की आवश्यकता होती है तथा दूसरी प्रकार के केक के
लिए 100 g आटा तथा 50 g वसा की आवश्यकता होती
है। केकों की अधिकतम संख्या बताओ जो 5 kg
आटे तथा 1 kg वसा के बल सहते हैं, यदि मात्र
लिया गया है कि केकों की आवश्यकता के लिए अन्य
पदार्थों की कमी नहीं होती।

One kind of cake requires 200g of flour and
25g of fat and another kind of cake requires
100g of flour and 50g of fat. Find the
maximum number of cakes which can be made
from 5 kg of flour and 1 kg of fat assuming
that there is no shortage of the other
ingredients used in making the cakes.

==