

ഇന്ത്യ: ഭൗതികപരിസ്ഥിതി

XI



കേരളസർക്കാർ¹
വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പ്

തയാറാക്കിയത്

സംസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ ശാഖക്കുമാരം പരിശീലന സമിതി, കേരളം
2019

First Edition

March 2006 Chaitra 1928

Reprinted

June 2014

PD 45T MJ

*© National Council of Educational Research
and Training, 2006*

Rs.

Printed on 80 GSM paper

ALL RIGHTS RESERVED

- No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior permission of the publisher.
- This book is sold subject to the condition that it shall not, by way of trade, be lent, re-sold, hired out or otherwise disposed of without the publisher's consent, in any form of binding or cover other than that in which it is published.
- The correct price of this publication is the price printed on this page. Any revised price indicated by a rubber stamp or by a sticker or by any other means is incorrect and should be unacceptable.

Published by the SCERT, Thiruvananthapuram
Department of Education,
Government of Kerala
&
Printed at:
Centre for Advanced Printing and Training (C-apt),
(Government of Kerala), Thiruvananthapuram

അമൃതാവം

మాత్రాశయిప్పకటయుండ విషయాలుగా, అతఱాంగానుండయినిప్పుడు సుఖభంగానించు
ఎగువాలిగొంగాకాపడ సాంస్కారికతానిపయ్యక తిథిప్రవిష్టాలు క్రూరియాగా;
అతపుకంగాలు విశిష్టితాజుపరి మాత్రాశయ ఇవులోపాయా మాట్లాడుయి
స్థికంచ్చిరిక్కుణాత అంశయిలాకట, ఆశీర్యంలుగానిప్పుడు ప్రయాం పరీచశక
శమ్హం ప్రాణశిక్ష కొషకుల్లిత్కుప్రతి యంతపుణాతిప్పుడు సాధియాగిప్పా ఉగాయి
వరీకయాగామి ఖూబాయిప్ప సాధావస్థానింద నాయక క్రూరికల్పం మాత్రాశయాన
శాశిస్యాంగ్రామం తిథిప్రవిష్టాలు వివిధ విశిష్టానుండి అతాంగానిప్పితియిని
ప్రారంపించాలిగుండ. అంతించ అవిగా గంభీరానుపాయాగా ఇల పాఠప్రశ్నలకుడు
భ్రాంత ప్రాప్తి లక్ష్మి.

പരിശോധനക്കുത്തിയ പുസ്തകങ്ങളിൽ അക്കദർ വിജ്ഞാപ്പിലിലെ സാക്ഷ്യത്തിൽ ചാരി ഓൺ പരമാവധി ഔദ്യോഗിക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ ചിരപരിചിതമായ ഐസ്റ്റീംഗ് പദ്ധതിയാണെങ്കിലും വിവരത്തോടുകൂടി തീർത്തവും ഉഴി അഭ്യർത്ഥ പദ്ധതിയാണെങ്കിലും തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. മാത്രം അഭ്യർത്ഥ പരിക്കുന്നവർക്ക് ആക്ഷയഗ്രഹണം സ്വീകരിക്കുന്ന വിധതിലാണ് ചാരി പുസ്തക ഒരു നടത്തിയിട്ടിരുന്നത്. അതേപറ്റാക്കം ഔദ്യോഗിക്കുന്ന വളർച്ചയും ഐസ്റ്റീംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ സഹായകമാക്കുന്നുണ്ട്.

పాఠప్రశ్నలకువివరితయిన రాణియి గంగుక రాజుతు గంగు వాటిచెయిరాజు కుఱిబు కూడా లుకు ప్రమా సంచితమణానిలయిత పల పరిశీతికుష్టం పరిభోషయిత వణిక్వసాంకాం త్వాసేష్టయిత ప్రయోగతియిన వర్షమువాళాణు అందయిప్పాం క్రుష్ణతత్తు బోయువుష్టకు త్వాసును వాకుపు పక్కాశిత అందయాకు పరిశరి కుంపానిగు ఏప్పల్లు అందుపాయకూంకశికశ్చిత నిట్టాం విశీష్య అందుపక్కల విశ్రుతమికశి ఏప్పాంపిత నిట్టాం అంతిప్రాయశాస్త్రాల్లు నిట్టాంపాయశాస్త్రాల్లు ప్రతిశ్శా కుంపాం

మె.జి.ప్రసాద్

മയ്യാർക്കെൻ

കുമാർ ഇ.ആർ.ടി. കോളേജ്

FOREWORD

The National Curriculum Framework (NCF), 2005, recommends that children's life at school must be linked to their life outside the school. This principle marks a departure from the legacy of bookish learning which continues to shape our system and causes a gap between the school, home and community. The syllabi and textbooks developed on the basis of NCF signify an attempt to implement this basic idea. They also attempt to discourage rote learning and the maintenance of sharp boundaries between different subject areas. We hope these measures will take us significantly further in the direction of a child-centred system of education outlined in the National Policy on Education (1986).

The success of this effort depends on the steps that school principals and teachers will take to encourage children to reflect on their own learning and to pursue imaginative activities and questions. We must recognise that, given space, time and freedom, children generate new knowledge by engaging with the information passed on to them by adults. Treating the prescribed textbook as the sole basis of examination is one of the key reasons why other resources and sites of learning are ignored. Inculcating creativity and initiative is possible if we perceive and treat children as participants in learning, not as receivers of a fixed body of knowledge.

These aims imply considerable change in school routines and mode of functioning. Flexibility in the daily time-table is as necessary as rigour in implementing the annual calendar so that the required number of teaching days are actually devoted to teaching. The methods used for teaching and evaluation will also determine how effective this textbook proves for making children's life at school a happy experience, rather than a source of stress or boredom. Syllabus designers have tried to address the problem of curricular burden by restructuring and reorienting knowledge at different stages with greater consideration for child psychology and the time available for teaching. The textbook attempts to enhance this endeavour by giving higher priority and space to opportunities for contemplation and wondering, discussion in small groups, and activities requiring hands-on experience.

The National Council of Educational Research and Training (NCERT) appreciates the hard work done by the textbook development committee responsible for this book. We wish to thank the Chairperson of the advisory committee for textbooks in Social Sciences, at the higher secondary

level, Professor Hari Vasudevan and the Chief Advisor for this book, Professor M.H. Qurashi for guiding the work of this committee. Several teachers contributed to the development of this textbook; we are grateful to their principals for making this possible. We are indebted to the institutions and organisations which have generously permitted us to draw upon their resources, material and personnel. We are especially grateful to the members of the National Monitoring Committee, appointed by the Department of Secondary and Higher Education, Ministry of Human Resource Development under the Chairpersonship of Professor Mirnal Miri and Professor G.P. Deshpande, for their valuable time and contribution. As an organisation committed to systemic reform and continuous improvement in the quality of its products, NCERT welcomes comments and suggestions which will enable us to undertake further revision and refinement.

New Delhi
20 December 2005

Director
National Council of Educational
Research and Training

TEXTBOOK DEVELOPMENT COMMITTEE

CHAIRPERSON, ADVISORY COMMITTEE FOR TEXTBOOKS IN SOCIAL SCIENCES AT THE HIGHER SECONDARY LEVEL

Hari Vasudevan, *Professor*, Department of History, University of Calcutta, Kolkata

CHIEF ADVISOR

M. H. Qureshi, *Professor*, Centre for the Study of Regional Development, Jawaharlal Nehru University, New Delhi

MEMBERS

Aparna Pandey, *Lecturer*, DESSH, NCERT, New Delhi

Ashok Diwakar, *Lecturer*, Government P.G College, Sector 9, Gurgaon

B. S. Butola, *Professor*, Centre for the Study of Regional Development, Jawaharlal Nehru University, New Delhi

Beena Srikumar, *PGT*, CRPF Public School, New Delhi

Noor Mohammad, *Professor*, Delhi School of Economics, Delhi University, Delhi

MEMBER-COORDINATOR

Tannu Malik, *Lecturer*, DESSH, NCERT, New Delhi

പാംപുസ്തക വിവർത്തനം

ശില്പരാലയിൽ പ്രകടിതവർ

ഡോ. ആർ. അനീൽകുമാർ

കമ്പിൽ അർ ഓഫീസ് ടീച്ചർ (റിംഗ്) (റിംഗ്)

മുൻപാബ്ലിക് കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം

അംഗത്വ എൻ: ആർ.

എം.എൽ.എസ്.എൽ, ജോദ്ദേശ്

ടി.ഒ.എൽ.എസ്.എൽ, മോഴിമോട്ട്

ഡോ. ടി. നിലകുമാർ

പ്രിൻസിപ്പാർ (റിംഗ്)

എം.എൽ.എൽ, റബ. ആർട്ടി.എൽ അംഗ് സംഘർഷ് കോളേജ്
സ്പാസ്റ്റിക്കിൾ, തിരുവനന്തപുരം

ശില്പത്ത് മോഹൻ എം.

എം.എൽ.എൽ.എൽ, ജോദ്ദേശ് (രിംഗ്)

ടി.ഒ.എൽ.എസ്.എൽ, സിന്ധുദൂർ, തിരുവന-

പ്രിയ ടി.

എം.എൽ.എൽ.എൽ, ജോദ്ദേശ് (രിംഗ്)

റബ. എം.എൽ.എൽ.എൽ, സൈന്യാർ, ആപ്പല്ലേ

മുസലിം പ്രസ്താവക്കണ്ണ്

എം.എൽ.എൽ.എൽ, ജോദ്ദേശ് (രിംഗ്)

റബ. എം.എൽ.എൽ.എൽ, പദ്മാഭ്യൂത്, കമ്മുള്

രജീവ് എ. വി.

എം.എൽ.എസ്.എൽ, ജോദ്ദേശ് (രിംഗ്)

അംഗത്വ അവിസ് മോഡേജ് എം.എൽ.എൽ.

സുൽത്താൻബത്തേരി, തിരുവന-

ന്തിമുഖമൻ

എം.എൽ.എൽ.എൽ, ജോദ്ദേശ്

റബ. എം.എൽ.എൽ.എൽ, ഏഞ്ചന്റുട്ടക്ക, പാലക്കാട്

മിശ്രകുമാർ സി. ആർ.

എം.എൽ.എൽ.എൽ, ജോദ്ദേശ് (രിംഗ്)

റബ. എം.എൽ.എൽ.എൽ. രവീന്ദ്രാജൻ, എക്സ്പ്ര

ശ്രീധര് ടി.

ശാഖും എപ്പമൻ

റബ. കോട്ടേജ്, നിലമ്പുർ

കാർഡാൻ. എ. ബി.

എം.എൽ.എൽ.എൽ, ജോദ്ദേശ്

ടി.ഒ.എൽ.എൽ.എൽ, കാനകും, തിരുവനന്തപുരം


സമീറ എൻ. കെ.

എം.എൽ.എസ്.എൽ, ജോദ്ദേശ് (രിംഗ്)

സെന്റ്രോഫേഴ്സ് എം.എൽ.എസ്.എൽ, മോഴിമോട്ട്

അക്കാദമിക് കോഡിനേറ്റ്

പി.ഒ.ഒ ശാമുഖം, അന്ത്യോഗ്ര പ്രമാണം, എം.എൽ.എൽ.എൽ.



കുണ്ട്

I

അക്കമുഖം

ഈ യുണിറ്റിൽ ചർച്ചചയ്യുന്നത്:

- സ്വാദം - ലോകസാമ്പാദ മനുഷ്യരുടെ സ്വാദം എന്നീവിശദിപ്പം.



H11654

ഇന്ത്യ - സ്ഥാനം

• (1) C F C (2)

1

മനസ്യം വിവിധതരം അപകടങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നത് എൻ ഫോറ്റോ കളിൽ കണക്കാക്കുന്നതും പിത്രം 1.1-ൽ തന്നെ കണക്കാക്കുന്ന മനസ്യം ദൂരം നിന്നും കുറവായി നിലനിൽക്കുന്നത്. മനസ്യം ദൂരം ഏതൊക്കെ അദ്ധ്യാത്മാഭ്യർഥി സഭയിൽ അദ്ധ്യാത്മാഭ്യർഥി സഭക്കാരായും പരിശീലനാരായും നിലനിൽക്കുന്നതും പരിശീലനാരായും നിലനിൽക്കുന്നതും അദ്ധ്യാത്മാഭ്യർഥിക്കാർ.

இன்று வரவில் காலத்திலே முறைகளைக் கொடுக்கும் நிபுணர்யோ கிராங்க் கலைஞர்களின்போது முறைகள் படி எண்ணர் முழுமொழியையூடு வழங்கிறார்களோடு என்ற அரசுரிசை 12 ஸ்டாக்கேஷன் வைத் (ஏக்காலம் 219 கிலோமீட்டர்) கடலிலேக்கு வழங்கிறார்களோடு முறையூடு நிபுணர்களின்போது கொடுக்கப்படுகிறது என்றும் அறியும்.

ప్రాంతిక వాయిద -	63,340 మీలు
ప్రాంతిక వాయిద -	72,960 మీలు
I ప్రాంతిక వాయిద -	సమస్థానంలోని (1,334 మీలు)
I ప్రాంతిక వాయిద -	సమస్థానంలోని (1,852 మీలు)


ମୁଖ୍ୟରେ କଥାକଣୀ ଶାନ୍ତିକଣୀ ବ୍ୟାଚାରୀ ଉପରେ
ଲିଙ୍ଗ ୬°୫୫' ଉଚ୍ଚତା ଜାହାଙ୍ଗରେତେ ଯୁଗପିଯୁକ୍ତିରେକୁ
ଥାଏ ମୁଖ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାଳଦୀର ଜାହାଙ୍ଗରେ ରୂପରେ
ଯୁଗପିଯୁକ୍ତିରେ ପାଦକଣୀ ପ୍ରାଣଧୂରାଜଙ୍ଗ ରାଜୁଙ୍କ ବିଶ୍ୱା
ଲାଙ୍ଘରେ ରୂପରେ ଥାଏଇବୁ।


എന്നാണ് ഈ വ്യത്യാസങ്ങൾക്കുള്ള കാരണം ഇതിന് ഉപയോഗ ക്ഷമതയോട് Practical Work in Geography – Part I (NCERT, 2006) എന്ന പ്രസ്തുതകൾ അക്കാദമിക്, സാമ്പത്തിക, നാമ്പാദി ഫലങ്ങൾ മുമ്പാം അധ്യാത്മം പരിശീലനയിൽനാം ഈ വ്യത്യാസങ്ങൾക്കു കാരണം ഒരു വാന്നത്തുകൂടി ചുവന്നു പറഞ്ഞാണ്.

ஒன்று வெட்டியிருப்பதற்கு தமிழ்நிலையம் என்று எழுவிடுவதைச் சொல்கின்றனரூப முருகன்னவாராஜ். ஏழாண்டு
ஒன்று வெட்டியிருப்பதற்கு தமிழ்நிலையம் எழுவிடுவதைச் சொல்கின்றனர். ஒன்று வெட்டியிருப்பதற்கு தமிழ்நிலையம் எழுவிடுவதைச் சொல்கின்றனர்.

ഒരുപ്പായിന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയും ഉൾപ്പെടെ അവളുടെ വിവരങ്ങൾ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് അക്കഷണാരംഭിച്ച സ്ഥാപനിൽനിന്നും മന്ത്രിയിലൂടെ മുമ്പുവരുത്തിയ ഏതുപ്പെട്ടെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കാൻ കാലാവധി, അസ്ഥിരത്വം, സ്ഥാപനവികാസാദ്ധ്യാവലോഗി എന്നിവയിലെ ഒവവിമുഖിക്കിൽ കാരണം മുന്നുവന്നുവരുത്തിയിരുന്നു എന്നും അഭ്യർത്ഥിക്കാൻ

மாதிரிமூலம் (Standard Meridian) எனவுள்ளதுக்கு வரை கூடிய முறையிலிருந்து ஏற்படும் நிலைமீதான் சமாநாதி $7^{\circ}30'$ எத் துணிக்கோடு அமைக்கப்படுவதன் காரணமாகவே ஒவ்வொரு நாளின் வளிமனிக்கும் அளவிற்கும் தெளிவாக விடுமாறு நிலைமீதான் சமாநாதி $7^{\circ}30'$ கிழக்காக நிலைமீதான் பிரதிவிஹாரிக்கப்படுகிறது. தூய்த முறைமூலம் (ST) என்று கூறுகிற முறைமூலம் (GMT) 5 மணி நிமிடம் 30 கிலோமீட்டர் முனிவேன்.





卷之三

ഇന്ത്യയുടെ മാനകസമയം [Indian Standard Time (IST)] എന്ന ആദ്യത്തെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചിതമാണ്. എന്നാണ് മാനക രേഖാംശത്തിൽ ഉപയോഗം? ജയ്സാൽമീറിനെ അപേക്ഷിച്ച് വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഏകദേശം രണ്ടു മൺഡൈർ മുഖ്യ സുര്യൻ ഉടൻമുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ദോപ്പാൽ, ചെന്നൈ, ജയ്സാൽമീർ എന്നിവിടങ്ങളിലും കിഴക്ക് ദിവ്യുഗൾ, ഇംഹാൽ എന്നിവിടങ്ങളിലും വാച്ചുകൾ ഒരേ സമയ മാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഈ ഇന്ത്യക്കാണ്ഡാണ്? മാനക രേഖാംശം കടന്നുപോകുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏതാനും സന്ദർഭങ്ങളുടെ പേര് പറയു.

വലിപ്പിച്ചിരുന്ന കാര്യത്തിൽ ലോകത്തിൽ 7-10മത്തെ രാജ്യമായ ഇന്ത്യയുടെ വിസ്തീർണ്ണം 3.28 ദശലക്ഷം കിലോമീറ്ററാണ്. ലോകത്തിൽ ആകെ വിസ്തൃതിയുടെ 2.4 ശതമാനമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യയുടെ രാജ്യങ്ങൾ എത്രല്ലാമെന്ന് കണ്ണാട്ടുകൂടുക.

വലിപ്പം

എന്ന ഭൗതികവൈവിധ്യമുള്ള രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. വടക്ക് അത്യുന്നതമായ പർവ്വതങ്ങൾ; ഗംഗ, ബേമപുരു, മഹാനദി, കുഴച്ചൻ, ഗോദാവരി, കാവേരി തുടങ്ങിയ വർഷാവികൾ; വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും ദക്ഷിണത്തുയിലെയും ഹരിതാഭമായ കുന്നിൻപുറങ്ങൾ; വിശാലമായ മണൽപ്പുരപ്പുകൾ നിരന്തര മരുപ്പരേഖ എന്നിവ എടുത്തുപറയേണ്ടവതെന്ന്. വടക്ക് ഹിമാലയ പർവ്വതം, വടക്കു-പട്ടണതാർ ഹിന്ദുകുഞ്ച്, സുഖലെമാൻ മലനിരകൾ, വടക്കു-കിഴക്ക് പുർണ്ണവച്ചു മലനിരകൾ, തെക്ക് വിശാലമായ ഇന്ത്യൻമഹാസമുദ്രം എന്നിവ അതിരിട്ടുനിൽക്കുന്ന ഒരു വിശാല ആമിശ്വരത്തെ ഭാഗമാണ് ഇന്ത്യൻ ഉപദ്വിപ്. പാകിസ്ഥാൻ, നേപ്പാൾ, ഭൂട്ടാൻ, ബംഗ്ലാദേശ് എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ ഇതിലൂൾപ്പെട്ടുന്നു. ഹിമാലയവും മറ്റു പർവ്വതനിരകളും പ്രാചീനകാലത്ത് ഒരു സ്ഥാഭാവിക തന്ത്രമായി നിലകൊണ്ടിരുന്നു. വൈബർ, ഷിപ്പകിലം, നാമ്പുല, ബോംബാൻ തുടങ്ങിയ എത്താനും ചുരുങ്ങളിലും കെല്ലാം ഇത് മുൻ ചുരുങ്ങക്കുക പ്രയാസകരമായിരുന്നു. ഈ സവിശേഷ സ്വത്വങ്ങളാടുകൂടിയ ഒരു പ്രദേശമായി ഇന്ത്യൻ ഉപദ്വിപ്പം ഒരു രൂപപ്പെട്ടുന്നതിന് സഹായകമായി.

കാർശ്മീർ മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെയും രാജസ്ഥാനിലെ ജയ്സാൽമീർ മുതൽ മൺഡൈർലെ ഇംഹാൽ മരാറയും സംഘർഷങ്ങളാൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന ആതികവൈവിധ്യങ്ങളെളുക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഭൗതികപ്പട്ടണതിൽ സഹായയ്ക്കുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് വിവരിക്കാംകൂ.

ഇന്ത്യയുടെ ഉപദ്വിപ്പാം ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലേക്ക് വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്നു. ഈ ഇന്ത്യക്ക് ഒരു കിലോമീറ്റർ തീരപ്രദേശം പ്രദാനംചെയ്യുന്നു. ബംഗാൾ മുൻകൊണ്ടു

കലിലെ ദിവസമുഖങ്ങളായ ആൻഡമാൻ നിക്കോബാബു റിസ്റ്റയും അറബിക്കുടിലെ ലക്ഷദ്വാരിപ്പ് ദിവസമുഹംഗ ഭൂടെയും തീരപ്രദേശങ്ങൾകുടി കണക്കിലെല്ലാക്കു ദേശാർ ഇന്ത്യൻ ഉപദ്വിപ്പിൽ തീരത്തെൽപ്പും 7517 കിലോമീറ്ററാണ്. അതായത് ഇന്ത്യ വിവിധങ്ങളായ വിഭവങ്ങൾക്കാണ്ഡും സന്ദർഭമായ രാജ്യമാണ്.

നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുമ്പോൾ

സുസ്ഥിരവികസനത്തിൽ (പക്ഷീതിവിഭവങ്ങളുടെയും പരിസ്ഥിതിയുടെയും പകിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിദ്യാർമ്മികൾക്ക് വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതിനുള്ള ഭൂപടാധിക്ഷാതി പാതസ്ഥായിയാണ് സ്കൂൾ-ഭൂപടം എന്ന പൊതുക്കൽ. ഈ NCHART പാദ്യപദ്ധതിയെ അഭിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഭൂപടം - NRSC/ISRO നടപ്പിലാക്കിയ ഒരു സംരംഭമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയുടെ വ്യത്യസ്തതരം ഭൂപട അംഗൾ <http://bhuvan-noeda.nrsc.gov.in/projects/schoolbhuvan/> എന്ന വെബ് സൈറ്റിൽനിന്നും കണ്ണാട്ടുവരാം.

ഇന്ത്യയും അയൽരാജ്യങ്ങളും

തനിതിക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപടം പരിശോധിക്കു (ചിത്രം 1.2). ഏഷ്യയുടെ ദക്ഷിണ-മധ്യഭാഗത്താണ് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം ഇതിൽ തെക്കൻ അതിരായി നിലകൊള്ളുന്നു. ഈതിൽ രണ്ടു ശാഖകളാണ് അറബിക്കുടിലും ബംഗാൾ മുൻകൊണ്ടു. ഉപദ്വിപ്പം ഇന്ത്യയുടെ സമുദ്രത്താടുകുളം സംബന്ധം അയൽരാജ്യങ്ങളുമായി ജോഡിശവും വേദ്യാമഹാശവും ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അവസ്ഥരങ്ങളുംകൂനു.

ഭൂപട നിരീക്ഷിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ അയൽരാജ്യങ്ങളുടെ ഒരു പട്ടിക തയ്യാറാക്കുക.

ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്ന അയൽരാജ്യങ്ങളായ ദീപ്പകളും ശ്രീലങ്ക, മലിബിപ്പ് എന്നിവ. ഇന്ത്യയിൽനിന്നും ശ്രീലങ്കയെ വേർത്തിത്തിക്കുന്നത് ശർവ്വ കാപ്പ് മാനാറും പാക് കടലിടുക്കുമാണ്.

ഉൾക്കെടലും (ഡിഎം) കടലിടുക്കും (ഡിഎം) തമിലുള്ള വ്യത്യാസമാർ?

ആധുനികകാലഘട്ടത്തിൽ അയൽരാജ്യങ്ങളുമായി ബന്ധം പൂലർത്തുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഭൗതികപ്രതിബന്ധങ്ങളുള്ളതായി നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെന്നുണ്ടെന്നും നാമിന് (പ്രതിബന്ധങ്ങൾ തരണം ചെയ്യുന്നതെന്നതിന് ഉദാഹരണം അംഗൾ നൽകുകുക.

ചോദ്യങ്ങൾ



1. ശരിയായ ഉത്തരം തെരഞ്ഞെടുത്തതുമുള്ളുക്.
 - (i) താഴെ തനിൻിക്കുന്നവയിൽ ഇന്ത്യയുടെ വിസ്തൃതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അക്ഷാംശ വ്യാപ്തി എത്ര?
 - (a) $8^{\circ}41'N - 35^{\circ}7'N$
 - (b) $8^{\circ}4'N - 37^{\circ}6'N$
 - (c) $8^{\circ}4'N - 35^{\circ}6'N$
 - (d) $6^{\circ}45'N - 37^{\circ}6'N$
 - (ii) താഴെ തനിൻിക്കുന്നവയിൽ ഇന്ത്യയുമായി ഏറ്റവും ഒരുമിച്ചുമുള്ള അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന രാജ്യമെന്ത്?
 - (a) ബംഗ്ലാദേശ്
 - (b) ചെന്ദ
 - (c) പാകിസ്ഥാൻ
 - (d) തുനീഷ്യ
 - (iii) താഴെ തനിൻിക്കുന്നവയിൽ ഇന്ത്യയേക്കാൾ വിസ്തൃതിയുള്ള രാജ്യമെന്ത്?
 - (a) ചെന്ദ
 - (b) ഇംഡിപ്പർ
 - (c) ഫ്രാൻസ്
 - (d) ഇറാൻ
 - (iv) താഴെ തനിൻിക്കുന്നവയിൽ ഇന്ത്യയുടെ മാനകരേഖാംശം എത്ര?
 - (a) $69^{\circ}30'E$
 - (b) $82^{\circ}30'E$
 - (c) $75^{\circ}30'E$
 - (d) $90^{\circ}30'E$
2. താഴെ തനിൻിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് 30 വാക്കിൽ കവിയാതെ ഉത്തരമെന്തുമുള്ളുക്.
 - (i) ഇന്ത്യക്ക് ഓനിലധികം മാനകരേഖാംശം ആവശ്യമുണ്ടോ? ആവശ്യമുണ്ടന്ന് നിങ്ങൾ കരുതു നുണ്ടാക്കിരു, എന്തുകൊണ്ട് വിശദീകരിക്കുക.
 - (ii) ഇന്ത്യയുടെ ദീപ്തിമാന തീപ്പുദേശങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന ഫലങ്ങൾ എന്തെല്ലാം?
 - (iii) വിശാലമായ അക്ഷാംശീയ വിസ്തൃതി ഇന്ത്യക്ക് ഗുണകരമാക്കുന്നതെങ്കാൻ?
 - (iv) ഇന്ത്യയുടെ കിഴക്കൻ സംസാരമായ നാഗാലാർജ്ജീലെ കൊഹിമയിൽ ഉദയാന്തരമയങ്ങൾ ദേരെ തെരഞ്ഞാണ്. എന്നാൽ ധർമ്മപരിശീലനിക്കിരുന്ന ഉദയവും അസ്ത്രമയവും വൈകിയാണ്. എന്നിലും മേരിസു ചിപ്പിച്ച സഫലങ്ങളിലെ വാച്ചുകളിൽ ഒരേസമയമാണ് കാണിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട്?

പ്രോജക്ട്/പ്രവർത്തനങ്ങൾ

അദ്ദേഹമാ / അടക്കാനാശക്കിയുള്ള റാംഭത്തനങ്ങൾ (അധ്യാത്മക ശുക്രിയാംശം റിക്വോർഡി കൾക്ക് റിംഗ്സ് ഇൻഡിസ്ട്രിക്കുക്ക)

- (i) മധ്യപ്രദേശ്, കർണ്ണാടകം, മേരിസു, കേരളം, ഹരിയാന എന്നീ സംസാരങ്ങളിലെ ജില്ലകളുടെ എല്ലാം ഒരു ശ്രാപ്പപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുമുള്ള ജില്ലകളുടെ എല്ലാവും സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ വിസ്തൃതിയും തമിൽ ബന്ധമുണ്ടോ?
- (ii) ഉത്തർപ്പദ്ധത്, പശ്ചിമബഹാറി, ഗുജറാത്, അരുണാചൽപ്പരാശ്ര, തമിഴ്നാട്, ത്രിപ്പുര, രാജസ്ഥാൻ, ജമ്മുകാശ്മീരി എന്നീ സംസാരങ്ങളിൽ ജനസാന്ദര്ഥ എറ്റവും കുടിയതും കുറഞ്ഞതും മായ സംസ്ഥാനങ്ങൾ എന്തെല്ലാം?
- (iii) സംസാരങ്ങളുടെ വിസ്തൃതിയും ജില്ലകളുടെ എല്ലാവും തമിലുള്ള ബന്ധം കണ്ണെത്തുക.
- (iv) ഇന്ത്യയിൽ കടക്കൽത്തീരമുള്ള സംസാരങ്ങൾ തിരിച്ചിരിയ്ക്കുക.
- (v) കര-അതിർത്തി മാത്രമുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസാരങ്ങളെ പടിഞ്ഞാറുവിന്ന് കിഴക്കോട്ട് ക്രമപ്പെടുത്തി എഴുതുക.

അദ്ദേഹമാ II അടക്കാനാശക്കിയുള്ള റാംഭത്തനങ്ങൾ.

- (i) ഇന്ത്യയുടെ തീപ്പുദേശത്ത് സറിതിചെയ്യുന്ന കേരളാസ്പദങ്ങൾ എന്തെന്തെല്ലാം?
- (ii) രാജ്യതലസ്ഥാനമായ ധർമ്മപരിശീലനയും ആർഡെമാൻ നികോഡോബാർ ദിപുകളിലെയും വിസ്തൃതിയും ജനസാഖ്യവും തമിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വിശദീകരിക്കുന്നു?
- (iii) ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ കേരളത്തണ്ടപ്പേരുള്ളടക്കയും വിസ്തൃതിയും ജനസാഖ്യവും കാണിക്കുന്ന ഒരു ബാർബത്യാഗ ഒരു ശ്രാപ്പപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതും?

യുണിറ്റ് II

ദ്രോക്കൂടി

ഈ യുണിറ്റിൽ അർപ്പണവളര്ത്താൻ:

- എന്നംഞ്ചു ദ്രോക്കൂടിമുഖം ദ്രോക്കൂടി വിജയം
- നീംവായുമെന്നും നീംവായുമെന്ന ശുണ്ടാം – ഏതൊല്ലും, ഓപ്പിലീയ നീംവായുമെന്ന്



A9Z8P 2

കേവക്കുതി

300 001 300

2

ജീവിക്കുന്ന ഒരു പരമ്പരാഗതനാണ് ആദിത്യം അന്തിമം കാലാനു ദർപ്പാദാസ്ഥം ദിവിജയകലാ അസ്തിപ്രഭാ പരിശോധിച്ചുവരാൻ. അംഗൾ സ്വഭാവം 460 ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക പ്രായാനു ഫ്രാന്റാൻ കാലാനു രഖി പ്രിഞ്ചാൻ. ദിവിജയ മാലാനാട്ടിനിലാഡി മുഖ്യമായും ബഹുജനപ്രവൃത്തി അനാർഥന്ത്രവും ദിവിജയ ആശ അനുകം മുറഞ്ഞേരു വരുത്തിപ്പിള്ളുന്നു. ദാരംപാലി തവണാരിപ്പായും ഉപരിനാമാനിടത്തിലേരുവും വിവിധ ഘടകങ്ങൾ മുപ്പുറ്റുന്നതിൽ ഉം ദിവിജയ ദാന്തപാലം പക്കുവിശേഷണും ദാരംപാലകലം ദാരംപാലപ്പിള്ളുവും നിരുദ്ധാശം പഠിച്ചുകൊണ്ട് [Fundamentals of Physical Geography NCERT 2006]. ദാരംപാലകലാ ക്ലാസ് പരിശോധിക്കുന്ന മനസ്സുമുഖക്കം സ്ഥാപ്യം വെച്ചുണ്ട് ദാരംപാലിപ്പുന്നുവും റിംഗൾ അന്തിമാനി തിരുന്നം പരുക്കു വിന്തുതാരു മുന്തുന്മാക്കണംഞ്ചു കാലാനു മുന്തുന്മാക്കി-മുന്തുന്മാക്കി അന്തിമാനിക്കും. അനുഭവക്കാരാണ് വിശ്വാസിക്കുന്ന മുൻപ് ഉം ദാരംപാല പല ദാരംപാല ക്ലാസി പാട്ടിപ്പിള്ളുന്ന അന്തിമാനിയിൽമാലും ദിവിജയ കിഴക്ക് ദിശയിൽമാലും തുന്ത്രിക്കുമലക്കും പട്ടം ദിശയിൽ ദിശക്കും ദിശയിൽ ദിശയിൽമാലും തുന്ത്രിക്കുമല അഭിഭരി ഉം സാമ്പാടം മുപ്പുറ്റും തുന്ത്രിക്കുമലക്കാരി ദിക്കുന്നു. ഇത് മുന്തുന്ന ഉപരിവുണ്ടായിരുന്നു ദാരംപാലകലാ ദിക്കുന്നു. മുന്തുന്മാലക്കരണം മുത്താന്തി മുന്തുന്മാലക്കരണം പ്രധാനമന്ത്രപ്പട പരിശോധനമാലും ദിവിജയക്ക് അനുഭവമാണ്.

- (i) ଉପର୍ଯ୍ୟାମିତାକାଳୀନ
 - (ii) ଏଇବେଳେକାଳୀନ କିମ୍ବା ଉପର୍ଯ୍ୟାମିତାକାଳୀନଙ୍କୁ
 - (iii) ଗାନ୍ଧିଯ୍ୟ-ଟାଂଟା-ଚନ୍ଦ୍ରମହିମାକାଳୀନଙ୍କୁ

ஒப்புகளை விடுவதோம்

மூல்பிக்க ஸம்பா கொவடி பதிவதனாலேயும் நோக்க எழுதன் கூட்டு முறை எதிர்க்கிணங்க உபயிபியை வரவேண்டியிருக்கக்கூடின் கண்டு வருது, சம்பாக்கூட்டு ஏதுவான் கைஞானமானி எங்கூடிக் குறைக்கப் படும் தமிழ்மூர்த்தியை கூறுவதினால் காலால்லூர் குடும்ப பகிளையார் வைக்குமாறு வாசகுவிடங்கள் வேலால்லூர் பிரையியிலையும் அம்பி ஆலீஸ்லூர் பிரையியும் மூடு குக்குண்டிலை டிக்கிழ்ச்சுவான். வடக்கு கிழக்கு வைக்கும் பகிளையார்களைக் காலிமுகங்களைக் கொடுக்கால்லூர் பிரையிலையில் திரும் வெள்ளிலையும் செங்கும்பாக்குப்பால்வைக்கும் மூடு குக்குண்டிலை குடும்பார்க்குமாறு காலால்லூர்.


வாழும் வகையிலேயுள்ள நடவடிக்கைகளைப் பெற்றுவரீடு செய்திப் பிரயாணமாட்டு வூவைப் பிரிவினாலேயுள்ளது. காலனில் ஒன்ற் காலனில் முன்ன் உபயோபி என வூவைக்கு விலை வளர்யமல்லது இருந்தே; நான்குவேளை; படிகளையால் ஒரே பிரயாணத் திடை இருந்து கடலில் தாஞ்சுபொடு என்ற முடி பிடிப் பிரயாணத் துமச்சியை அடிக்காரிய வாய்க்காலத் தளம் காலனில் விலையைத்தீவிரம் துறிந்துவிட்டுமென்றும்- ஆன்தாலுமிருப்பது பொதுக்கணிலை இல்லாததிற்காலி தான் விரியிய வட்டாரம் விவரங்களிலேயும் விலைவளர்யுக்காண்டிட்டு (Block faulting) விலையைக்கி. நான்பூத் வளர்யமல்விவரவே பலவாறி, ஒவ்வொன்று நான்பூத் விலைக்குமிகு முன்னால் தாஞ்சுவிக்கும் ஒன்றியுடையதைக்கொடும். உபயோபி பிரயாணமாட்டு காலனில் குடும்பத் திடைகள், நழும்போவ குடும்பத் திடை, ஜாஸ்பி குடும்பத் திடைகள், பெட்டிக்கால குடும்பத் திடைகளை நிறுத் திடைக்காரியில் குடும்பத் திடைகளை விவரித்து பிரிவினால் விலைகளை நடவடிக்கையில் கடிதம் குடும்பத் திடைகளைக் குடிக்காரியிலையாக்கி விடுவதுமுண்டு.

ചരിത്ര കണക്കാക്കുന്ന റിതി Practical Works in Geography Part I NCERT 2006 പുസ്തകത്തിൽ നിങ്ങൾ പറിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഉപദിവീപിയന്തികളുടെയും ഹിമാലയൻന്തികളുടെയും ചരിത്ര കണക്കുകൾ ഒരു താരതമ്യ പഠനം നടത്തുവാൻ സാധിക്കുമോ?

കിഴക്കോട്ടാഴുകുന്ന നദികളിൽ അധികവും ബാഹ്യശ ഉർക്കടലിൽ എന്തിലേക്കുന്നതിന് മുൻപായി ധർമ്മകൾ നിർമ്മിക്കുന്നു. ശാഖാവർ, കാവേതി, കൃഷ്ണ, മഹാനദി എന്നീ നദികൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ധർമ്മകൾ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്.

ഹിമാലയവും മറ്റ് ഉപദിവീപിയ പർവതങ്ങളും

ദൂരവും സറിയുമായ ഉപദിവീപിയവണ്ണ തിരിക്കിന്നും വിഭിന്നമായി ഹിമാലയപർവതവും മറ്റ് ഉപദിവീപിയ പർവതങ്ങളും അവയുടെ ഭൗമാലകനയിൽ താരതമ്യന പ്രായം കുറഞ്ഞതും കാരിന്നു കുറഞ്ഞതും മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയവുമാണ്. അവ ഇപ്പോഴും അന്തർജന്യവും ബാഹ്യജന്യവുമായ ബലങ്ങളുടെ പരസ്പരപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിധേയമാവുകയും ഭേദം (fault), വലനം (fold), സമർദ്ദതലം (thrust plain), എന്നിവയുടെ രൂപീകരണത്തിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ പർവതപ്രാണങ്ങൾ ടെക്നോൺിക് ജന്യം അണ്ണാണ്. യുവതാലടത്തിലുള്ളതും ദ്രോഗത്തിലും ശുക്രന്നതുമായ നദികൾ ഈ പർവതങ്ങളെ മുറിച്ചു കൊണ്ടാഴുകുന്നു. റിതികന്നരങ്ങൾ, 'V'രൂപ താഴ്വരകൾ, ചെറുവെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ (rapids), ബെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ തുടങ്ങിയ നിരവധി ഭൂരൂപങ്ങൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്.



ചിത്രം 2.1 : റിതികന്നര

സിന്യു-ഗംഗ-ബൈഹമപുത്ര സമതലം

സിന്യു, ഗംഗ, ബൈഹമപുത്ര നദികൾ രൂപപ്പെടുത്തിയ സമതലങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയുടെ മുന്നാമത്തെ ഭൗമവിഭാഗത്തിലുൾപ്പെടുത്തുന്നത്. യമാർത്ഥത്തിൽ ഇത് ഒരു ഭൂ അഭിന്നം (Geo synclinal depression) ആണ്. ഏക

ദേശം 64 ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഹിമാലയപർവത രൂപീകരണത്തിൽ മുന്നാമത്തെ ഘട്ടത്തിലാണ് ഇത് പുർണ്ണ വികാസം പ്രാപിച്ചത്. ആ കാലം മുതൽ തന്നെ ഹിമാലയൻ നദികളും ഉപദിവീപിയന്തികളും വഹിച്ചുകൊണ്ടുവരുന്ന അവസ്ഥാദണ്ഡം സാവധാനം ഇതിൽ നിരയാണ് തുടങ്ങി. ഈ സമതലങ്ങളിലെ അവസ്ഥാദണ്ഡപ്രക്രിയ കനം 1000 മുതൽ 2000 മീറ്റർ വരെയാണ്.

ഇന്ത്യയിൽ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ അവയുടെ ഭൗമാലകനയിൽ പ്രകടമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ നിലനിർക്കുന്നു എന്ന് മുകളിൽ സൃഷ്ടിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നും വ്യക്തമാണ്. ഈ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇവയുടെ അനുബന്ധമേഖലകളിൽ ദൂരവ്യാപകമായ ഫലങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഭൂപ്രകൃതിയിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളാണ് ഇതിൽ പ്രധാനം. ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപ്രകൃതിയേയും അതിൽ ഉയർച്ചതാഴ്ചകളെയും ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂവണ്ണ തത്തിൽ സജീവമായ ഭൗതിക ഭൂരൂപരൂപികരണ പ്രക്രിയകൾ സാധിക്കുന്നുണ്ട്.

ഭൂപക്ഷതി (Physiognomy)*


ഒരു പ്രദേശത്തിലുള്ള ഭൂപക്ഷത്തിന്റെ ശ്രീനത് ഘടന, ഭൗമപ്രക്രിയകൾ, പരമ്പരാഗ്രാമങ്ങൾ, ആജനിവയുടെ അന്തിമപലമാണ് ഭൂത്തിക-ലാക്കണ്ട്രിലുള്ള വൈവിധ്യമാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രാഥമ്യാദിക്കാനിലെ സവിശേഷത. ഇന്ത്യയുടെ വക്ക് വിവിധ ഭൂപക്ഷങ്ങളും മനോഹരമായ താഴ്വരകളും ആശ്രമരിയ മുന്നിച്ചാരങ്ങളും നിരയായ പരിസ്ഥിതികൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന തീർന്മാനത്തോടു കൂടി ഭൂപ്രകൃതിയും നീക്കെങ്കിൽ വർത്തോതാരിക്ക് മുൻക്കപ്പെട്ട പീം ഭൂമികൾ, അപദ്രവത്തിന് വിധേയമായ ശിലകൾ, ചെങ്കുതായ ചതിവിടങ്ങളുടെ നിര എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തി പീംഭൂ മികളുമാണ്. ഇവ രണ്ടിനും മധ്യ വിശാലമായ ഉത്തരങ്ങളാണ് സമതലവും സമീതി ചെയ്യുന്നു.

ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ത്യയെ താഴെപ്പറയുന്ന ഭൂപക്ഷതി വിഭാഗങ്ങളായി തിരിക്കാം.

- (1) വടക്കൻ-വടക്ക് കിഴക്കൻ പർവതങ്ങൾ
- (2) വടക്കൻസമതലങ്ങൾ
- (3) ഉപദിവീപിയ പീംഭൂമി
- (4) ഇന്ത്യൻ മരുഭൂമി
- (5) തൈസമതലങ്ങൾ
- (6) ദിപ്പുകൾ

വടക്കൻ-വടക്ക് കിഴക്കൻ പർവതങ്ങൾ

ഹിമാലയപർവതവും വടക്കുകിഴക്കൻ കുന്നുകളും മാണ്ഡ് വടക്കൻ-വടക്കുകിഴക്കൻ പർവതങ്ങളിലുൾപ്പെടുത്തുന്നത്. സമാനതരമായ പർവതങ്ങളുടെ നിരയാണ് ഹിമാ



ലയത്തിലുള്ളത്. ഒഗ്രോ ഹിമാലയവും ട്രാൻസ് ഹിമാലയനിരയുമുശ്രേപ്പുന്ന ഒഗ്രോ ഹിമാലയ പർവതനിര, മധ്യഹിമാലയം, സിവാലിക്ക് എന്നിവയാണ് പ്രധാന പർവതനിരകൾ. ഇത്യുടെ വടക്ക് പട്ടണത്താർ ഭാഗത്ത് വടക്ക് പട്ടണത്താറുനിന്നും തെക്ക് കിഴക്ക് ദിശയിലേ കണാം ഈ പർവതനിരകളുടെ പൊതുവായ ക്രമീകരണം. ഡാർജിലിൻ, സിക്കിം പ്രദേശങ്ങളിൽ ഹിമാലയം കിഴക്ക് - പട്ടണത്താർ ദിശയിലായാണ് സാനിതി ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ അരുണാചൽപ്രദേശിൽ അവ തെക്ക് പട്ടണത്താർ-വടക്ക് പട്ടണത്താറയാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. നാഗാലാം, മണിപുർ, മിസോറം എന്നിവിടങ്ങളിൽ അവ വടക്ക് തെക്കായി കണാണപ്പെടുന്നു. മധ്യനിര (Central axial range) എന്നുമറിയപ്പെടുന്ന ഒഗ്രോ ഹിമാലയ പർവതനിരയ്ക്ക് കിഴക്കു നിന്നും പട്ടണത്താരോട് ഏക ദേശം 2500 കിമീ നീളവും വടക്കുനിന്ന് തെക്കോട് 160 മുതൽ 400 കി.മീ. വരെ വീതിയുമുണ്ട്. ഇത്യും ഉപ ആവണ്യത്തിനും മധ്യ കിഴക്കേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്കു മിടയിൽ ഹിമാലയം ശക്തമായ നീണ്ട മതിരപ്പോലെ നിലകൊള്ളുന്നവെന്ന് ഭൂപടത്തിൽനിന്നും മനസ്സിലുണ്ട്.



ചിത്രം 2.3 : ഹിമാലയപർവ്വതം

ഹിമാലയം ഒരു ഭൗതിക അതിർത്തി മാത്രമല്ല, കാലാവസ്ഥാപരവും നീംവരണ്ടുകൂപരവും സാംസ്കാരികവുമായ അതിർത്തികൂടിയാണ്. കൈഞ്ഞേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെ ഭൂപരിസ്ഥിരത്തിൽ ഹിമാലയത്തിനുള്ള സ്ഥായിനം കണംത്താൻ കഴിയുമോ? ലോകത്തിലെ തന്നെ ഭൂപരിസ്ഥിരവിഭാജകങ്ങൾക്ക് മറ്റ് ഉദാഹരണങ്ങൾ കണംത്താൻ നിഞ്ഞാൻകും സാധിക്കുമോ?

ഹിമാലയത്തിൽ തന്നെ വലിയതോതിൽ പ്രാദേശികവൃത്ത്യാശങ്ങളുണ്ട്. ഭൂപകൃതി, പർവതനിരകളുടെ ശ്രമകുറഞ്ഞം, ഭൂതപണ്ഡർ എന്നിവയിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഹിമാലയത്തെ താഴെപ്പറ്റിയുന്ന ഉപവിഭാഗങ്ങളായി തിരിക്കാം.

- (i) കാർശ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ വടക്ക് പട്ടണത്താറിൽ ഹിമാലയം
- (ii) ഹിമാചൽ-ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഹിമാലയം
- (iii) ഡാർജിലിൻ സിക്കിം ഹിമാലയം
- (iv) അരുണാചൽ ഹിമാലയം
- (v) കിഴക്കൻ കുന്നുകളും പർവതങ്ങളും

കാർശ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ വടക്ക് പട്ടണത്താറിൽ ഹിമാലയം

കാരക്കോറ, ലധാക്, സാസ്കർ, പിർപ്പാവൽ എന്നീ പർവതനിരകൾ ഇതിലുൾപ്പെടുന്നു. കാർശ്മിൽഹിമാലയത്തിന്റെ വടക്ക് കിഴക്ക് ഓഗ്രോ ഒരു ശൈത്യരൂപമിയാണ്. അത് ഒഗ്രോ ഹിമാലയത്തിനും കാരക്കോറ പർവതനിരയിൽക്കൂടിയാണ്. ലോകപ്രശ്ന നീതി മായ കാർശ്മിൽ താഴവരയും ദാൽ തടാകവും ഒഗ്രോ എം പു മുള്ളി ഹിമാനി കളിമന്ത്രം മറ്റു വന്തുകളും ചേർന്ന് രൂപപ്പെടുന്ന കനമേ റിക് നിക്ഷേപം.

കാരക്കോറ
ഹിമാനി നിക്ഷേപണ ഭൂമായ മൊരെനീനുകും ഒരു ദാൽ മുള്ളി മിന്ത ഹിമാനി കളിമന്ത്രം മറ്റു വന്തുകളും ചേർന്ന് രൂപപ്പെടുന്ന കനമേ റിക് നിക്ഷേപം.

ചിത്രം 2.3 : ഹിമാലയപർവ്വതം
പ്രദേശത്ത് കാണപ്പെടുന്നു. കുക്കുമപ്പുവ് കൂഷിക്ക് അനുഭാവിക്കുമായ കാരക്കോറ ഹിമാലയം പ്രസിദ്ധമാണ്. ഒഗ്രോ ഹിമാലയത്തിലെ സോജില, പിർപ്പാവലിലെ ബന്ധിഹാർ, സാസ്കർ പർവതനിരയിലെ ഫോട്ടുലാ, ലധാക് മലനിരയിലെ കർദ്ദുങ്ങൾ, എന്നിവയാണ് ഈ പ്രദേശത്തിലെ പ്രധാന ചുരങ്ങൾ. ദാൽ, വുളാർ എന്നീ ശുശ്വരത്താക്കളും പാംഗോങ് സോ (Panggong Tso), സോ-മൊരിൽ എന്നീ ലവണജല തടാകങ്ങളും ഈ മേഖലയിൽ കാണപ്പെടുന്നു. സിന്യൂനത്തിനും അതിന്റെ പോഷകനികളുായ ചിനാബ്, തലംഎന്നിവയുമാണ് കാർശ്മിൽ ഹിമാലയത്തിലെ പ്രധാന നദികൾ. കാർശ്മിൽ വടക്കുകിഴക്കൻ ഹിമാലയവും ആവണ്യങ്ങളും അടിവാസികളും പ്രകൃതിസ്വാനരീതിയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പ്രദേശമാണ്. സാഹസിക വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് ഹിമാലയൻഭൂപക്കൃതി ഒരു ആകർഷണക്കേന്മാണ്. പ്രധാന തീർമ്മാനക്കേന്ന അളവായ വൈഷ്ണവന്മാരാവി, അമർനാംഗ ഗൃഹ, ചരംഗ്-ഇ-പൈരിൾ തുടങ്ങിയവ ഈ പ്രദേശത്താണ് സാനിതി ചെയ്യുന്നത്. ധാരാളം തീർത്ഥാടകർ ഓരോ വർഷവും ഈ കേന്ദ്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നു എന്നും നിങ്ങൾക്കിരാമല്ലോ?

ജമുകാർശ്മിൽ സംസ്കാരത്തിന്റെ തലസ്ഥാന നഗരിയായ ശ്രീനഗർ തലംപാടിയുടെ തീരത്താണ് നഗരി ചെയ്യുന്നത്. കാർശ്മിൽ താഴവരയിലും ഒരുക്കുന്ന തലം നദി യുവതാമലട്ടത്തിലാണെങ്കിൽപ്പോലും വടക്കവലയാണ് രൂപപ്പെടുത്തുന്നു. ഇത് ശ്രദ്ധയമായ ഒരു വന്തു

ഒരു ശ്രദ്ധയമായ വന്തു
വളരെ കാലങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു വിശദമായ തടാകത്തിന്റെ ഭാഗമായ ഇന്നത്തെ ദാൽ തടാകം പ്രാദേശിക അടിസ്ഥാനനിലപ്പിള്ളി (base level) ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കാണാം. കാർശ്മിൽ താഴവരയിൽ നിലവായ നദി വടക്കവലയങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നത്.





കയാൻ, നീരോളംകു മുഹൂറക്കുടുക പരിപ്പംമുന്തിൽ
പുക്കതയുംകു എടുക്കിൽ മുഹൂറക്കുമുന്തിനു നാവി
ഡാ-മുഹൂറക്കുംകു വസ്തുവല്ലും (ചിത്രം 2.4).

இரு பிரதேசங்களிலேயும் தனக்குப் பொறுத்த விஷயங்களை மீண்டும் அடிக்கடி விவரிதியாக எடுத்து விடுவதை நான் விரும்புகிறேன். ஆனால் சமூக விவரங்களை விவரிதியாக எடுத்து விடுவதை நான் விரும்புகிறேன்.

«*Экспресс-макрофотография*»

പട്ടണമുന്നാർ ദാഡി നാട്ടിക്കും കരിച്ച് കാളി (അവായും നാട്ടിക്കുന്ന പോലെക്കുന്നു) നാട്ടിക്കും തുടങ്ങിമാറ്റുന്നത് എൻ്റെ മനസ്സിൽനിന്ന് ഈ ഉദ്ധൃതിക്കും കാണുന്നുടുത്താൽ, നാട്ടിക്കും, ഗംഗ എന്നീ ഒരു നാട്ടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ പ്രക്രമങ്ങൾ പ്രധാന നിരീക്ഷയുണ്ടും. നാട്ടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പോലെക്കുന്നുണ്ടെങ്കളും ദാഡി, അഭിരാജി, സത്രവാഴ എന്നീ വയസ്സും ദാശയും പ്രധാനമാണെങ്കളും എന്നും, അവായും എന്നുണ്ടിരിയുണ്ടുണ്ടെങ്കിലും പ്രധാന നാട്ടിക്കും, മാഹാത്മ-സ്വാത്തി കില്ലേയിലെ തുമ്പിക്കും ഒപ്പുവെച്ച് ദാഡി വിജയക്കുന്നിൽ ഉണ്ടെപ്പു കൂടും വിശ്വാസം അഭിരാജിക്കും എന്നും വരുന്നു വരുന്നു അഭിരാജിക്കും കൈയെ മരുക്കുക്കും വിജയക്കും തുടർന്നു ചാണ്ടി. പട്ടണമുന്നാർ ദാഡിക്കും എന്നും അഭിരാജിക്കും എന്നും വരുന്നു അഭിരാജിക്കും എന്നും (ക്രാതുക്കിലെക്കും അഭിരാജിക്കും പ്രധാന ദിക്കിൽ ധാരാളം എന്നും ദാഡിക്കും എന്നും ദാശയും വിജയക്കും എന്നും), യിവായിക്ക് തിരി എന്നീ അഭിരാജിക്കും അഭിരാജിക്കും മുന്നും പ്രധാന വർഷത്തിനിടക്കിൽ ഈ വിശ്വാസംനിലെ വ്യക്തതയുണ്ടെങ്കിലും കാണുന്നുടുത്താൽ, ദാഡി എന്നും അഭിരാജിക്കും എന്നും ശ്രീറിത്യും 2000 ശ്രീ രിത്യും മുതൽ ഉയരായും ഈ പ്രക്രമങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കും





ചിത്രം 2.6 : സൈൻസിക്കാല ഹിമാലയ പർവ്വതനിരം തെക്കുനിന്നും വടക്കോട്ട് എന്ന തുകാക്കിയിലൂടെ ചേരുവശ്യം

ശിവാലിക്

ഡെറായുണിനടുത്ത് സിവാവല എന്ന സാലത്തും പരി സ്വർപ്പങ്ങൾക്കാലിലൂടെ കാണലപ്പെട്ടുന്ന ഭൗമസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് പിവാലിക് എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പിവിക് കാലഘട്ടത്തിലെ രാജകീയ സർവ്വേയുടെ ആസന്നാമാ യിരുന്ന ഡെറായുണി പിരക്കാലത്ത് പാതയിൽ ഇന്ത്യ യുടെ സർവ്വേവിഭാഗത്തായ സർവ്വേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആസ്ഥാനവും മാറി.

കോളനി ഭരണകാലത്ത് അവരെ വളരെ ആകർഷിക്കുകയും തുടർന്ന് ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ പ്രധാന സുവിഭവം സാക്ഷ്യം ആണെന്ന്, ധർമ്മാല, മുഖാലി, ശിംല, കുസാനി എന്നിവയും കണ്ണാൻമെൻ്റ് പട്ടണങ്ങളും പൊതുത്ത് റിസാർട്ടുകളുമായ സിംല, മുഖാലി, കുസാലി, അൽമോറ, ലാൻസ് ഡോൺ, റാണികെട്ട് എന്നിവയും അവർ വികസിപ്പിച്ചു.

ഈ പ്രദേശത്തിൽനിന്ന് രണ്ട് കുപക്ഷത്തി സവിശേഷത കൂളണ്ട് സിവാലിക്കും ഡുണ്ടുകളും. ഈ പ്രദേശത്തെ പ്രധാന ഡുണ്ടുകളാണ് ചണിഗിഗൾ - കരിക്ക ഡുണ്ട്, നാലാഗൾ ഡുണ്ട്, ഡെറായുണി, ഹരിക ഡുണ്ട്, കോട ഡുണ്ട് തുടങ്ങിയവ. ഇവയിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഡുണ്ടുകൾ ഡെറായുണിന് 35 മുതൽ 45 കിലോമീറ്റർ വരെ നീളവും 22 മുതൽ 25 കിലോമീറ്റർ വരെ വിതിയുമാണ്. അഗ്രീ ഹിമാലയത്തിൽനിന്ന് താഴ്വരാങ്ങളിൽ മിക്ക വാറും ഭൗതിക ശോതവർഗ്ഗങ്ങാണ് അധിവസിക്കുന്നത്. ഇവർ വേന്തൽ മാസങ്ങളിൽ ബഹുപല്ലുകളിലേക്കും (ഉയർന്ന പർവ്വതചരിവുകളിലെ വേന്തക്കാല പുൽമേടുകൾ) ശശ്ത്രകാലത്തിൽ തിരികെ താഴ്വരയിലേക്കും ദേശാടനം നടത്തുന്നു. പ്രസിദ്ധമായ പുക്കലുടെ താഴ്വര (Valley of flowers) ഇവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഗംഗേജതി, യമുനാതി, കേരളനാദ്, ബഹരിനാദ്, ഹോമ കുണ്ണം സാഹിനി തുടങ്ങിയ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളും ഈ ഹിമാലയ ഭാഗത്തിലാണ് സാന്തിരിചെയ്യുന്നത്. ഈ പ്രദേശ പ്രസിദ്ധമായ പാലുപയാഞ്ചുടുടം (നിർക്കുന്ന സംഗമസംഗമം) പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു. പഞ്ചപത്രം

ഡാക്കർ ഈ പുസ്തകത്തിലെ മുന്നാമധ്യായത്തിൽ സൃചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്തിന്റെ ഇതരരാജ്യങ്ങളിലുള്ള പ്രത്യാഗ്രാം കണ്ണംത്തുകൂടി.


ഡാർജിലിംഗ്-സിക്കിം ഹിമാലയം

പടിനുംാർ നേപ്പാൾഹിമാലയവും കിഴക്ക് ഭൂട്ടാൻ ഹിമാലയവും അതിരിട്ടുന്ന ഡാർജിലിംഗ് സിക്കിം ഹിമാലയം താരതമ്യേന വിസ്തൃതി കൂടിത്തെത്തുകിലും ഹിമാലയത്തിന്റെ പ്രധാനമായ ഒരു ഭാഗമാണ്. ശ്രീതഗതിയിലാഴുകുന്ന നദികളാൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഈ പ്രദേശത്തിൽ കാബേരി ജംഗ് (കാബേരഗിൾ) പോലുള്ള ഉയര മേരിയ കൊടുമുടികളും ആഴമേറിയ താഴ്വരകളുമുണ്ട്. ഈ പ്രദേശത്തിൽനിന്ന് ഉയർന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ 'ഓപ്പ്' ശോതവർഗ്ഗക്കാരാണ് കൂടുതലായും അധിവസിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈത്തിന്റെ തെക്ക് ഭാഗങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകിച്ചും ഡാർജിലിംഗ് ഹിമാലയത്തിൽ നേപ്പാൾകൾ, ബംഗാളികൾ, മദ്ദുന്നുയിൽ നിന്നുമുള്ള ശോതവർഗ്ഗക്കാർ തുടങ്ങിയവരുടെ സമിഗ്ര ജനസംഖ്യയാണുള്ളത്. ഭൗതിക പ്രത്യേകതകളായ മിത്രമായ ചരിപ്, ഉയർന്ന ജൈവാംശങ്ങളും മൺസിന്റെ ആവരണം, മുദുവായ ശീതകാലം, വർഷം മുഴുവൻ കൂത്യുമായ മശലദ്യത തുടങ്ങിയ അനുകൂലസാഹചര്യങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ശ്രീടി ശ്വീകാർ ഇവിടെ തെയില തോട്ടങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു. ഹിമാലയത്തിന്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളുമായി താരതമ്യും ചെയ്യു സോൾ ഇവയുടെയും അരുണാചൽ പരം ഹിമാലയത്തി നേരുമ്പു ശ്രദ്ധയമായ പ്രത്യേകതയാണ് ശിവാലിക്ക് സ്തരത്തിന്റെ (Shiwalik formation) അഭാവം. സിവാലിക്കിന് പകരം ഇവിടെ ഓർ സ്തരങ്ങളാണ് (Duar formation) പ്രധാനം. ഇവയും തെയില തോട്ടങ്ങൾ സാഹിക്കാനായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തി. ഡാർജിലിംഗ്, സിക്കിം ഹിമാലയങ്ങൾ മനോഹരമായ പ്രകൃതി ദൃശ്യങ്ങൾക്കും സമൃദ്ധിക്കുമായ സസ്യജാലങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകിച്ചു വിവിധതരം ഓർക്കിഡുകൾക്കും പ്രസിദ്ധമാണ്.

അക്കുന്നാവൻ സ്വിംബാർ

മലബാറിന്റെ പരമ്പരാഗതിനു കീഴടക്കുന്നതുൽക്കാൾ കൊണ്ട് ശിമ്പി പ്രതിസംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. പരമ്പരാഗതിനു പുനഃനുജ്ഞാ തെങ്ങുപടിനാട്ടം മുതൽ വടക്ക് ദക്ഷിണ ലാംബൻ, കണ്ണൂർ, തിരുവന്നേവ എന്നിവയാണ് പ്രധാന ഒക്കെമുടികൾ. വടക്കുന്നിന്നും തെങ്ങോട്ട് മുഖ്യരൂപ മുൻ മുഖ്യരാജാക്കന്നുകൂട്ടാം ദാമാനാദാരിയും ദാമികൾ മുഖ്യരംഗത്ത് കുറവും ആശംകയും ഗിരിക്കുന്നുണ്ട്. മുഖ്യപ്രത്യേകി നൂച്ചം പരമ്പരാഗതു കുറഞ്ഞില്ലെന്നു കരാൻ ആരംഭിച്ച ശരിക്കുന്നതെന്നില്ലെന്നു കരാൻ, സുഖമിന്നിക്കി, ദിക്കാൾ, ദിശാംക്കി, ലൃഹിത എന്നിവയാണ് അക്കുന്നാവൻ സ്വിംബാർ പരമ്പരാഗതിലെ പ്രധാന

നൂച്ചം. മുൻ ഉള്ളിന്ന ജീവന്മാന ദാഡി മുൻ. അതിനാൽ മുൻ ഉള്ളിന്ന ജീവന്മാനപ്പുതു മുഖ്യമായും പരമ്പരാഗതിനുമുകളും പ്രധാന മാരാളു ദക്ഷിണ തെങ്ങുപടിനാട്ടം അധി ദാമിന്നും, ദാമിപ്പും, ദാമിതു, ദാമിവാൻ, ദിക്കാൾ, ദിശാംക്കി, ദിശാംക്കിന്നും പ്രധാന തെങ്ങുപടിനാട്ടം. ദിക്കാൾ ദാമിന്നുപടിനാട്ടം മുഖ്യമിൽ കുറവി പിന്തുവു കുന്നു. മുൻ ദാമാനാദാരി കുറവി ആശംക പരമ്പരാഗതു മുഖ്യപ്രത്യേകി വാദാദാരാണ്. തെങ്ങോട്ട സമ്പദം സംര ചേരുവുമുന്നു ഒരിപ്പാക്കാനും സംസ്ഥാനം വാൻ മുറ പരമ്പരാഗതു മുഖ്യപ്രത്യേകി കുറഞ്ഞ തെങ്ങോട്ട തുമ്പിപ്പുള്ള ഗതാഗത വന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാമം





卷之二十三

തൃശ്വരൻ, എറിനോട് അദ്യമുപയോഗം ആക്കണം എന്നിൽത്തു തില്പ്പുകൂട്ട ഒരു മലബാറിലേറ്റുവാൻ ആവശ്യമാണെന്നുണ്ടു്.

கிழமை குறைத்து விவரங்கள்

എല്ലാവും പരിപ്രകാരമായിരുന്ന് കാരണം മുഖ്യമാണ് സഹത്യാക്കാനു കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു



பின்னால் கூறுகிறோம் அதை.

எனிலே அதிகமாகவுடன். வகுக்க வக்காவெங், என் கூறுகூக்கி, மனிபூர் குடும்பத்தின் பூர்ணா தென் மூல நிலைய செல்லுகிளி டாக்காய் குடும்பத்தின் பூர்ணமான பூர்ணா; ஜூனின் குக்கி வெண்டு வருளா யாறாது, நெடுஞ்செழுவாகவும் அயிவானிக்குநா வெரு குடும்பத்து களில், சில முனிக்கலையும் என்றும் வெங்காவெங் அவசிறிக்கொண்டு, மனிபூரிலையும் விடுதலையிலையும் பியங்கலையும் என் குடும்பத்தின் வகுக்க. ஏழை விசுவாழ்வு-நலக்குதூண் பிரபுரூப விசுவாழ்வு வெக்காக் கொந்த மனிபூரிலையும் குபக்குனினுடை வூதுபார்த்துக்கொண்டு,

മെല്ലാപിൽന് തന്ന എന്നുമാറിയാലുള്ള വിവരങ്ങാം മുഴുവൻ ചൊല്ലും സ്ഥാപിക്കിക്കണ്ടതുമുഖ്യമായ റിംഗ്സ്‌പ്രോഫൈലിംഗ് രൂപരീതിയുണ്ട്. നാശംവാര്ത്തിയ രിംഗ് റാറ്റിക്കലൂ ഫൈം പ്രയോഗിച്ച ഫോൺകോടികളുണ്ട്. എന്നാൽ ഭിന്നാം ഭിന്നാം അനിപ്പറിബലയും ഒരു റാറ്റിക്കർ ഫോൺയും ഫോൺകോടിയും ഒരുക്ക് നാശംവാര്ത്ത ഫോൺകോടികളുണ്ട്. അനിപ്പറിബല കീസ്കൾ ഓരോള്ളിലും റാറ്റിക്കർ ഫോൺകോടികളുണ്ട്. നാശംവാര്ത്ത ഓരോള്ളിലും റാറ്റിക്കർ ഫോൺകോടികളുണ്ട്. നാശംവാര്ത്ത ഓരോള്ളിലും റാറ്റിക്കർ ഫോൺകോടികളുണ്ട്.

വാദക്കുർ സമരങ്ങളാൽ

எப்பியூ, மாஸ், கிராஃபிக்ஸ் என்றும் அழைகின்ற வகையில் கொண்டிருந்து அவர்களுக்கு நிர்வாயிக்கொடுக்கப் படுவதாகவே வடக்கினால்கூறுகின்றது. இந்த நிலைமைகள் கிடைக்கும்போது படின்றைக்கும் ஏதுமிகுங்கி 3200 கிலோமீட்டர் வரையில் கிடைக்கிறது. நிலைமைகளிலிருந்து மூன்றாவது வரித்து ஒன்று முதல் ஒன்று கிலோமீட்டர் வளையாத என்கேவற்றைக்கொடுத்து பார்த்தால் கால் 1000 முதல் 2000 மீட்டர்களுக்கான் வடக்கு நிர்வாய் கணக்கைத் திடுவது வெவ்வேறு, எனவே, ஏதுமிகுங்கி நிலைமைகளில் படிந்றை கிடைக்கும்போது ஏதுமிகுங்கி நிலைமைகள் என்று நிர்வாயிக்கப்படுகின்றன.

எனவூலில் வழக்கிவாணித் தமதுமையை
பறிய அவசரமிக்குமிருப்பதை நினைவு கீழாக கீழாக
கிடைக்கிறீர்கள் விட்டதுதிலும் வே ஹாவுகிய வே
மகான் காவும். தூதிக்கு மதுகாயி பறிவதைக்காண
நினைவு வழுது நடவடிக்கைகளை ஒழுகுவிட மாற்றி.
கூட்டுக்கு முதலேயான திருக்கப்பகுதியை நான்
கீர் அப்படிக்கும்போதுக்கடியு செழியன். காவுகிள்
தெருவையில் ஏதுக்கூடம் 10 முதல் 20 கிலோமீட்டர்கள்
விடுதியில் ஏதாவது ஒவ்வொரு காலைப்பட்டினா; ஒரு ஜெ
விக்கும் எரிக்கும் குத்தும்பாடு அதிர்த்த வாழுக்கு
மூலம் புறங்களிலேயுள்ளதோல் மூலம் ஏதாவது ஏது
நிழல்பட்டினா எவ்வளவுக்கும் வருப்பு நிவாரணம் ஏப்
பேசுகினா; முதல் பிரேரணை நடவடிக்கையை நடவடிக்கை
நடவடிக்கையை நடவடிக்கையை.

ഒരു വൈദികന്റെ കാര്യത്തു പുതിയതു മൂല ഫോറേസ്റ്റ് സെക്യൂറിറ്റീസ് ബോർഡ് പ്രാഥമ്യമുണ്ട് എന്ന് ഇവ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നും ഒരു ഏറ്റവും വാഹി എന്നുണ്ടിൽ പ്രേക്ഷണം നിലനിൽക്കുന്ന ദുർഘട്ടപരമായ കാരണങ്ങളിലെ പഠി തയ്യാറീനാ ഖടകത്തിൽ രൂപീകരാത്തുന്ന അവരുടെ നിരീക്ഷപ ദുർഘട്ടപരമായ മനോഹരിയിൽ (Sand bar), വളക്കു വായം (Meander), ഓക്സൻ ചോഡനം, പിസ്കാലോ തുക്കുനാ പാല്പുകൾ തുടങ്ങിയവ മുഴു സംരക്ഷണമുണ്ടുണ്ടെ രാഷ്ട്രീയ ശാഖയാണ്. പ്രാഥ പരമാരാധരരാലും



www.ijerph.org; 2.10 = 2016-02-03 10:45:00 UTC

നെരിക്കുവുന്നുകൾക്കും മനസ്സിലെമ്പുകൾക്കും പ്രസി
ദാക്കാണ്. ഈ പ്രത്യേകം ശ്വരിൽ ഭർത്താവായും അടിസ്ഥാ
യുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ടിരുന്ന നാഡിയുടെ ഗതിക്രാന്തി ഒരു
കാലിന്റെ വിഭ്യാതയെല്ലാം കാണിക്കുന്നു. പ്രാണിക്കണ്ണാ
ഞ്ചുകൂട്ടാണ് അനുപിശ്ചൽ രൂപക്രമങ്ങളിൽ കാണുന്നവയു
കയും പബ്ലിക്കും മുഖിൽ നാടികളുടെ നിലവിലെമ്പെട്ടിൽ
ലോകത്തിലെ തന്ത്രാം വാദികൾ ദിവ്യദാനം രൂപക്രമാന്തരം
ഉദാഹരണം പ്രതിജ്ഞയും സ്വന്നംമുൻ ധനറ്റ നാമും
നിലപൂരിപ്പിന്നും ഒരു വൃത്താർ ഒരു ദിവ്യാംതരം
എന്നുംകൂടാണ് നാടുവാനും ഒരു സംഘവമ്മാൻിൽ. പാഠാ
ന, ധർമ്മി സംസാരങ്ങളിൽ നിന്നും-ഭാഗം നബിവും മു
ഖമാനിക്കിയിൽ ഒരു ദിവ്യാംതരംമുളി നിലപൂരിപ്പാനും
ഉത്തരിപ്പിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ദിവ്യപ്രയത്നം നാം
ധ്യാനിക്കിയിൽ വച്ച് എക്കുറഞ്ഞ ഒരു ഏതെങ്കം തിരിക്കുന്ന
സംഘരണംവെങ്കിൽ കടക്കുന്നതിനു മുൻപാണി പാടം
കിഴക്കുന്നിന്നും ഒരു ക്ഷേത്രാന്തരംമാറ്റി വരുകുന്നു. ഈ
നാടിനിസ്ത്രാം ശാന്താം, ഓള്ളം, കരിന്താം,
പണാം, മുത്രമാം വ്യത്യസ്തതാവിളക്കിക്കും ശാന്താന്തരാം
ശാന്ത വ്യാദ്യവിശ്വാസാം ഏകാദശഭൂപ്ര ഉള്ളംഗിനാം
നാടാം മുഖംശാം വലിയ ജനാംവുംകൊണ്ടുകൊണ്ടാണ്.



三月三十日：由里約回布宜諾斯艾利斯。

ଓপବୀପୀତ୍ର ପାଠ୍ୟଗୀତି

കാരി സമൂഹങ്ങളിൽ നിന്നും 150 ശ്രീരം ദുർഗ്ഗ
600-600 വീടുകൾ വരെ ഉഡാക്കണ്ണൻ മധ്യപാലവും ഉപ
സീമിയുംജും കേരളത്താക്കാ കുടുംബങ്ങളുടെ
കുലചുരുളും ആശാനക്കാർ, വടക്ക് പട്ടണങ്ങൾ ഡോക്കില
കുറ (കുറാവലി തൃപ്പിച്ച), കിരുട്ട് എഴുമ്പൻ കുന്നു
കൾ, പട്ടണങ്ങൾ ചീരി വേലി, തൊട്ട് പ്രദേശങ്ങൾ എന്നി
വായാണ് ദുർഗ്ഗപിള്ള പിംബളിയുടെ അവലിഡിതാർ.
കുറക്കുണ്ട്. കർണ്ണ അഞ്ചുക്കാൻ പിംബളി എന്നിവ
ഉപദിഹിയ പിംബളിയുടെ ഒരു വടക്ക് കിടക്കു
തൃപ്പുഞ്ചായി കാഞ്ചപുട്ടുന്നുപുന്നാലിന്നുൾ പിംബളി,
പലംപു പിംബളി, റാമപു പിംബളി, മാരവ പിംബളി,
കൊമ്പന്നായും പിംബളി, കർണ്ണാടക പിംബളി എന്നി
ങ്ങളുടെ തട്ടുകട്ടായുള്ള പിംബളികളുടെ നിന്മകൾ അട
ഞ്ചുവും മാറ്റുന്നുണ്ട് ഉപദിഹി.

എന്നുമ്പുതു എന്നവിധ്യുദ്ധങ്ങളെ തന്ത്രികാസംഗ്രഹണം ഉപയോഗിച്ച് വീഡിയോ ഫിലിംമിലൂടെ മനസ്സ് കാരണങ്ങളാണ് അഭിരൂച്ചം.

- (i) മുക്കാൻപിരുമ്പ്
(ii) മുളന്ത തകം
(iii) വടക്ക് കിഴക്കാൻപിരുമ്പ്

ക്രിസ്തവി

പടിഞ്ഞാറ് പദ്ധതിമല്ലടവും കിഴക്ക് പുർവ്വമല്ലടവും വടക്കു സത്ത്‌പുര മെമ്പരൽ മലനിരകളും, മഹാദിയോ കുന്നുകളും ഡക്കാൻ പീറിബുമിക്ക് അതിരിട്ടുന്നു. മഹാ രാഷ്ട്രത്തിൽ സഹ്യപ്രശ്നി, കർണ്ണാടകത്തിലും തമിഴ്നം ടിലും നീലഗിരി കുന്നുകൾ, കേരളത്തിൽ ആന മലക്കുന്നുകൾ, ഏലമല കുന്നുകൾ എന്നിങ്ങനെ പദ്ധതി മലട നിരകൾ പല പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. പദ്ധതിമലടം പുർവ്വമല്ലടത്തേക്കാൾ താരതമ്യേന ഉയര കൂടുതലുള്ളവയും തുടർച്ചയുള്ളവയുമാണ്. വടക്കു നിന്നും തെക്കോട്ട് ഉയരം വർദ്ധിച്ചുവരുന്നു. ഈ നിരക ഇടുക ശരാശരി ഉയരം 150 മീറ്ററുണ്ട്. ആനമല കുന്നുകളിലെ ആനമുടി (2695 മീറ്റർ)യാണ് ഉപദിപിയ പീറിബു മിയിലെ ഉയരം കൂടിയ കൊടമുടി. നീലഗിരികുന്നുകളിലെ ദോധബെട (2637 മീറ്റർ) ഉയരമേറിയ രണ്ടാം മത്തെ കൊടുമുടിയാണ്. മിക്ക ഉപദിപിയ നദികളും പദ്ധതിമലടത്തിൽ നിന്നുമാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. മഹാ നദി, ശോദാവതി, കുപ്പൻ, കാവേരി തുടങ്ങിയ നദികളാൽ വലിയതോതിൽ അപരാതത്തിന് വിധയമായി തുടർച്ച നഷ്ടപ്പെട്ട ഉയരം കുറഞ്ഞ കുന്നുകളാണ് പുർവ്വമല്ലടങ്ങൾ. ഡക്കാൻ പീറിബുമിയിലുൾപ്പെട്ടുന്ന പ്രധാന മലനിരകളാണ്, ജവാദികുന്നുകൾ, പാർശ്വകാണ്ഠ നിര, നല്ലമല കുന്നുകൾ, മഹോദഗശിരി കുന്നുകൾ തുടങ്ങിയവ. പദ്ധതിമലടവും പുർവ്വമലടവും നീലഗിരികുന്നുകളിൽ സന്ധിക്കുന്നു.

മലബാറിന്റെ പാതയിൽ

പടിഞ്ഞരാർ അരാവലി പർവതം അതിർത്തിയായുള്ള
ഭൂവിഭാഗമാണിത്. സമുദ്രനിരപ്പിൽനിന്നും 600-900 ശീറ്റർ
വരെ ഉയരമുള്ള നിരയായ ചെക്കുതരായ ചരിവുകളോടു
കൂടിയ പീറളുമികളാൽ രൂപം കൊണ്ടിട്ടുള്ള സർപ്പര
പർവത നിരയാണ് മധ്യ ഉന്നതക്കൽിൽ തെങ്ങേ
അതിർത്തി. ധക്കാൻ പീറ ഭൂമിയുടെ വടക്കൻ
അതിർത്തിയാണിത്. വൻതോതിൽ അപരദനത്തിന്
വിധേയമായതും തുടർച്ചയില്ലാത്തതുമായ അവശ്യിക്കുന്ന
പർവതങ്ങൾക്ക് ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണിവ. ഉപരിപിയ
പീറളിയുടെ തുടർച്ച പടിഞ്ഞരാർ ജണങ്ങളിൽ വരെ
കാണാൻ സാധിക്കും. ഇത് നീഉമേറിയ മൺകുനകളും
ബർക്കനുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രദക്കലയുടെ ആകൃതിയിലുള്ള മണൽക്കുനകളും നിരഞ്ഞ പ്രദക്കലമാണ്.
ഈ പ്രദക്കലങ്ങളിലെ മാർബിൾ, ഷൈറ്റ്, നാംബർ തുടങ്ങിയ
കാഡാനതിത്തിലുള്ള സാന്നിധ്യത്തിൽനിന്നും ഈ
ഭൂവിഭാഗം ഇതിന്റെ ചതിത്ര കാലാവസ്ഥങ്ങളിൽ കാണാനുണ്ടാക്കാനുള്ള പ്രക്രിയക്ക് വിധേയമായിട്ടുണ്ടെന്ന് സാറി കരിക്കാവുന്നതാണ്. മധ്യ ഉന്നത തങ്ങളുടെ ശരാശരി ഉയരം സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും ഏകദശം 700 മീറ്റരിനും
1000 മീറ്റരിനുമിടയിലും ചതിപ്പ് പൊതുവെ വടക്ക് പടിഞ്ഞരാർ ദിശയിലേക്കുമ്പോൾ. യമുനാ നദിയുടെ പോഷക

நடிக்குதில் கூடுதலும் விஸ்யூபார்வதனிறைச் சிகிஞ் செக்மூரி பர்வதனிறைச் சிகிஞ் முடிதவிக்குங்வயான். சபுரி நடியுடைய பொறுப்புகளினால் வாய்மை அடைவதில் பர்வதனிறைச் சிகிஞ் முடிதவிக்குங், மயூர நாடு தடத்திருப்பதைக்கண்டு தூதர் பிரதிவேஷம் எடுத்து கூடியதாக இருக்கிறது. இவற்கூட தெக்க சேராட்டுக்காரர்புரி பீராலூம் திட்டம் யாழுவிலவண்ணுடைய வலிய கருத்து கேவலமாக எடுத்து.

വടക്ക് കിഴക്കൻ പീഠഭൂമി

හුත් ප්‍රයාග ඉපවැඩිපිය පීංඥුම්‍රියුර රෙදු තුනක්දු යාග්. පිළිමාලය පරිවර්තනාපිකරණ කාලානුව්‍යත්තියේ හුතුපුරු පෘශකතාවිගේ පෙකක් ගිශයිලෝකභුනු ඡාලන තාවිගේ ගෙගමායි ටෙලුරාපුටු වෙළඳ මුවල රාජ්‍ය භාරි කුණුකර්ස්කු මෙශ්වාලය පීංඥුම්‍රිකුම්ඩයිල් ඩිශාලඹය රෙදු උස්සමේවල තුපපුටු එහින් කරුත පුළුණු. ඩිජිටල මූල්‍ය අභායමේවල ඇඟෙකා තැනික මුද ගිකෙස්පාන ප්‍රවර්තනයිගේ පෘශ්චතායි ගිර යාකපුදුකුතු පෙයත්තු. මෙශ්වාලය පීංඥුම්‍රියු කර්බි අභ්‍යලාස් පීංඥුම්‍රියු ණුන් ප්‍රයාග ඉපවැඩි පිය ව්‍යාපෘතියිල් ගිණු වෙර්පේත් ස්ථිතිචැයුණු. ප්‍රාගෝධික ගොතුවිඛාගණුව පෙරුක්ස් නැඩිසාග තමාක් (i) ගාරෝ කුණුකරු (ii) වාස්‍ය කුණුකරු (iii) ඇයතිය කුණුකරු අත්‍යින්ධන මුළු ඉපවැඩි ගණනායි මෙශ්වාලය පීංඥුම්‍රියිය තිබුණා. ආස මිලේ කර්බි අභ්‍යලාස් කුණුක්තිවු නැතිගේ තුක්දුකාශපුදුනතිකාත් ගෛහඳානය්පුද් පීංඥු මියේ පොලේ තෙනා මෙශ්වාලය පීංඥුම්‍රියු කර්කා රි, මුදුවයිර්, මුද්‍රණගෙන්, ප්‍රාග්‍රාමක්ලු, යුගෝනියා තුකණීය යාතුගිකෙස්පානුත් සාම්පාදනය්. තෙකක් ප්‍රතිඵලාංග් මැණ්ඩුලුණිල් ගිණු වළාය ආවුවිල් ම්‍ය ලඩිකුළුනතිකාත් මෙශ්වාලය පීංඥුම්‍රියිල් නැප තෙන පුළුවුතියෙන් දුරුමාකුණාත්. තිරාපුණියිල් සාස්‍යාවරණයානු මුද්‍රාතා ආගාවුතමාය පරාක්‍රාන් කාණ්ඩපුදුනත්.

ഇന്ത്യൻ മതാലൂഹി

അരാവലിക്കുന്നുകൾക്ക് വടക്കുപടിഞ്ഞാറായാണ്
ഇതുവർ മരുഭൂമിയുടെ സ്ഥാനം. നീളമേറിയ മണൽക്കു
നക്കളും പർക്കുന്നുകളുമടങ്ങിയ നിശ്ചോന്തര ദൃശ്യങ്ങൾ
ഗമാണിത്. ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ വർഷത്തിൽ 150 മീറ്റർ
മീറ്റർ മഴ മാത്രമേ ലഭിക്കാറുള്ളു. വരണ്ട കാലാവസ്ഥാ
യുള്ള മഹിംബ സസ്യജാലങ്ങൾ വളരെ വിരുദ്ധമാണ്. ഈ
പ്രദേശക്കതകൾ ഉള്ളതിനാൽ ഈ പ്രദേശം മരുസാ�റി
എന്നറിയപ്പെടുന്നു. മെണ്ണാഞ്ചായിക് കാലഘട്ടത്തിൽ
ഈ പ്രദേശം കടലിന്റെയിലായിരുന്നു എന്നു കരുതപ്പെ
ടുന്നു. അക്കാലിൽ നമ്പിതിചെറുന്ന വുഡ് ഫോസിൽ
പാർക്കിൽ നിന്നും ഒരു സംഗ്രഹിതനട്ടത് ‘ബൈഹമണ്ഡ്’

பிரதிவெளி ஈழாக நிறைவேண்டும் என்றும் கூறுகின்ற குடும்பத்தினர் மூலம் சீர்தான் விவரம் கொடுக்கிறார்கள். அதையிலே கூடியாக நிறைவேண்டும் உயிரீடிய பிரதிவெளி குடும்பத்தை கூடியிடுவதும் தூண்டியிடுவதும் கூடிய நிறைவேண்டும் என்றும் கூறுகின்ற குடும்பத்தினர் மூலம் சீர்தான் விவரம் கொடுக்கிறார்கள். அதையிலே கூடிய நிறைவேண்டும் உயிரீடிய பிரதிவெளி குடும்பத்தை கூடியிடுவதும் தூண்டியிடுவதும் கூடிய நிறைவேண்டும் என்றும் கூறுகின்ற குடும்பத்தினர் மூலம் சீர்தான் விவரம் கொடுக்கிறார்கள்.



allgemeine Anwendung

ഇരു പിന്തുംകാലം മനസ്സിലുണ്ട് എന്നതാണ്

Digitized by srujanika@gmail.com



alt. 2,01 ; 201x200mm

(ii) പുഞ്ചവത്തിൽ നാടകരാജാർ സ്രൂതിയാണെന്ന് അഭിപ്രായം തന്നെ.

2004 ഡിസെമ്പർ 26-ാം തൃജുണൻ സൗഖ്യമാർക്ക് വിശ്വകരിച്ച വിനോദത്തിലൂടെ കൂടുതൽ പ്രക്ഷേപണങ്ങൾ നിന്ന് വിവരിപ്പിച്ചു. മുഖ പ്രക്ഷേപണങ്ങൾ നേരിട്ടും മുൻപും മുഖ പ്രക്ഷേപണങ്ങൾ നേരിട്ടും ആവശ്യമാണ് എന്ന വാക്കുമാറ്റം അവർക്കുണ്ടായി വിവരിപ്പിച്ചു. ഏറ്റവും കുറവായാണ് മുഖ പ്രക്ഷേപണങ്ങൾ നേരിട്ടും ആവശ്യമാണെന്നും?

പുരുഷന്മാരുടെ പുരുഷത്വം എന്ന് അഭിപ്രായം കൊണ്ടാണ് വിജയകുമാർ ഒരു ദിവസം കലാരിഡിലേക്ക് വുംവിച്ചു കിടക്കുന്നതിനും തല്ലെ ആദ്യ വിജയകുമാർ മാർഗ്ഗബന്ധകളും തിരിച്ചെല്ലാത്തിൽ പ്രധാന ശാഖ സ്ഥാപിക്കിയെന്നു കണികയെ തിരികെടുത്ത പ്രധാന ആദ്യ മാർഗ്ഗബന്ധകൾ പുരുഷത്വം എന്ന് അഭിപ്രായം കൊണ്ടാണോ?

ପ୍ରକାଶକ



ANSWER 2.14 : क्षेत्री

ചോദ്യങ്ങൾ



1. ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നവയിൽ നിന്നും ശരിയുള്ളതാം ദത്തണ്ണതുകുത്തശുത്രുക.
 - (i) ഹിമാലയത്തിന്റെ ഏതു ഭാഗത്താണ് കഹേവ സ്തരം കാണപ്പെടുന്നത്?

(a) വടക്കുകിഴക്കൻ ഹിമാലയം	(c) കിഴക്കൻ ഹിമാലയം
(b) ഹിമാചൽ ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഹിമാലയം	(d) കാശ്മീർ ഹിമാലയം
 - (ii) ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ലോകത്തെ തന്ത്രം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്?

(a) കേരളം	(c) മണിപ്പൂർ
(b) ഉത്തരാഖണ്ഡ്	(d) രാജസ്ഥാൻ
 - (iii) ആൻഡമാൻ നികോഡോറിൽ നിന്നും വേർത്തിരിക്കുന്ന കടൽഭാഗം.

(a) 11° ചാനൽ	(c) 10° ചാനൽ
(b) ഗൾഫ് ദാമ് മാനാർ	(d) ആൻഡമാൻ കടൽ
 - (iv) ഏത് മലനിരയിലാണ് ദാധിബൈട്ട് കൊടുമുടി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്?

(a) നീലഗിരി കുന്നുകൾ	(c) ഏലമല കുന്നുകൾ
(b) ആനമല കുന്നുകൾ	(d) നല്ലമല കുന്നുകൾ
2. താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മുപ്പുത് വാക്കിൽ കവിയാതെ ഉത്തരമെഴുതുക.
 - (i) ഒരു വ്യക്തി ലക്ഷ്യപ്പിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏത് തീരുമാനത്തിൽ നിന്നുമായി റിക്കും യാത്ര ആരംഭിക്കുക? എന്തുകൊണ്ട്?

(ii) ഇന്ത്യയിൽ ഏവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ശൈത്യമരുഭൂമി കാണാൻ സാധിക്കുക? ഈ പ്രദേശത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട പർവ്വതനിരകൾ കണ്ണഡത്തുക.

(iii) പച്ചമിതീര സമതലങ്ങളിൽ ധർമ്മകൾ കാണപ്പെടാത്തതെന്തുകൊണ്ട്?
 3. ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് 125 വാക്കിൽ കവിയാതെ ഉത്തരമെഴുതുക.
 - (i) അറബിക്കെൽ ദീപസമുഹങ്ങളെല്ലാം ബംഗാൾ ഉൾക്കെൽ ദീപസമുഹങ്ങളെല്ലാം തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്യുക.
 - (ii) താഴ്വരസമതലങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന പ്രധാന ഭൂരൂപങ്ങൾ ഏതൊക്കെ?
 - (iii) ബാദിനാമ മുതൽ സൂര്യാംബൾ ധർമ്മ ശംഖദാപി താഴ്വരയിലൂടെ സഖ്യവിശുദ്ധയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഭൂരൂപസവിശേഷതകൾ എന്തെല്ലാമായിരിക്കും?
 4. പ്രോജക്ട്/പ്രവർത്തനം
 - (i) അറ്റലസിന്റെ സഹായത്തോടെ ഇന്ത്യയുടെ പട്ടിഞ്ഞാറ് അതിർത്തിയിൽ നിന്നും കിഴക്ക് അതിർത്തിവരെയുള്ള ഹിമാലയപർവ്വത കൊടുമുടികളുടെ പട്ടിക തയാറാക്കുക.
 - (ii) നിങ്ങളുടെ സംസാരത്തെ (പ്രധാന ഭൂരൂപങ്ങൾ കണ്ണഡത്തി), ഓരോ ഭൂപ്രദേശത്തും ജനങ്ങൾ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സാമ്പത്തികപ്രവർത്തനങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യുക.



J4B9M7

കുറഞ്ഞ കുവയ്ക്ക് ഫോ

நான்னான்கள் அல்ல நாக்களிலுமென்று நாட்டுக்களிலும் என்று தீர்த்துமதிக்கிவிடக்கூடிய ஒருக்குணவு நினைவு நிர்ணயிக்கிறார்கள். முற பாவுகள் மறைத்திருக்குமாலே வலிய ஏவத்தோப்புக்கண்ணில் ஈங்களிலைக்குமானிருந்து, நிர்த்துமதிகள் குறைமானி விபரவுகளையொன்று நான் நான்பூர்வக்கரை சென்றுள்ள நான்நான்களிலைக்குமான்.

ନିର୍ମାଣ କ୍ଷାଣକାରୀଙ୍କରିବୁରେତେ ପଦ୍ମନାଭଙ୍କ ଶକ୍ତିକ୍ଷାଣକାରୀ ହେଲୁଛା? ନିର୍ମାଣକାରୀଙ୍କରିବୁରେ ଏହା କ୍ଷାଣକାରୀ ହେଲୁଛା? ଏହା କ୍ଷାଣକାରୀଙ୍କରିବୁରେ ଏହା କ୍ଷାଣକାରୀ ହେଲୁଛା? ଏହା କ୍ଷାଣକାରୀଙ୍କରିବୁରେ ଏହା କ୍ଷାଣକାରୀ ହେଲୁଛା? ଏହା କ୍ଷାଣକାରୀଙ୍କରିବୁରେ ଏହା କ୍ଷାଣକାରୀ ହେଲୁଛା?

പ്രധാന നീരോത്തിരുക്കുകളുടെ മാറ്റുകള് (Important Drainage Patterns)

പാശ്ചാത്യക്കാർ വാദം മുൻ ദയവുംതാണ് - പാശ്ച (NCERT, 2006) പുസ്തകത്തിലെ ഭാഷയിൽ അനുസ്ഥിതമായിരിക്കുന്ന ധാരാളം സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്.


Digitized by srujanika@gmail.com

3



வினா 3.1 : மத்தீன் வெள்ளுக்காட் மலை நீரி

சிறு நதிகளினால் வரையும்படியாக தீவிரமாக படித்து விடும் நதிகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன (Catchment area). ஏனென்றால் நதிகள் சிறு நதிகளினால் வரையும்படியாக தீவிரமாக படித்து விடும் நதிகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன (Catchment area).



നീർത്തടങ്ങളും മല്ലാരു നീർത്തടങ്ങിൽനിന്നും വേർത്തി തിക്കുന്ന അതിർത്തിയാണ് ജലവിഭാജകം (water divide). വലിയ നദികളുടെ വൃഷ്ടിപ്രദേശങ്ങളാണ് നദി തടങ്ങൾ (river basin). ചെറിയ നദികളുടെ വൃഷ്ടിപ്രദേശങ്ങൾ നീർത്തടങ്ങൾ (watershed) എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു.

നദിതടങ്ങളും, നീർത്തടങ്ങളും തന്ത്ര സംഭാവന വിശേഷതകളും ഉള്ളവയാണ്. ഇതിൽനിന്ന് ഒരു ഭാഗത്ത് നട കമ്പന പ്രവർത്തനത്തിൽനിന്ന് സ്വാധീനം മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലും അനുഭവപ്പെടുന്നു. അതിനാലാണ് ഈ സുക്ഷ്മ, സമാന്നം വിസ്തൃത, സറൂപ്തവ ആസൃതംമേഖല കളായി അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നത്.

ഇന്ത്യൻ നദീവ്യൂഹത്തെ വിവിധ രീതികളിൽ തരം തിരിക്കാം. നീരൊഴുക്കിൽനിന്ന് ദിശയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവരെ അബ്ദിക്കടക്കി നദീവ്യൂഹമെന്നും ബംഗാൾ ഉൾക്കടക്കി നദീവ്യൂഹമെന്നും തരംതിൽച്ചിട്ടുണ്ട്. ധർമ്മ മലനിർകളും, അരാവലി, സഹ്യാദ്രിമലനിർകളും ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ജലവിഭാജകമാണ് (Water Divide) ഇവയെ വേർത്തിക്കുന്നത് (ജലവിഭാജകം, ചിത്രം 2.2 തുടർന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു).

ഇന്ത്യയിലെ നീർത്തടങ്ങളുടെ മൊത്തം വിസ്തൃതി 77 ശതമാനവും ബംഗാൾ ഉൾക്കടക്കിലേക്കും ചുകുന്ന ഗംഗ, ബേഹമപുത്ര, കുഷ്ണ, കാവേരി, മഹാ നദി എന്നീ നദികളുടെ നീർത്തടങ്ങാണ്. വിസ്തൃതി യുടെ 23 ശതമാനം സിന്ധു, നർമദ, താപതി, പെതി യാർ തുടങ്ങിയ അബ്ദിക്കടക്കിലേക്കൊഴുകുന്ന നദികളുടെ നീർത്തടങ്ങളുമാണ്.

നീർത്തടത്തിൽനിന്ന് വലിപ്പിച്ചതു അടിസ്ഥാനമാക്കി നദി തടങ്ങളെ പ്രധാനമായും മുന്നായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു.

(i) പ്രധാന നദിതടങ്ങൾ (Major river basins)

20000 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ കൂടുതൽ വൃഷ്ടിപ്രദേശമുള്ള നദികളുടെ നദിതടങ്ങളാണിവ. ഗംഗ, ബേഹമപുത്ര, കുഷ്ണ, താപതി, നർമദ, മഹി, പെത്രാർ, സബർമതി, ബരക് (അനുഭവയം ട്രാക്കി) നദികളുടെ 14 നദികൾ ഈ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നു.

(ii) സാമാന്യം വിസ്തൃതിയുള്ള തദിതടങ്ങൾ (Medium river basins)

2000 മുതൽ 20000 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വരെ വൃഷ്ടിപ്രദേശമുള്ള നദിതടങ്ങളാണിവ. കാളിപ്പി, പെരിയാർ, മോൾന തുടങ്ങി 44 നദീവ്യൂഹങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

(iii) ചെറുതടിതടങ്ങൾ (Minor river basins)

2000 ചതുരശ്രകിലോമീറ്റർ കുറവ് വൃഷ്ടിപ്രദേശമുള്ള നദിതടങ്ങളാണിവ. മുച്ചുന്തപ്പരാജ്ഞങ്ങളിലെ ധാരാളം നദികൾ ഈ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നു.

ഇന്ത്യയിലെ നദികളുടെ ഭൂപടം (ചിത്രം 3.2) പതിശ്രാംക്ഷാൽ ചില നദികൾ ഹിമാലയപ്രദേശത്ത് ഉടല

വിച്ച് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലും ചില നദികൾ അബ്ദിക്കടക്കിയിലും ചെന്നുചേരുന്നതായി മനസ്സിലാക്കാം. ഉത്തരം കൂടുതിലെ നദികളും കണ്ണം കൂടുതലും ഉള്ളതാണ്.

ഉപദീപിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ വലിയ നദികൾ പശ്ചിമ ഘട്ട മലനികളിൽ നിന്നും വിച്ച് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ പതിക്കുന്നു. ഒക്സിജനേറ്റേറ്റീഫിലെ ഈ നദികളും കണ്ണം തുമ്പുമുള്ളു? ഇതിൽനിന്നും വിശിന്മാരി രണ്ട് പ്രധാന ഉപദീപിയ നദികളായ നർമദയും താപതിയും മറ്റൊക്കും ചെറു നദികളോടൊപ്പം അബ്ദിക്കടക്കിയിൽ ഏതെങ്കിലും നദികളും നിന്നും വരുന്നതുകൊണ്ട്.


കൊക്കൻ മുതൽ മലബാർ തീരം വരെയുള്ള പശ്ചിമ മതിരത്തുള്ള ഈ ചെറുനദികളും കണ്ണം തുമ്പുമുള്ളു.

ഉത്തരവരീതിയിട്ടുള്ള സാമാഖ്യപ്രത്യേകതകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ത്യൻ നദീവ്യൂഹത്തെ ഹിമാലയ യൻ നദികളും ഉപദീപിയ നദികളും വേർത്തിരിക്കുന്നു. ഹിമാലയത്തിൽ നിന്നും വിച്ച് ബംഗാൾ മറ്റു നദികളും ഉൾക്കടലിലും പ്രായത്തിലും പശ്ചിമമേരിയും ഇന്തിനാൽ ചന്തൽ, ബൈക്ക്, സോൺ എന്നീ നദികളും ഈ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടുകൂടിയായും ഇത് പൊതുവേം അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നതുമുണ്ട്. അതിനാൽ ഈ വർഷികൾ നിരണ്ടിതിയാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ അനുഭവർത്തിക്കുന്നത്.

ഇന്ത്യയിലെ നീരൊഴുക്കു വ്യൂഹങ്ങൾ

ചെറുതും വലുതുമായ ധാരാളം നദികൾ ചേർന്നാണ് ഇന്ത്യൻ നീരൊഴുക്കുവ്യൂഹം രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. പ്രധാനപ്പെട്ട മുന്ന് ഭൂപക്ഷത്തിലിഭാഗങ്ങളുടെ പരിസ്ഥിതിപ്രകാരിയായും മരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വർഷങ്ങളിൽനിന്ന് സ്വാധീനം വിശേഷതകളുടെയും മഹാമാരിയും മുഖ്യമായും ഉൾപ്പെടുന്നത്. മഴയിൽനിന്നും, മരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജലം ലഭിക്കുന്നതിനാൽ ഇവ വറ്റാതെ നദികളാണ് (Perennial Rivers). ഹിമാലയപർവ്വതം ഉയരതുന്നതിനോടൊപ്പം നദികളുടെ അപരദനപ്രകാരിയതും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

നീം ഉമച്ചിത്രകാലത്തിലും പരിസ്ഥിച്ചവയാണ് ഹിമാലയൻ നീരൊഴുക്കുവ്യൂഹം. ഗംഗ, ബേഹമപുത്ര, സിന്ധു നദികളാണ് ഇതിൽ മുഖ്യമായും ഉൾപ്പെടുന്നത്. മഴയിൽനിന്നും, മരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജലം ലഭിക്കുന്നതിനാൽ ഇവ വറ്റാതെ നദികളാണ് (Perennial Rivers). ഹിമാലയപർവ്വതം ഉയരതുന്നതിനോടൊപ്പം നദികളുടെ അപരദനപ്രകാരിയതും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.



ചിത്രം 3.3 : ചെറുതും വലുതുമായ നദികളും നദികളും അബ്ദിക്കടക്കിയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

തിരുത്ത് ഫലമായി രൂപപ്പെട്ട ആഴമേറിയ ഗ്രിക്കർ അഞ്ചില്ലുടെ (George) മുത നദികൾ ഒഴുകുന്നു. ആഴമേരിയ ഗ്രിക്കർ രണ്ടെണ്ണെള്ളു കുടാതെ പർവതഭാഗത്ത് ഇവ, 'V' രൂപതാഴവര, ചെറിയെവള്ളുച്ചാട്ടം (rapid), വൈളച്ചാട്ടം തുടങ്ങിയ ഭൂരൂപങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കുന്നു. സമതലങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നേഡശി ഇവ നിക്ഷേപണ ഭൂരൂപങ്ങളായ വിന്റുതമായ താഴവരകൾ, ഓക്സ്-ബോ-തടാകം (ox-bow-lake), പ്രളയസമതലങ്ങൾ, ദബ്ദത്യാധി (പിണ്ണാൽ) ചാലുകൾ (braided channels) തുടങ്ങിയ വയ്ക്കുന്ന നദിമുഖങ്ങളിൽ ധരിട്ടുകളും നിർമ്മിക്കുന്നു. ഹിമാലയൻ പർവതപ്രദേശത്ത് ശക്തമായി ഒഴുകുന്ന ഇവ സമതലങ്ങളിൽ വളരെപ്പറ്റിയൊരുക്കുന്ന തുടർച്ചയായി ഗതിമാറി ഒഴുകുകയും ചെയ്യുന്നു.

'ബിഹാറിന്റെ ദുഃഖം' എന്നറിയപ്പെടുന്ന കോസി നദി ഇടയ്ക്കിടെ ഗതിമാറി ഒഴുകുന്നതിൽ കൂപ്പനിഖിലമാണ്. കോസി നദി പർവതത്തിന്റെ മുകൾഭാഗങ്ങളിൽനിന്നും വഹിച്ചുകൊണ്ടുവരുന്ന അവസാനങ്ങൾ സമതലങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു. മുത്ത് നദിയുടെ പൊത തന്നെപ്പെടുത്തുകയും ഗതിമാറി ഒഴുകുന്നതിൽ കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. പർവതഭാഗങ്ങളിൽനിന്നും ഇത്രയധികം അവസാനങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കുന്ന കോസി നദി വഹിച്ചുകൊണ്ടുവരുന്നത്? നദികളിലെ നീരോഴുക്കിന്റെ അളവ് പ്രത്യേകിച്ചും കോസി നദിയിൽ എല്ലായ്പോഴും ഒരേപോലെയാണോ? അതോ ഇതിന് ഏറ്റുകൂടുച്ചിലുകൾ സംഭവിക്കുന്നാണോ? എപ്പോഴാണ് ഒരു നദിക്ക് ഏറ്റവും കുടുതൽ ജലം ലഭിക്കുന്നത്? എന്തെല്ലാമാണ് പ്രളയത്തിന്റെ അനുകൂലവും പ്രതികൂലവുമായ ഫലങ്ങൾ?

ഹിമാലയൻ നീരോഴുക്കിന്റെ പരിണാമം

ഹിമാലയൻ നദികളുടെ പരിണാമത്തെ സംബന്ധിച്ച് വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.

ഭൂവിജന്തനാനീയ ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ 5 മുതൽ 24 ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പ് മധ്യാസ്ഥി (ഫണ്ടേറേറ്റേറിംഗ് ഓഫ് ഹിസ്കിരി ജോഡിപ്പി, പാരം-2, ഭൂവിജന്തനാനീയ കാലഗണന പട്ടിക നോക്കുക, NCERT-2006) കാലാല്പദ്ധത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒഴുകിയിരുന്ന ഇന്തോബൈഹാമ അമ്മവാ ശിവാലിക് എന്ന ഒരു ബൃഹത്തന്ത്രിയിൽനിന്നുമാണ് ഹിമാലയൻ നദികൾ പരിണാമിച്ചത്. ഹിമാലയത്തിന്റെ അടയയും നീളത്തിൽ അസം മുതൽ സിന്യ് വരെ ഒഴികിയിരുന്ന ശിവാലിക് നദി പ്രജ്വലിക്കുന്നത് സിന്യ് ശർപ്പിൽ ഒഴുകിയത്തിയിരുന്നു. ഈ ബൃഹത്തന്ത്രിയിൽനിന്നും തുടർച്ചയും, അതിന്റെ തകാകസംബന്ധമായ (Lucastrine) ഉത്തരവും, നദിയുടെ എക്സൽ നിക്ഷേപങ്ങളായ മണം, കളിമൺ, ഉരുളൻ കല്ലുകൾ, കൺഫ്രോമറേറ്റ് (Conglomerite) എന്നിവയെല്ലാം ഇവ വാദഗതിക്ക് ബലംനൽക്കുന്നു.

കാലുക്കമേണ ഇൻഡോബൈഹാമ നദി മുന്ത് നീരോഴുക്ക് വ്യൂഹങ്ങളായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് അഭിപ്രായമുള്ളത്.

- പരിഞ്ഞാർ സിന്യുനിയും അതിന്റെ അഞ്ചു പോഷകനദികളും
- മധ്യഭാഗത്ത് ഗംഗാനദിയും ഹിമാലയൻ പോഷകനദികളും
- കിഴക്ക് ദബ്ദപുത്രതന്ത്രിയുടെ അസാമിലെ ഭാഗ അള്ളും അതിന്റെ ഹിമാലയൻ പോഷകനദികളും

സിന്യുഗ്രംഗാ നദികൾക്കിടയിൽ ജലവിഭാജകമായ - പോര്ത്താർ പിരിബുമി (ധരിപ്പി റില്യജ്) ഉൾപ്പെടുന്ന പശ്ചിമഹിമാലയത്തിന്, പ്ലീസ്റ്റാസിൻ കാലാല്പദ്ധത്തിൽ സംഭവിച്ച ഉത്മാനമായിരിക്കും (upheaval) ഇതുര തരിക വിഭജിക്കപ്പെട്ടതിന് കാരണമായത്. അതുപോലെ മധ്യ-പ്ലീസ്റ്റാസിൻ കാലാല്പദ്ധത്തിൽ മേഖലാലയ പീറി ദുമിയക്കും രാജ്മഹൽ കുന്നുകൾക്കുമിടയിലുള്ള മഡി വിഭവിരു (farp) താർത്തപ്പുടൽ (down thrusting) ഗംഗാ-ദബ്ദപുത്ര നദികളെ ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ ഭാഗത്തെക്ക് വഴിതിരിച്ചുവിടാൻ കാരണമായി.

ഹിമാലയൻ നീരോഴുക്കിലെ നീരീവ്യൂഹങ്ങൾ

ഹിമാലയൻ നീരോഴുക്കിൽ അനേകം നീരീവ്യൂഹങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്, എക്കിലും പ്രധാനപ്പെട്ടവ ഇവ യാണ്;

സിന്യു നദീവ്യൂഹം

ലോകത്തിലെ വലിയ നദീതടങ്ങളിലീലാനായ സിന്യുനിത്തം 1165000 ചതുരശ്രകിലോമീറ്റർ വിന്റു തിയും (ഇന്ത്യയിൽ 321289 ചതുരശ്രകിലോമീറ്റർ) 2880 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യവുമുള്ളതാണ് (ഇന്ത്യയിൽ 1114 കിലോമീറ്റർ). ഇൻഡ്യൻ എന്നും അൻഡ്രെപ്പെടുന്ന സിന്യു നദി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പട്ടണത്താരായി ഒഴുകുന്ന ഹിമാലയൻ നദിയാണ്. ടിബറ്റിലെ കൈലാസ പർവത തിരിൽ സമുദ്രനിരപ്പിൽനിന്നും 4164 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ സാരിതിചെയ്യുന്ന ബൊക്കർച്ചുവിനടക്കുള്ള ഒരു ഹിമാലയിൽ (31° 15' വടക്ക് അക്ഷാംശം 80° 41' കിഴക്ക് ഭേദാംശം) നിന്നുമുതൽവിക്കുന്ന സിന്യുനി ടിബറ്റിൽ സിംഹത്തിന്റെ മുഖം എന്നാർമ്മമുള്ള 'സികി കവൻ' എന്നാണെന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ലഡാക്കിനും സംസ്കർണ്ണ പർവതനിരയ്ക്കും ഇടയിലും വടക്കുപടിഞ്ഞാറ് ദിശയിൽ ഒഴുകുന്ന നദി ലഡാക്കും ബാൾട്ടിനുമുകുന്നും കടക്കുന്നു. ലഡാക്ക് പർവതനിരയ്ക്ക് കുടുംബക്കുടുമ്പം ആഘാതികൾ ശിൽക്കര (George) താർവര സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ദാർഭി സഹാൻ പ്രദേശത്ത് ചില്ലാർട്ടനടുത്ത് സിന്യുനി പാകി സഹാനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. ദാർഭിസഹാൻ എന്നാണ് തലപ്പെടുന്ന പ്രദേശം കണ്ണടത്തുകുക.

സിന്യുനി ഇന്ത്യൻ ജനുകാർമ്മിലെ ‘വേ’ ജീലു റിലൈറ്റ് മാത്രമേ ഒഴുകുന്നുള്ളൂ. ഇതിനിടയിൽ ധാരാളം ഹിമാലയൻ പോഷകനദികൾ സിന്യുവിൽ ചേരുന്നുണ്ട്. ഐഡയോക്, ശിത്ശിത്, സംസകർ, ഹൃസ്ത, നുബേ, ശിവർ, ഗസ്തിൽ, ശ്രാസ് എന്നിവ അവയിൽ പ്രധാനമാണ്. ഹകിസുഗാനിലെ അറോക്കിൽവച്ച് നദി പർവ്വത താഴിന് പുറത്തെത്തുന്നു. ഇവിടെവച്ച് വലതു തീരത്തു നിന്നും കാബുൾ നദിയെ സീക്രിക്കുന്നു. വലതു തീരത്തു ചേരുന്ന മറ്റ് പ്രധാന പോഷകനദികളുണ്ട് ബുറാ, എച്ചി, ശോമാൽ, വിഭേദം, ശകർ എന്നിവ. ഈ ദൈല്ലാം സുലേമാൻ മലനിരകളിൽ നിന്നുമുട്ടെവിക്കു നാവയാണ്. വീണ്ടും തെക്കുഭാഗത്തെക്ക് ഒഴുകുന്ന നദി യിൽ മിമാൻസകോടിന് മുൻപായി പഞ്ചനദികൾ ചേരുന്നു. റൈലും, ചിനാബ്, രവി, ബിയാസ്, സത്തലജ്ജ് എന്നീ അവയും നദികൾ ചേരുന്നാണ് പഞ്ചനദികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. കരാച്ചിക്ക് കിഴക്കായി സിന്യുനി അംബിക്കു ദിൽ ചേരുന്നു.

സിന്യുനിയുടെ ഒരു പ്രധാന പോഷകനദിയായ തലം കാർശ്മിൽ താഴ്വരയ്ക്ക് തെക്കുകിഴക്കായി സിനിതിചെയ്യുന്ന പിർപ്പുര മലനിരകളുടെ താഴ്വരാ ഒത്ത് ‘വെറ്റിനാർ’ നീരുവയിൽനിന്നുണ്ട് ഉടെവിക്കു നത്. ശ്രീനഗർലൂപതയും വുലർ തടാകത്തിലൂപതയും ഒഴുകുന്ന റൈലും ആഴമേറിയതും ഇടുങ്ങിയതുമായ ശിക്കനു താഴ്വര (ഓഫ്) കളിലൂടെ പാകിസുഗാനിലെ ഡാബിനടുത്ത് വച്ച് ചിനാബ് നദിയുമായി ചേരുന്നു.

സിന്യുവിലേറ്റ് ഏറ്റവും വലിയ പോഷകനദിയാണ് ചിനാബ്. ചുരുക്ക് അഡ എന്നും പേരുള്ള രണ്ട് അരു വികൾ ഹിമാചൽപ്പരാശരിലെ കിലോമീറ്ററുകുത്ത് താനി യിൽ സംഗമിച്ച് രൂപപ്പെടുന്നതിനാൽ ചിനാബ് ചുരുക്കാഡ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. പാകിസ്ഥാനിലെത്തുംമുമ്പ് ഈ നദി 1180 കിലോമീറ്റർ ദൂരം ഒഴുകുന്നു.

സിന്യുനിയുടെ മഹാരൂ പ്രധാന പോഷകനദിയായ ‘രവ്’ ഹിമാചൽപ്പരാശരിലെ റോഹതാംഡ് ചുരുത്തിന് പടിഞ്ഞാറായുള്ള കുല്ലുക്കുന്നിൽ നിന്നുമുട്ടെവിച്ച് ചുവ താഴ്വരയിലൂടെ ഒഴുകുന്നു. പിർപ്പുര, ധരഭായർ പർവ്വതനിരകളുടെ തെക്കുകിഴക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിലൂടെ ഒഴുകി പാകിസുഗാനിലെ സരായ് സിഖുവിൽവച്ച് ചിനാബ് നദിയിൽ ചേരുന്നു.

സിന്യുനിയുടെ മഹാരൂ പോഷകനദി ബിയാസ് സമുദ്രനിരപ്പിൽനിന്നും 4000 മീറ്റർ ഉയരത്തിലൂള്ള റോഹതാംഡ് ചുരുത്തിൽ ബിയാസക്കുണിൽനിന്നും ഉടെ വികുന്നു. കുല്ലു താഴ്വരയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ബിയാസ് നദി ഒരുംബ പർവ്വത കുളത്തിൽനിന്നും സുഷ്ടിക്കുന്നു. പഞ്ചാബ് സമതലത്തിൽ കടക്കുന്ന നദി ഹരി കെയ്ക്കുന്നത് സത്തലജ്ജ് നദിയുമായി സന്ധിക്കുന്നു.

ടിവെറ്റിലെ മാനസരോവ തടാകത്തിനടുത്ത് 4555 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ‘രാകാൻ’ തടാക

താഴിൽ നിന്ന് ഉടെവിക്കുന്ന സത്തലജ്ജ് നദി അംബിക്കു ‘ലംഗ്പചൻ വാബാബ്’ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ഇന്ത്യ റിലോക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിനുമുമ്പൊളി ഏകദേശം 400 കിലോമീറ്ററോളം സിന്യുവിൽക്ക് സമാനരൂപമായി ഒഴുകുന്ന സത്തലജ്ജ് രൂപവാിൽ ശിത്ശിക്കരണങ്ങൾക്ക് പുറത്തെതുന്നു. ഹിമാലയത്തിലെ ഷിപ്പകി ലാ ചുരും കടന്ന പഞ്ചാബ് സമതലത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന സത്തലജ്ജ് ഒരു പുർവ്വകാലീന (Antecedent) നദിയാണ്. ഒക്കാനംഗൽ ജലപദ്ധതിയുടെ കനാൽ വുച്ചുത്തിൽ ജലം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനാൽ സത്തലജ്ജ് സിന്യുനിയുടെ ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോഷകനദിയാണ്.

ശംഗാ നദിപ്പുഷ്ടം

നദിതടത്തിൽ പ്രത്യേകതയാലും, സംസ്കാരിക മായ പ്രാധാന്യത്താലും ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന പ്രധാന നദിയാണ് ശംഗ. ഉത്തരവാണിലെ ഉത്തരകാശി ജില്ലയിലെ, ഗംഗേംതൃപ്പിമാനിക്ക് സമീപമുള്ള ശോമുവിൽ (300 മീറ്റർ) നിന്ന് ഒരു ചെറു അരുവിയായി ഉടെവിക്കുന്ന ശംഗ ഇവിടെ ലാഗൈരമി എന്നറിയപ്പെടുന്നു. മധ്യഹിമാലയത്തിലും ലാസ്റ്റർഹിമാലയത്തിലും ലാഗൈരമി ഉടുങ്ങിയ ശിത്ശിക്കരണങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദിച്ചുകൊണ്ട് ഒഴുകുന്നു. പെരിനാമിനുമുകളിൽ സഭതാപാന്ത ഹിമാനിക്കിരിക്കുന്നും ഉടെവിക്കുന്ന അളക്കന്ന ലാഗൈരമി നദിയുമായി ഭേദപ്രയാഗിൽ സംഗമിക്കുന്നു, ഇതിനുശേഷമാണ് ശംഗ എന്ന പേരിലറിയപ്പെടുന്നത്. യൂളിഗംഗ്, വിഷണുഗംഗ എന്നീ അരുവികൾ ജോഷിമരിലെ വിഷണുപ്രയാഗിൽ കൂടിപ്പേരുന്നാണ് അളക്കന്നയായിമാറുന്നത്. അളക്കന്നയുടെ മറ്റ് പോഷകനദികളായ പിണ്ഡാർ കർണ്ണപ്രയാഗിലും മാനാകിനി അല്ലെങ്കിൽ കാളിഗംഗ രൂപപ്രയാഗിലും അളക്കന്നയുമായി ചേരുന്നു.

നിംബർക്കരിയാമോ?

അഞ്ചിയന്തിരായ ശംഗയിലെ മലനിരകൾഞ്ഞ ഫലപ്രഭാവായി കുറയ്ക്കുക, നദിയുടെ പുനരുജ്ജീവനം എന്നീ ഇടതു ഉദ്ദേശ്യപ്രക്ഷേപങ്ങളോടെ “പതാകാ വാഹക പദ്ധതിയായി” 2014 ജൂൺ 1 ഭാരത സർക്കാർ അംഗീകരിച്ച് ഒരു സംഘയാജിത സംരക്ഷണ ഉദ്യമമാണ് ‘നമാംി ശംഗ’ പദ്ധതി.

നമാംി ശംഗ പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ദേശ്യ ലക്ഷ്യങ്ങൾ:

- മലനിരകൾ രൂപീകരണ സംവിധാനങ്ങൾ
- നദീമുഖ വികസനം
- നദി ഉപരിതല ശൈലീകരണം
- ജൈവവൈവരിക്കൽ
- വനവൽക്കരണം
- പചാതുജന ബോധവൽക്കരണം
- വൃജനായങ്ങളിൽനിന്നും പുരാതനത്തുന്ന മാലിന്യങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണം
- ശംഗാഗ്രാമം

ഈ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുന്നതിന് <http://nmieg.nic.in/NamamiGanga.aspx> എന്ന വേബ് സൈറ്റ് സന്ദർഭിക്കാവുന്നതാണ്.

ഹിന്ദിവാസിൻ്റെവച്ച് സമതലത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന ഗംഗ തുടക്കത്തിൽ തെക്കുഭിശയിലും പിന്നീട് തെക്കു കിഴക്ക് ദിശയിലും ഒരുക്കി ഫൂളി, പത്ര എന്നീ ഒക്കവ ശീകളായി പിരിയുന്നതിന് മുമ്പ് കിഴക്കുഭിശയിൽ ഒരു കുന്നും ഉത്തരാവണ്ണം, ഉത്തർപ്പദ്മൻ, ബിഹാർ, പശ്ചിമബംഗാൾ എന്നീ സംഖ്യാനങ്ങളിലും 2525 കിലോ മീറ്റർ ദൂരം ഒരുക്കുന്ന ഗംഗയുടെ നദിതട്ടത്തിന് ഇന്ത്യയിൽമാത്രം 8.6 ലക്ഷം ചതുരശ്രകിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതിയുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദിവുഹമായ ഗംഗാനദിവുഹത്തിൽ വടക്ക് ഹിന്ദാലയപർവതത്തിൽനിന്നും, തെക്ക് ഇന്ത്യൻ ഉപദീപിൽനിന്നും ഉത്തരവിക്കുന്ന വസ്ത്രാത്മക്കു (Perennial), വർഷപ്പുരകുന്നതുമായ (Non-perennial) ധാരാളം നദികൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഗംഗാ നദിയുടെ ഒരു പ്രധാന വലതുതീരം പോഷകനദിയാണ് സോണർ. പ്രധാന ഇടതുതീരം പോഷകനദികളാണ് രാഘവൻ, ഗോമതി, അലാഹ്പർ, ഗണ്യക, കോൺഡി, മഹാന എന്നീവി. സാഹർ ദിവിനടക്കത്തുവച്ച് ഗംഗാനദി പംഗാൾ ഉൾക്കെടുത്തുവച്ച് പതിക്കുന്നു.

ഗംഗാനദിയുടെ ഏറ്റവും വലുതും ഏറ്റവും പട്ടണത്താരുദ്ധരയിലും ഒരുക്കന്നതുമായ പോഷകനദിയാണ് യമുന. ഉത്തരാവണ്ണിലെ ബന്ധേൻപ്പും മലനിരകളുടെ (6316 മീറ്റർ) പട്ടണത്താരിൽ ചരിവിലുള്ള യമുനോടു ഹിന്ദാനിയിൽ നിന്നുമുത്തേവിക്കുന്ന യമുന പ്രധാനിൽ (അലഹബാദ്) വച്ച് ഗംഗാനദിയുമായി സംഗമിക്കുന്നു. ഉപദീപിയ പീറോളിത്തിൽനിന്നും ആരംഭിക്കുന്ന ചബർ, സിന്യ, ബേത്വ എന്നീ നദികൾ വലത് തീരത്തുനിന്നും യമുനയിൽ ചേരുവേംഡ്, ഹിദൻ, റിം, സൈകർ, വരുണ എന്നീവ ഇടതു തീരത്തുനിന്നും വന്നുചേരുന്ന യമുന യുടെ പോഷകനദികളാണ്. കിഴക്കു പട്ടണത്താരിൽ ഗംഗാ തടങ്കിലും ആഗ്രാക്കനാലിലും തുള്ള ജലസേചനത്തിനായും യമുനയിലെ ജലം വർത്തോത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

യമുനാനദി ഒരുക്കുന്ന സംഖ്യാനങ്ങൾ കുറഞ്ഞതുകൂടും

ചുവൽനദി മധ്യപ്രദേശിലെ മാർവാപീംബുമിയിൽ ‘മാ’ വിനടക്കത്തായി ഉത്തരിക്കുന്നു. വടക്കേഞ്ച് ഒരുക്കുന്ന ചുവൽ രാജാധാനിയിലെ ‘കോട്’ തുടർന്നു മുൻപായി ശിരിക്കുന്നതുവരെയിലും ഒരുക്കുന്നു. ശാംഡിസാർ ഡാം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതിവിശദ്യാണ്. കോട്ടയിൽനിന്നും താഴെ ത്രാശ്വരി, ബുഡി, സബായ് മണ്ഡപുർ, ഡോർപ്പുർ എന്നീ പ്രദേശങ്ങൾ താഴെയി യമുനയിൽ ചേരുന്നു. ചുവൽനദി ചുവൽ റവേൻസ് (Ravines) എന്ന റിയൽ പ്രപ്രടുന്ന നിഷ്പമലഭ്യപ്രദേശം (Bad Land) ആപ്രകൃതിയിലും ഒരുക്കുന്നു.

കാലിഗണ്യക്, ത്രിശൂരിഗംഗ എന്നീ രണ്ട് അരുവികൾ ചേർന്നതാണ് ഗണ്യക നദി. നേപ്പാൾ ഹിന്ദാലയത്തിലെ ധൗളഗിരിക്കും, ഏവരിന്റെ കൊടുമുട്ടിക്കും ഇട

ത്ക്കാണ് ഉത്തരവന്നുനാം. നേപ്പാളിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തുകൂടെ ഒരുക്കി ബിഹാരിലെ ചുവാരനിൽ ഇന്ത്യയിൽ കടക്കുന്ന ഗണ്യക പട്ടനയ്ക്കുത്ത് സോൻപുരിൽവച്ച് ഗംഗാ നദിയുമായി ചേരുന്നു.

‘ഹാപ്പച്ചുക്കോ’ ഹിന്ദാനിയിൽനിന്നുമാണ് അഭാവരനി ആരംഭിക്കുന്നത്. ടില, സൈതി, ബേൽ എന്നീ പോഷകനദികളുമായി ചേർന്ന് ഇവ നദി ശൈലപാനിയിൽ ആഴമേറിയ ഒരു റിതികനം സൂഷ്ടിച്ച് പർവതത്തിന് പുറത്തുനാം. ശ്രദ്ധയിൽവച്ച് ഗംഗയിൽ ചേരുന്നതിന് മുമ്പായി ശാരാനദി (കാളിഗംഗ) അഭാവപ്പരിഫലിൽ ചേരുന്നു.

ടിബറ്റിൽ ഏവരിന്റെ കൊടുമുട്ടിക്കു വടക്കുഭാഗത്തുനിന്നുമാണ് ഒരു പുൽവകാലീന (Ailocodon) നദിയായ കോസിയുടെ പ്രധാന അരുവി അരുണം ഉത്തരവിക്കുന്നത്. നേപ്പാളിൽ മധ്യഹിന്ദാലയം കടന്നതിനുശേഷം കിഴക്കുനിന്നും തമുഴകോസിയും പടിഞ്ഞാറുനിന്നും സോണകോസിയും പ്രധാന അരുവിയായ അരുണം മായി ചേർന്ന് സപ്തകോസിയായി മാറുന്നു.

ഗംഗവാർ കുന്നുകളിൽ ഗർബന്തയുടെ നിന്നുമുള്ളവിക്കുന്ന ഒരു ചെറുനദിയാണ് രാമഗംഗ. ശിവാലിക്കു മലനിരകൾ മുഴിച്ചുകൊന്നതിനുശേഷം തെക്കുപടിഞ്ഞാൻ ദിശയിലേക്ക് ഒരുക്കുന്നു. ഉത്തരപ്രദേശിലെ നജിബാബാ ദിനുത്തൻ സമതലാന്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന രാശം കന്നു ജിൽവച്ച് ഗംഗയുമായി കൂടിച്ചേരുന്നു.

ആമോദർനദി ചേരാട്ടാ നാർപ്പർ പീറോളിയുടെ കിഴക്കൻ അതിർത്തിയിൽ ദ്രാഹരതാഴവലയിലും ഒരുക്കി ഫൂളിനിയിൽ ചേരുന്നു. ബതാക്ക് നദി പ്രധാന പോഷകനദിയാണ്. ‘ബംഗാളിൻ്റെ ദുഃഖം’ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ദാമോദർവാലി കോർപ്പരേഷൻ എന്ന വിവിധാദ്ദേശ്യപദ്ധതിയിലും മലപ്രദമായി നിയന്ത്രിക്കാൻ സംയിച്ചു.

നേപ്പാൾ ഹിന്ദാലയത്തിലെ ‘മിലം’ ഹിന്ദാനിയിൽനിന്നുമുത്തേവിക്കുന്ന ശാരം അമവാ സാരയും നദി അവിടെ ഗോരിഗംഗ എന്നുമറിയപ്പെടുന്നു. ഇന്ത്യ - നേപ്പാൾ അതിർത്തിയിൽ കാളി അരുളുക്കിൽ ചരക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ശാരാനദി ഇവിടെ വച്ച് അഭാവം നദിയിൽ ചേരുന്നു.

ഗംഗയുടെ മറ്റാരു പോഷകനദിയായ മഹാനദിയാർജിലിൽ കുന്നുകളിൽ നിന്നുമുത്തേവിക്കുന്നു. ഇടതുകരയിലും പശ്ചിമബംഗാളിൽവച്ച് ഗംഗയിൽ ചേരുന്ന ദക്ഷാവിലത്തെ പോഷകനദിയാണ് മഹാനദി.

ഗംഗയുടെ തെക്കുനിന്നും ചേരുന്നവയിൽ ഏറ്റവും വലിയ പോഷകനദിയായ സോണം അമർക്കണ്ടം പീറോളിയിൽനിന്നും ഉത്തരിക്കുന്നു. പീറോളിയുടെ പാർശ്വഭാഗത്ത് തുടക്കിച്ചുരയായ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ടു സോണം പട്ടനയ്ക്കു മഹാനദി (Arrah) ദിക്ക് വച്ച് ഗംഗയിൽ ചേരുന്നു.

ബേഹമപുത്ര നദീവ്യൂഹം

മാനസരാവര തടാകത്തിനടുത്ത് കൈലാസപർവ്വ തത്തിലെ ചെമയും ദുഃഖ ഹിമാനിയിൽ നിന്നുമാണ് ലോകത്തിലെ വലിയ നദികളിലെല്ലാം ബേഹമപുത്ര ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. ദക്ഷിണ ടിബറ്റിലെ വരണ്ടും നിര പൂർണ്ണാത്മയ പ്രദേശത്തിലും ഏകദേശം 1200 കിലോ മീറ്റർ നീളത്തിൽ കിഴക്ക് ദിശയിൽ ഒഴുകുന്ന ബേഹമ പുത്ര ഇവിടെ സാങ്ഘോ (Tsangpo) എന്നാണിയപ്പെട്ടു നന്ന്. സാങ്ഘോ എന്നാൽ ശുശ്മികരിക്കുന്ന എന്ന സംഖ്യം. ടിബറ്റിലെ ഒരു പ്രധാന വലത് തീര പോഷക നദിയാണ് രക്കാനാംഗോ. മധ്യപരിമാലയത്തിലെ നൊബർവ് (7755 മീറ്റർ) പർവ്വതത്തെ മുൻപുരക്കാണ് ആദ്യ മേരിയ ദിരിക്കാൻ താഴ്വരയിലും ഒഴുകിയത്തിനുശേഷം മലയടിവാരത്ത് നദി സിംഗാം അല്ലെങ്കിൽ ദിമാംഗ് എന്ന റിയപ്പെട്ടുന്നു. ഈ നദി ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടക്കുന്നത് അരു സാചൽപ്രദേശിലെ സംബന്ധ പട്ടണത്തിന് പടിഞ്ഞാറു വച്ചാണ്. ടിബറ്റാംഗ് അമേരാ സിക്കാംഗ്, ലൂച്ചിൽ എന്നീ പോഷകനദികൾ ഇടത്തുനിന്നും ദിക്കാണിനോടു ചേരു നു. ഇതിനുശേഷമാണ് ഈ നദി ബേഹമപുത്ര എന്നറിയപ്പെട്ടുന്നത്.

അസം താഴ്വരയിലും 750 കിലോമീറ്റർ ദുരം ഒഴു കുന്നോൾ ബേഹമപുത്രയിൽ അനേകം പോഷകനദികൾ വന്നുചേരുന്നുണ്ട്. പ്രധാനപ്പെട്ട ഇടത്തുതീര പോഷകന ദിക്കളാണ് - ബർഹിപിഹിൻ, യൻസൻ, കലാൺ എന്നിവ. പ്രധാന വലതുതീര പോഷകനദികൾ സുഖാൻസിൻ, മാനന്, സാങ്കാഷ്, കാമേം എന്നിവയാണ്. ഇവയിൽ ടിബറ്റിൽ നിന്നുമുട്ടഭവിക്കുന്ന സുഖാൻസിൻ ഒരു പുർവ്വ കാലിന (Antecedent) നദിയാണ്. ഡ്യൂബിക്കടുത്തുവച്ച് ബംഗ്ലാഡേശിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന ബേഹമപുത്ര പിന്നീട് തെക്ക് ദിശയിലെല്ലാം ബംഗ്ലാഡേശിൽ വച്ച് തിന്ത നദി ബേഹമപുത്രയുമായി ചേർന്നതിനുശേഷം ജമുന എന്നറിയപ്പെട്ടുന്നു. പിന്നീട് ജമുന പത്രമയുമായി ചേർന്ന ബംഗാൾ ഉൾക്കൊളിൽ പതിക്കുന്നു.

ബേഹമപുത്ര വെള്ളപ്പുക്കണ്ണതിനും, തീരങ്ങപ്പ ദൈത്യത്തിനും, ഗതിമാനി ഒഴുകുന്നതിനും പേരുകേട്ട നദിയാണ്. കാരണം ഇതിന്റെ മിക്ക പോഷകനദികളും വളരെ വലിപ്പമുള്ളവയാണ്. വൃഷ്ടിപ്രദേശങ്ങളിൽ ശക്തമായ അളവിൽ മി ലഭിക്കുന്നതിനാൽ വളരെ കുടു തൽ അവസ്ഥാങ്ങൾ വഹിച്ചുകൊണ്ടുവരുന്നവയുമാണ്.

ഉപദീപിയ നീരോധുക്കുവ്യൂഹം

ഉപദീപിയ നീരോധുക്കുവ്യൂഹം ഹിമാലയയിൽ നീരോ ദൂക്കിനേക്കാൾ പഴക്കമുള്ളതാണ്. വിഹാലയയതും ആഴംകുറഞ്ഞതുമായ താഴ്വരകൾ, നദികളുടെ വളർച്ചയും പുർണ്ണമായ എന്നിവയിൽ നിന്നെല്ലാം ഇത് വ്യക്തമാണ്. ശക്തിമതിരത്തിനടുത്ത് സിനിതിചെയ്യുന്ന പശ്ചിമാലം പ്രധാന ഉപദീപിയ നദികളെ ബംഗാൾ ഉൾക്കൊളിലേക്കൊഴുക്കുന്നവ, അബ്ദിക്കൊളിലേക്ക് ഒഴു

കുന്നാവ എന്നിങ്ങനെ വേർത്തിരിക്കുന്ന ജലവിജ്ഞകമായി നിലകൊള്ളുന്നു. നർമ്മ, താപ്തി എന്നിവ ഒഴികെ മിക്ക ഉപദീപിയ നദികളും പടിഞ്ഞാറുനിന്നും കിഴക്കേണ്ട ഒഴു കുന്നവയാണ് ഉപദീപിയ നദികളും പടിഞ്ഞാമുള്ളതും നിന്നും ഉത്തര വികസന ചെയ്തി, സിന്യ്, ബാത്വ, സോൺ, കെൻ എന്നിവ താംസ്കാരിയപ്പെട്ടുനിന്നും ഉപദീപിയ നദീവ്യൂഹത്തിലെ മറ്റ് പ്രധാന നദികളാണ് മഹാന്തി, ഗോഡാവരി, കുപ്പം, കാരോം എന്നിവ. കുത്യുമായ തൽ, മിയാൻഡിഗുകളും അഭാവം, വറിപ്പോകുന്ന അവസ്ഥ എന്നിവ ഉപദീപിയ നദികളുടെ പ്രത്യേകതകളാണ്. ദ്രാഗതാഴ്വരയിലും ഒഴുകുന്ന നർമ്മ, താപ്തി എന്നിവ ഇതിൽനിന്നും വിശ്രാമാണ്.

ഉപദീപിയ നദീവ്യൂഹത്തിന്റെ പരിശാമം

മൂന്ന് പ്രധാന ഭൂചത്രകാല (Geological time) സംഭവങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയിലെ വർത്തമാനകാലത്തെ ഉപദീപിയ നദീവ്യൂഹങ്ങൾക്ക് രൂപംനൽകിയത്.

- (i) ടെർഷ്യറി മഹായുഗത്തിന്റെ ആരംഭങ്ങൾക്കിൽ ഉപദീപിയ പശ്ചിമപാർശ്വമേഖലയ്ക്ക് അവതലമം സംഭവിച്ചു. ഈ ഭാഗങ്ങൾ സമുദ്രത്തിനടീകിൽ മുണ്ടിപ്പോകുന്നതിന് കാരണമായി, അതോടൊപ്പം ഉപദീപിയ നദിവിജ്ഞകത്തിന് ഇരുപുറവുമുണ്ടായിരുന്ന സമമിതിയ (Symmetric) നദീക്രമത്തെ വികലമാക്കുന്നതിനും കാരണമായി.
- (ii) ഉപദീപിയ വടക്കൻ അതിരിനുണ്ടായ അവതല നവും ഹിമാലയപർവ്വതത്തിന്റെ ഉത്തമാനവും അതിന്റെ മലമായി ഉപദീപിലുണ്ടായ ട്രോഗ് (Trough faulting) രൂപീകരണവും. നർമ്മ, താപ്തി നദികൾ ഇരു ഭാഗത്തെങ്ങളിലും ഒഴുകുന്ന കയും യമാൻമ വിള്ളലുകൾ അവശിഷ്ട പദാർഥം അഞ്ചാൽ നിന്തക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തതിനാൽ ഇരു നദീതകങ്ങളിൽ കാരുമായ എക്കർജിക്കേഷപ അങ്ങോ ധരിട്ട് രൂപീകരണമോ കാണപ്പെടുന്നില്ല.
- (iii) ഉപദീപിയ വടക്കുപടിഞ്ഞാറ് ദിശയിൽനിന്നും തെക്കുകിഴക്ക് ദിശയിലേക്ക് നേരിയ തോതിലുള്ള ചാരിപ്പ് സംഭവിച്ചതിലും ഇരു മേഖലയിലെ മുഴു വൻ നദീവ്യൂഹങ്ങളുടെയും ദിശ ബംഗാൾ ഉൾക്കൊളിലേക്ക് ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടു.

ഉപദീപിയ നീരോധുക്കുവ്യൂഹം

ഉപദീപിയ നീരോധുക്കിൽ അനേകം നദികൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. അവയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതെ സംബന്ധിച്ച ലാലു വിവരങ്ങം ചുവരും ചേർന്നുണ്ട്.

ക്രാറ്റോസ്ലാഴിലെ റാൽപ്പുംജിലും നിലക്കാവ തീരത്തെ നിന്നുമാണ് മഹാനദിയുടെ ഉത്തരവം. ദെശിഷയിലും ഒഴുകുന്ന പടിഞ്ഞാമുള്ള കിഴക്കേണ്ട നദി നിന്നും 4.2 ലക്ഷം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതിയിൽ വൃഷ്ടിപ്രദേശവുമുണ്ട്.

നദിയുടെ കീഴ്വല്ലട്ടം മാത്രമെ നദിയാത്രയോഗ്യമായുള്ളൂ ഈ നദിത്തെത്തിൽ 53 ശതമാനം മധ്യപ്രദേശിലും ചെത്തിന്തിയിലുമായി വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്നു 47 ശതമാനം ഭാഗം ദൈഹികയിലാണ്.

എറുവും വലിയ ഉപദ്രവിയ നദിവ്യൂഹമായ ഗോദാ വൽ ഒക്സിജനും എന്നുമറിയപ്പെടുന്നു. മഹാരാഷ്ട്ര യിലെ നാസിക് ജില്ലയിൽനിന്നുത്തവിക്കുന്ന ഗോദാവരി ബെംഗാൾ ഉൾക്കൊളിൽ പതിക്കുന്നു. ഇതിൽ 40 പേശക നദികൾ മഹാരാഷ്ട്ര, ചെത്തിന്തിഗർജ്ജ്, അമൃഗ്ര പ്രദേശ്, മധ്യപ്രദേശ് എന്നീ സംസാരങ്ങളിലും ഒഴുകുന്നു. 1465 കിലോമീറ്റർ നീളത്തിൽ ഒഴുകുന്ന ഗോദാ വൽയുടെ വൃഷ്ടിപ്രദേശത്തിൽ വിന്റുതുതി 3.13 ലക്ഷം ചതുരശ്രകിലോമീറ്ററാണ്. ഇതിൽ 49 ശതമാനം മഹാരാഷ്ട്രയിലും 20 ശതമാനം മധ്യപ്രദേശിലും ചെത്തിന്തി ഡില്ലി ശേഷിക്കുന്ന ഭാഗം ആമൃഗ്രപ്രദേശിലുമായി വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്നു. പെൻഗഡ, മുഖാവതി, പ്രാഞ്ചൻിത, മൺജര എന്നിവയാണ് പ്രധാന പോഷകനദികൾ. പോളവാരത്ത് നദി മനോഹരമായ ശിതികൾ താഴ്വര സുഷ്ടിക്കുന്നു. ഇതിനു തെക്കുള്ള ഭാഗങ്ങൾ വലിയ തോടിൽ പ്രളയസ്ഥാപനുള്ളവയാണ്. ഡത്രോഭാഗങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ഗോദാവരി നദി നദിയാത്രയോഗ്യമായുള്ളത്. രാജമുദ്രിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നദി ധർത്ഥ നിർമ്മിച്ചു കൊണ്ട് ധാരാളം ശാഖകളായി പിരിയുന്നു.

കിഴക്കോട്ടാഴുകുന്ന ഉപദ്രവിയ നദികളിൽ ഒന്തു മഞ്ഞ വലിയ നദിയായ കുപ്പണ സഹ്യപുത്രിയിലെ മഹാബലേശ്വരിൽ നിന്നുത്തവിക്കുന്നു. 1401 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിലെഴുകുന്ന കുപ്പണയുടെ പ്രധാന പോഷകനദി കളാണ് കൊയ്തൻ, തുംഗദ്ര, ഭീമ എന്നിവ. കുപ്പണയുടെ വൃഷ്ടിപ്രദേശത്തിൽ 27 ശതമാനം മഹാരാഷ്ട്രയിലും 44 ശതമാനം കർണ്ണാടകത്തിലും 29 ശതമാനം ആമൃഗ്രപ്രദേശിലും തെലുങ്കാനയിലുമായാണ്.

കർണ്ണാടകത്തിലെ ഏകാദശ ജില്ലയിൽ ബൈഹി ഗ്രിക്കുന്നുകളിൽ (1341 മീറ്റർ) നിന്നുമാണ് കാവേരി നദി ഉത്തരവിക്കുന്നത്. 800 കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള നദിയുടെ നദിത്തൊ 81155 ചതുരശ്രകിലോമീറ്റർ വിന്റുതുതമാണ്. നദിയുടെ വൃഷ്ടിപ്രദേശത്തിൽ 42 ശതമാനം മഹാരാഷ്ട്രയിൽ - തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ മൻസുണ്ണണികാലത്തും കീഴ്ഭാഗങ്ങളിൽ - വടക്കുകിഴക്കൻ മൻസുണ്ണണികാലത്തിലും മുഴ ഭാഗിക്കുന്നതിനും മുൻ ഉപദ്രവിയനികിക്കുന്നതു അപേക്ഷിച്ച് വർഷത്തിലുണ്ടാണ്. നിരോധുകൾ കാര്യമായ എറുക്കു ചെറിയ ഉണ്ടാകാറില്ല കാവേരിത്തടത്തിൽ 3 ശതമാനം കേരളത്തിലും 42 ശതമാനം കർണ്ണാടകത്തിലും 56 ശതമാനം തമിക്കാട്ടിലുമാണ്. കബനി, ഭോഗി, അമരാവതി എന്നിവയാണ് പ്രധാന പോഷകനദികൾ.

അമർക്കണ്ട്യാക്ക പീറളുമിയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ ചരിവിൽ 1057 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽനിന്നുമാണ് നീർമ്മനഭാരം ഉത്തരവിക്കുന്നത്. വടക്ക് വിസ്യുപർവ്വതത്തിനും തെക്ക് സത്പുര പർവതത്തിനുമിടയിലുള്ള ദേശത്താഴ്വരയിലുണ്ടെങ്കുന്ന ഈ നദി മൻബിശൻിലെയിൽ മനോഹരമായ ശിതി

കന്ദരലാഴ്വര സുഷ്ടിക്കുന്നു. കുടാതെ ജബൽപുരിനു കുത്ത് യുവാന്തർ വെള്ളച്ചാടവും നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ടാണു കുന്നു. 1312 കിലോമീറ്റർ ഒഴുകി ബരുച്ചിൽ തെക്കായി 27 കിലോമീറ്റർ നീളത്തിൽ വിശാലമായ അഴിമുഖം (Estuary) സുഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് അരബിക്കുടിപ്പാഠിൽ പതിക്കുന്നു. 98796 ചതുരശ്രകിലോമീറ്റർ വൃഷ്ടിപ്രദേശമുള്ള നീർമ്മ ദന്തിയിലാണ് നർമാംസാരോഹി ഡാം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്.

നമാമി ഓവി നർമാം ഫൂന പേരിലുള്ള നർമാംനദി സംരക്ഷണ ഭാഗത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് സഹപാർവ്വക്കുമായി ചർച്ചചെയ്യുക.

പടിഞ്ഞാറോട്ടാഴുകുന്ന മല്ലറ്റരു പ്രധാന നദിയായ താപതി മധ്യപ്രദേശിലെ ബേദ്രൂൽ ജില്ലയിൽ മുൾതായിൽ നിന്നുമുത്തവിക്കുന്നു. 724 കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള താപതിനദിയുടെ നദിത്തൊ 64145 ചതുരശ്രകിലോമീറ്റർ വിന്റുതുമാണ്. താപതിനദിത്തൊ 64145 ശതമാനം മധ്യപ്രദേശിലും 15 ശതമാനം മധ്യപ്രദേശിലും ശേഷിക്കുന്ന 6 ശതമാനം ഗുജറാത്തിലുമാണ്.

അരാവലിക്ക് പടിഞ്ഞാറായുള്ള രാജസാന്നിദിലെ എറുവും വലിയ നദീവ്യൂഹമാണ് ലൂനി. പുഷ്കരിനിനുത്ത് നിന്നുത്തവിക്കുന്ന സരസവി, സബർമതി എന്നീ രണ്ട് ശാഖകൾ അരാവലി നിരകൾ കടന്ന് ശോവിന്റെയിൽ സംഗമിക്കുന്നതോടെ ലൂനി നദി രൂപംകൊള്ളുന്നു. ദക്ഷിണവരെ പടിഞ്ഞാറോട്ടാഴുകുന്ന ലൂനി പിന്നിട തെക്കുപടിഞ്ഞാറ് ദിശയിൽ സഞ്ചരിച്ച് റാൻ ഓഫ് കച്ചിൽ ചേരുന്നു. ഈ നദീവ്യൂഹത്തിൽ മശക്കാലത്തു മാത്രമാണ് നീരോഡാശുകൾ (ephemeral) ഉള്ളത്.

പടിഞ്ഞാറോട്ടാഴുകുന്ന ചെറുനദികൾ

അരബിക്കടലിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന മിക്കനികളും താരതമ്യനു ചെറുതുമാണ്. മുഖ്യപ്രദേശത്തിൽ മശക്കാലത്തു നുകുക്കാഡായിരിക്കും?

ഗുജറാത്തിലെ അമേലി ജില്ലയിൽ ദശകവയിൽ നിന്നുമുത്തവിക്കുന്ന ഷേത്രുണിജി മുത്തരമെരു ചെറു നദിയാണ്. ഭദ്ര നദി രജഞ്ചോട് ജില്ലയിലെ അന്താലി ശ്രമത്തിൽനിന്നുമാരംഭിക്കുന്നു. പബുമഹതി ജില്ലയിൽ വണ്ണാർ ശ്രമത്തിൽനിന്നുമാണ് ഭദ്ര നദി ആരംഭിക്കുന്നത്. സബർമതിയും മഹിയുമാണ് ഗുജറാത്തിലെ രണ്ട് പ്രധാന നദികൾ.

ഈ നദികളും നദിവ്യൂഹത്തിലെ പടിഞ്ഞാറോട്ടാഴുകുന്ന ദശകൾ കണ്ണംതുകൂട്ടുക.

നാസിക് ജില്ലയിലെ ത്രയംബക കുന്നുകളിൽ 670 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽനിന്നുമാണ് വെത്തൽ നദിയുടെ ആരംഭം. കാളിപ്പി നദി ബത്സംഭാം ജില്ലയിൽനിന്നും ആരംഭിച്ച് കാർവാൾ ഉൾക്കൊള്ളിപ്പാഠിൽ പതിക്കുന്നു. 161 കിലോമീറ്റർ ദൂരം ഒഴുകുന്ന വെക്കൽ നദി എന്നും ആരംഭിക്കുന്നതിനും കർണ്ണാടകത്തിലെ പടിഞ്ഞാറോട്ടാഴുകുന്ന ഒരു പ്രധാനനദിയാണ് ശരാവതി. ശിവമോത ജില്ലയിൽ നിന്നുമുത്തവിക്കുന്ന ശരാവതി

വർഷിനിൽ 220 ചതുരശ്രകിലോമീറ്റർ വൃഷ്ടിപ്രദേശമുണ്ട്.

നൂറ്റണ്ട് (ജോർ) വെള്ളച്ചാട്ടം ഏൽ നദിയിലെ നൗമൻ കണക്കുകൾ.

ഗോവയിലെ ഒരു പ്രധാന നദികളാണ് മൺഡോവി നദിയും ജുവാരി നദിയും.

കേരളത്തിലെ നീളമേറിയ നദിയായ ഭാരതപ്പുഴ ആന്തമല കുന്നുകളിൽ നിന്നുമുത്തവിക്കുന്നു. പൊന്നാനിപ്പുഴ എന്നുംനിയപ്പെട്ടുന്ന ഭാരതപ്പുഴയുടെ നദീതീരം 5397 ചതുരശ്രകിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതമാണ്. ഭാരതത്തെ കർണ്ണാക ടക്കയിലെ ശരാവതി നദിയുടെ വൃഷ്ടിപ്രദേശവുമായി താരതമ്യം ചെറുകൂട്ട. കേരളത്തിലെ രണ്ടാംതന്ത്ര വലിയ നദിയായ പെരിയാറിന് 5243 ചതുരശ്രകിലോമീറ്റർ വൃഷ്ടിപ്രദേശമാണുള്ളത്. ഭാരതപ്പുഴയുടെയും പെരിയാറിന്റെയും വൃഷ്ടിപ്രദേശ വിസ്തൃതിയിൽ നേരിയവൃത്ത്യാന്വാനുള്ളത്. കേരളത്തിലെ മറ്റാരു പ്രധാനനദിയായ പബ്യ 177 കിലോമീറ്റർ ഒഴുകി വേബു നാട് കായലിൽ പതിക്കുന്നു.

പട്ടണംനീരോഴുക്കു ചെറുതുകളുടെ പ്രത്യേകതകൾ അധ്യാപകർക്ക് വിശദിക്കിക്കുവെന്നുണ്ട്

നദി	വൃഷ്ടിപ്രദേശം (ച.കി.മീ.)
സബർമതി	21,674
മാൻ	34,842
ധാർഡ	2,770
കാളി നദി	5,179
ശരാവതി	2,029
ഭാരതപ്പുഴ	5,397
പെരിയാർ	5,243

പട്ടിക 3.1: ഹിമാലയൻനദികളുടെ ഉപഭൂപിശാസ്ത്രകളും തദ്ദീഖുള്ള താരതമ്യം

ക്രമ നം	സവിശേഷതകൾ	ഹിമാലയൻനദികൾ	ഉപഭൂപിശാസ്ത്രം
1.	ഉത്തരവസ്ഥാനം	ഹിമാനികൾനിംഠ ഹിമാലയപരിവര്ത്തം	ഉപഭൂപിശ പിംബുരിയും, മധ്യ ഉന്നതരകളും
2.	നീരോഴുക്കിന്റെ സ്വഭാവം	വർഷാന്തരം (perennial), ഹിമാനികളിൽ നിന്നും മഴക്കുന്നു വെള്ളം ലഭിക്കുന്നു	കാലികം (seasession), മണിസുഖം മഞ്ച ആശ്രാച്ചു
3.	നീരോഴുക്കിന്റെതാം	സമത്വപൂർണ്ണങ്ങളിൽ വൃക്ഷ ശൈഖ്യങ്ങൾ തിരിക്കുന്ന പുണിപക്കാവീര നീരോഴുക്ക്	ജാഹാതി (gracilis), കേരുപ്പാവ (radial), ചതുരകുട്ടി മാരുകകൾക്ക് കാരണമായ അധ്യാരോ ഹിത് (super imposed) പുനരുജജീവനിതികൾ
4.	നദികളുടെ പ്രക്രിയാ	നില്ക്കുന്ന ചാലുകൾ, ദുർഘടഭാര പർവ്വതങ്ങളിലൂടെ ഒഴുകുന്നും ശീർഷതലവിലൂടെ അപരാജിതം (headward erosion), നദി അപഹരണം, സമത്വങ്ങളിൽ വലയങ്ങൾ രൂപ ഫൂടൻ, നദിമാർജി ഒഴുകൽ ഏന്നിവ നിന്നുംവെച്ചുകൊണ്ടു	കുത്തുമാളി ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ട താഴവിൽ കുളംകുട്ടിയും, ചെറുതും, സാറിരതയുള്ളതുമായ ചാലുകൾ
5.	വൃഷ്ടിപ്രദേശം	പാലക്കാട് വിസ്തൃതമായ തദ്ദീഖം	താരതമ്യുന്ന വിസ്തൃതി കുണ്ടാര തദ്ദീഖം
6.	നദികളുടെ പ്രധാനം	താഴവിലെക്കുളുകൾ ആശം വർഷപ്പുക്കുന്ന മുകുതാസ്ഥാനത്തിലെ തീവ്രപരിഗണിക്കുന്ന നീരോഴുക്ക്	അപക്ഷയത്തിലൂടെ ഏതൊക്കുഹരാ നീപ്പായ തലത്തിൽ ഏതെങ്കിലൊന്ന് പ്രായാധിക്കു മുള്ളു നദികൾ

നവയല്ലാത്തതിനാൽ അവയുടെ നീരോഴുക്കുകുമ തതിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ അനുഭവപ്പെടുന്നു. മൺസൂൺ മിക്കാലതൽ നീരോഴുക്ക് ക്രമാനുഗതമായി വർധിച്ചുവരുന്നു. അതിനാൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക നീരോഴുക്ക് ക്രമം (regime) ലഭിക്കുന്ന മശയുടെ അളവ് വിന്റുസ്വത്തായി നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു. ഉപദ്വിപിയ പിം ടൂമിയിലെ മശല്ലുത ഓരോപ്രേഷണത്തും വൃത്യാസപ്പെടിക്കുന്നു.

നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ ഒരു നദിയിലുടെ ഒഴുകുന്ന ജലത്തിന്റെ അളവാണ് നീരോഴുക്കിന്റെ തോത് (discharge). ഈ ഒരു സെകന്റിൽ എത്ര ഘന അടി (cusecs - cubic feet per second) അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെകന്റിൽ എത്ര ഘനമീറ്റർ (cumeecs - cubic meters per second) എന്ന ഏകകത്തിൽ കണക്കാക്കുന്നു.

ഗംഗാനദിയിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നീരോഴുക്ക് ജനുവരി മുതൽ ജൂൺവരെയുള്ള കാലയളവിലണ്ട്. ആഗസ്റ്റ് - ഓസ്പ്പൽബർ മാസത്തിലുണ്ടിക്കും പുണ്ണായി നീരും ആക്ക് കാണുന്നത്. മശക്കാലത്ത് ഗംഗാനദിക്ക് മൺസൂൺകുമം ആയിരിക്കും. സെപ്റ്റംബർനീരോഴുക്കുമായി നീരോഴുക്കിൽ കുറവ് സംബന്ധിക്കുന്നു.

വേനലിന്റെ ആരംഭത്തിൽത്തന്നെ മണ്ണതുരുക്കുന്നതിനാൽ മൺസൂൺ മശ വരുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ ഗംഗാ നദിയിൽ വളരെ ശക്തിയായ നീരോഴുക്കുണ്ടാകുന്നു. ഫറാക്കയിൽ ഗംഗാനദിയിലെ ശരാശരി കുറവ് നീരോഴുക്ക് എത്താണ് 55000 കുപ്പസെക്കൻസാണ്. അതേസമയം ശരാശരി കുറഞ്ഞ നീരോഴുക്ക് വെറും 1300 കുപ്പസെക്കൻസുമാണ്. ഇത്തും വലിയ അന്തര്ത്തിന് കാരണമായ ലടക്കം എത്തായിരിക്കും?

ഹിമാലയൻ നദികളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്നോൾ ഒരു ഉപദ്വിപിയനദികൾ അവയുടെ നീരോഴുക്ക് ക്രമത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായ വൃത്യാസം കാണിക്കുന്നു. ജനുവരി മുതൽ ജൂൺ ശരാശരി വരെ നർമ്മദയിലെ നീരോഴുക്കിന്റെ അളവ് വളരെ കുറവായിരിക്കും. ഈ ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ വളരെ പെട്ടുന്ന് ഉയർന്ന് പരമാവധി അളവിൽ എത്തുന്നു. ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിലെ നീരോഴുക്കിന്റെ ഉയർച്ചയും ഒക്കെബൾ മാസത്തിലെ നീരോഴുക്കിന്റെ അളവിലെ താഴ്ചയും ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഗരുഡേശവരിൽ നർമ്മദയിലെ പരമാവധി നീരോഴുക്ക് 2300 കുപ്പസെക്കൻസ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നോൾ കുറഞ്ഞ നീരോഴുക്ക് 15 കുപ്പസെക്കൻസ് മാത്രമാണ്.

ഡാദാവൽ നദിയിൽ മെയ് മാസത്തിലാണ് ഏറ്റവും കുറവ് നീരോഴുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഏറ്റവും കുടുതൽ ജൂലൈ, ആഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളിലുമായിരിക്കും. ആഗസ്റ്റിനു ശേഷം നീരോഴുക്കിൽ വലിയതോതിലുള്ള കുറവുണ്ടോ കുമെക്കിലും ഒക്കെബൾവിലെയും, നവംബർവിലെയും നീരോഴുക്ക് ജനുവരി മുതൽ മെയ് വരെയുള്ള ഏതൊരു മാസത്തിലേതിനേക്കാലും കുടുതലായിരിക്കും. ഡാദാ വർത്തിയിൽ പോത്താവാത്തെ ശരാശരി ഉയർന്ന നീരോ

ചുക്ക് 3200 കുപ്പസെക്കൻസുമാണ്. അതേസമയം ശരാശരി കുറഞ്ഞ നീരോഴുക്ക് വെറും 50 കുപ്പസെക്കൻസ് മാത്രമാണ്. ഈ കണക്കുകൾ നീരോഴുക്കുകുമത്തെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

നദീജലത്തിന്റെ ഉപയോഗക്ഷമത

ഓരോ വർഷവും ഇന്ത്യൻ നദികൾ ഭീമമായ അളവിൽ ജലം വഹിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഇതിലോളം അല്ലവും കാലാഭ്യർക്കനുസരിച്ചും പ്രദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ചും വൃത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വർഷം മുഴുവൻ ജലസമ്പദുമായ വരുത്തു നദികളും അതേസമയം വരും കാലത്ത് വളരെ കുറവ് ജലംമാത്രമുള്ളതു എത്രയുള്ളതു വളിപ്പോകുന്ന നദികളും മുണ്ട്. വെള്ളപ്പൊക്കത്താലും കടലിലേക്കൊഴുകുന്നതിനാലും മിക്കാലാഭ്യർക്കനുസരിച്ചും അല്ലാം അതിന്റെ പ്രവാഹത്തിലെ വളരെയധികം ജലം പാശായി പോകുന്നു. അതുപോലെ രാജ്യത്തിന്റെ ഒരുഭാഗത്ത് പ്രളിയം സംഭവിക്കുന്നോൾ മറ്റൊരാഗത്ത് വരശ്രമുലം ക്ഷേണിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? ഈ ജലഭല്ലത്തിലെ കുറവുംകൊണ്ടോ അതേം അതിന്റെ പരിപാലനത്തിലെ തകരാറുകൊണ്ടോ?

രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഒരേസമയം പ്രളിയം വരശ്രമുലം സൂഷ്ടിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ലഭ്യുക തിക്കുന്നതിനായി ഫലപ്രദമായ മാർഗ്ഗങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കാമോ? ജലം അധികമായുള്ള നദിത്തടത്തിൽനിന്നും ജല ലഭ്യതകുറഞ്ഞ നദിത്തടത്തിലേക്ക് ജലം മാറ്റി കൊണ്ട് ഈ പ്രശ്നം ലഭ്യകരിക്കാണോ പരിഹരിക്കാണോ സാധിക്കുമോ?

മറ്റൊരുക്കിലും നദിത്തട സംരക്ഷണമായുള്ളകുകൾ നിങ്ങൾക്കുവരിയാമോ? (ഈ പാഠപ്പുസ്തകത്തിലെ അധ്യായം 7 കാണുക)

അധ്യാപകന് ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഉദാഹരണങ്ങൾ വിശദമാക്കാവുന്നതാണ്

- പെരിയാർ വഴിതിരിച്ചുവിടൽ പദ്ധതി
- ഇന്ത്രാഗാസി കനാൽ പദ്ധതി
- കർണ്ണാടക കഡപ്പ പദ്ധതി
- ബിക്കാസ്-സത്രലജ് സംരക്ഷണ കനാൽ
- ഗംഗാ-കാവേരി സംരക്ഷണ കനാൽ

നദികളുടെ തമിൽ ബഡിപ്പിക്കുന്നതിലെക്കുറിച്ച് പത്രങ്ങളിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഗംഗാതടത്തിൽനിന്നും ഉപദിവിപാതകളിലേക്ക് ജലമെത്തിക്കാൻ കേവലമൊരു കനാൽ നിർമ്മിച്ചാൽമാത്രം സാധിക്കുന്നതാണോ? പ്രധാനപ്രശ്നങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? ഈ പുന്തുക്കത്തിലെ 2-ാം അധ്യായത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഭൂപ്രോഗത്തിന്റെ നിർബിശ്വാസം മുംബം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രയാസങ്ങൾക്കും കണ്ണഡയും ജലം പീംഗുമിപ്പേരേണ്ടാണെന്നോ? സമതലപ്രദേശത്തെ ജലം പീംഗുമിപ്പേരേണ്ടാണെന്നോ? സാരിമായി ജലം മാറ്റുന്നതിന് ഉത്തരവേദ്യുൽ നദികളിൽ ആവശ്യത്തിലായിക്കം ജലമുണ്ടോ? ഈ മുഴുവൻ പ്രശ്നങ്ങളെത്തുടർന്നും സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഒരു സംവാദം സംഘടിപ്പിച്ച കുറിപ്പ് തയാറാക്കുക.

നുംകൊല്ല ഉപഭോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിറകുകൾ കുറഞ്ഞതാണ് സാധ്യതയും അതിനുശ്രദ്ധിച്ചു പഠിച്ചു നിരുത്തിയാൽ മാറ്റുന്നതും ഏതുവരുത്താൻ കൂടിയാണ്.

- (1) ജലവ്യതിരിലെ അപകടാവത്ത്
 - (2) നദികൾ മരിക്കാക്കണം
 - (3) നദിജലഭാരിൽ ഏറ്റവും കുറവായാണ്
 - (4) നീരേഖയ്ക്കിലെ കാലിക്കോള ദ്രവ്യങ്ങൾ കൃത്യം
 - (5) സമുദ്രഗംഗാജിൽ നാശിക്കുന്ന നദിജലഭാരിക്കളാണ്
 - (6) നദിക്കിട്ടാതെല്ലാം വാഹനഗംഗാജിൽ വസ്തുപരമായ സംശയം വരിച്ചുപറയുകയും ചെയ്യണാണ്

എന്നും കുറഞ്ഞും പരിപാലിക്കേണ്ടതുമെന്ന്? ഒരു മാസത്തിൽ എന്നും കുറഞ്ഞും പരിപാലിക്കേണ്ട രഹ്യക്രമം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? എന്നും സാധിക്കുമ്പോൾ എന്നും

ஊன் நிர்வாகப்படுவதாக? மலை தெருக்களைத் தாங்கினாலுமான், மாண்பும்போது பலாபுரை உதவுதலை ஏற்றிடுவதுக்குத் தயூந் பெற்றுள்ளா. பில எல்லாம் சுராத்துக் குளி புதுப்படுத்தும் விழியாகத்தும் நிதிகளில் நிதி அமைக்க பெற்றுள்ளது, வளிமனத்தில் வள்ளுதலை அமல்கருவது, குழுவெண்ணத்துவம் நிதிக்கு ஹரிமாப்புடுத்தின் காலனாக்குடை; நிதிக்கு ஹவிஸ்ட் அமைக்கலே ஸாயிக்குள்ளதாகவே? நிதைச் சுப்பா கந்தி பஸ்திலைப்படியோ அலாக்கின் வள்ளுதலை உடர்ந்து முயக்களைப்பயன்ப்பிடுத்துவிட்டோ வானி பீருவனா? நிதிக்கு ஹவிஸ்ட் முக்காலக்குருதிகளைத் தொழில் பயன்படுத்த வாணியில் பீருவன் கூறுவதாக.

Digitized by srujanika@gmail.com

1. வினாக்களை எண்ணால் எடுத்துக் கொள்ளுகிறீர்களா?

 - (a) மூன்றாம் (b) ஒன்றாம் (c) மூன்றாம் (d) ஒன்றாம்
 - (a) ஒரேயூனிஸ் எழுதுத் திட்டத்தை நிறைவேண்டியிருப்பது எனி
 - (a) சில்லா (b) ஒன்றாம் (c) மூன்றாம் (d) மூன்றாம்
 - (a) அவி (b) நிலை (c) பிரைட் (d) நிலை
 - (a) மூன்றாம் (b) ஒரேயூனிஸ் எழுதுத் திட்டத்தை எனி.
 - (a) மூன்றாம் (b) ஒரேயூனிஸ் (c) மூன்றாம் (d) ஒரேயூனிஸ்
 - (a) மூன்றாம் (b) ஒரேயூனிஸ் (c) மூன்றாம் (d) ஒரேயூனிஸ்
 - (a) மூன்றாம் (b) ஒரேயூனிஸ் (c) மூன்றாம் (d) ஒரேயூனிஸ்

2. அவைகள் நிறைவேண்டியிருப்பதை விட்டுக்கொண்டு கொண்டிருக்கிறார்கள்.

 - (a) பரிசீலனையும் பரிசீலனை.
 - (b) நிலைமொழியை நிறைவேண்டியிருப்பதை விட்டுக்கொண்டு கொண்டிருக்கிறார்கள்.
 - (c) சுற்றுப்பை நிறைவேண்டியிருப்பதை விட்டுக்கொண்டு கொண்டிருக்கிறார்கள்.
 - (d) நிறைவேண்டியிருப்பதை விட்டுக்கொண்டு கொண்டிருக்கிறார்கள்.

3. அவைகள் நிறைவேண்டியிருப்பதை விட்டுக்கொண்டு விட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் எனி விட்டுக்கொண்டு உண்மையை கண்டுகொண்டிருக்கிறார்களா?

 - (a) இரண்டாம் நிலைம் வைபிப்ரிசென்டையிலிருந்து விட்டுக்கொண்டு நிறைவேண்டியிருப்பதை விட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்களா?
 - (b) ஒப்பிப்பிடியை நிறைவேண்டியிருப்பதை விட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்களா?

4. அவைகள் படிகளைத்தோற்றுத் தொடர்புகளில் 125 மாண்பில் கடினமாகிய உண்மையை கண்டுகொண்டிருக்கிறார்களா?

 - (a) உண்மையை நிறைவேண்டியிருப்பதை விட்டுக்கொண்டு இவர் உபார்பிதா நிறைவேண்டியிருப்பதை விட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்களா?
 - (b) நிலைம் வைபிப்ரிசென்டை நிறைவேண்டியிருப்பதை விட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்களா? நிலைம் வைபிப்ரிசென்டை நிறைவேண்டியிருப்பதை விட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்களா? நிலைம் வைபிப்ரிசென்டை நிறைவேண்டியிருப்பதை விட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்களா?

Digitized by srujanika@gmail.com

கால்கால்யூப்பு மின் விளைவு கூடுதலாக இரண்டாவது முறையில் நிறைவேண்டும்.

യുണിറ്റ്

III

കാലാവസ്ഥ, സ്വാദാവികസ്ത്ര്യങ്ങളാൽ, മൃഗം

ഈ യുണിറ്റിൽ പരിച്ചെപ്പറ്റുന്നത്:

- സ്വാദാവിക സ്ത്രീരൂപ കാലാവസ്ഥയും – അനോന്ത ടോക്കിൾ, ഓഡ്, കാറ്റ്, റിഫ്ലിൻ വിഭവ സ്വാദത്തിലൂടെ കാലാവിക സ്ത്രീരൂപ വിശദമാണ്; ഇത്തും ദാർപ്പണം: പ്രാഥമിക കാലാവിക സ്ത്രീരൂപ, വായ്യാവിലും മുഖാവിലും സ്വാദാവിക കാലാവിക സ്ത്രീരൂപ, ഫോറോം പാരിസ്ത്രോഫിക്.
- സ്വാദാവികസ്ത്ര്യങ്ങളാൽ – റിഡിഷൻ, റിബേറ്റ്, റോംഗേസ് വിശദമാണ്, സ്വാദാവികസ്ത്ര്യങ്ങൾ ഒരു വിശദമാണ്.
- മൃഗം – പ്രധാന മൃഗിനാശം, അനുഭവം വിശദമാണ്, മൃഗിനും പാരിസ്ത്രോഫിക് വിശദമാണ്.



M8P5S4

കാലാവസ്ഥ

என்னை-வெகுடிகள் (vekudis) என் குறைநூல் வெ
ங்களைப் பார்வீச தாங்களே வெகுடி
கூடிய மூலமாக விரைவிற்காகவே விரைவு
ஒன்று நிர்வீச முன்வதிலோ வெகுடி
நிர்வீச-வெகுடிகளை வழங்குவதற்கு முக்கு
ங்களைக் கொடுவதற்கும் வகுப்பு என்று
கூறுகிறோம். என் வகுப்புக்குப் பின்னால் செய்த
ஏதுமிருந்து கொடுக்கப்படுவதற்கு வகுப்பு
ஏதுமிருந்து கொடுக்கப்படுவதற்கு வகுப்பு

ஈளமில்லை கிராக்டுரிப் குடித்துவாய்க்கதில் பரிசீலிக்கப்பட்டு? இன்னொன்று ஏற்ற பாதனாளிகளிடம் அங்கிலாந்தை? ஒத்துவாலி ஏராளமிடம் வழியா “காஸ்” ஏற்ற அளவில் பாதனாளிகளான் இன்னொன்று ஏற்ற வாசனை வெளியிடுவது. காலாண்மைகளுடையதிப்பூருத் கட்டிலில் தனிக்கூடாயும் சமீதி காலாண்மைக்கு காலாண்மையான் இன்னொன்று. முழு விளை என்னாலும்பூர்தாயாத் துச்சாண்மையான் காலாண்மையான்தான். வகைக் காலாண்மையான் எதும்குமிழியும் ஒத்துவாலிலிருத் தன்னொன்று காலாண்மையான் காலாண்மையான்.

ഒൻസുണ്ണർ കാലാവന്നമയിലെ ഏകത്വവും വൈദിക്യവും

கன்றுள்ள கலாசாரங்களில் மறையும் ஏத் தகவுகிறதல் எட்டுப்பால் பிரதிவிளை ஆராய்ச் சபையின் கலா

സമയത്തെ താപനില 50°C ആണെങ്കിൽ രാത്രി കാലത്ത് ഇത് ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞ് 15°C മുതൽ 20°C വരെ എത്തുന്നു.

ഇന്തിനുമുകള് വർഷാവസ്ഥയിലെ പ്രാദേശികവ്യത്യാസം മനസിലാക്കാം. ഫീമാലാലുപ്പദ്ധതിയും മണം വിച്ചചയും സഭാകുംഖാൾ രാജ്യത്തിന്റെ ശേഷിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ മഴ ലഭിക്കുന്നു. അതുപോലെ വർഷാവസ്ഥയിൽ തരങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല അതിന്റെ അളവിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ പ്രകടമാണ്. മേലാലയത്തിലെ വാസിക്കുന്നുകളിലെ ചീറപ്പുഡിയിലും മഴസിന്റീരാമിലും വർഷാവസ്ഥ 1080 സെൻ്റിമീറ്ററിൽ കുടുതൽ മഴ ലഭിക്കുമ്പോൾ, രാജ്യമധ്യ നിലെ ഒരു സാരിക്കുമീറ്റർ അപൂർവ്വമായി മാത്രമേ 9 സെൻ്റിമീറ്ററിൽ കുടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ.

മേലാലയത്തിലെ ഗാർഡകുന്നുകളിലെ 'ടു'യിൽ ഒരു ദിവസം മാത്രം ലഭിക്കുന്നത് ജൈത്യസാരിമീറ്റൽ 10 വർഷം ലഭിക്കുന്ന മഴയ്ക്ക് ഏകദേശം തുല്യമാണ്. പശ്ചിമഹിമാലയത്തിലും പട്ടണത്താറിൽ മരുഭൂമിയിലും വാർഷികവർഷപാതം 10 സെൻ്റിമീറ്ററിൽ കുറവായിരിക്കുമ്പോൾ മേലാലയത്തിൽ ഇത് 400 സെൻ്റിമീറ്ററിൽ കുടുതലാണ്.

ഒംഗാര ഡൽഫിനിലും ഓലൈപ്പ തീരസമതലത്തിലും, ജൂലൈ, ആഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളിലെ മുന്നൊമ്പത്തുനേരും അഞ്ചു മാസത്തുനേരും ദിവസങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴക്കാറുകൾ ലഭിക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം ആയിരം കിലോമീറ്റർ തെക്ക് മാറി കോറമാറ്റിൽത്തീരത്ത് പൊതുവെ വരണ്ട കാലാവസ്ഥയായിരിക്കും. രാജ്യത്തിന്റെ മിക്കഭാഗങ്ങളിലും ജൂൺ മാസത്തിനും സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിനും ഇടയിൽ മഴ ലഭിക്കുമ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിന്റെ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ മഴ ശീതകാലാരംഭങ്ങളാട്ടാടയാൾ ലഭിക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രാദേശികവ്യത്യാസങ്ങളിലോ പ്രകടമാണെങ്കിലും ഇന്ത്യയുടെ കാലാവസ്ഥ മൺസൂൺ കാലാവസ്ഥ തന്നെയാണ്.

ഇന്ത്യയുടെ കാലാവസ്ഥയെ നിർണ്ണയിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ

ഇന്ത്യയുടെ കാലാവസ്ഥയെ നിർവ്വായി ഘടകങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവയെ മുഖ്യമായും രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ടുതന്നും - സ്ഥാനവും ഭൂപ്രകൃതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഘടകങ്ങൾ, അന്തരീക്ഷമരിദം, കാറ്റ് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഘടകങ്ങൾ.

സ്ഥാനവും ഭൂപ്രകൃതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഘടകങ്ങൾ

അക്ഷാംശം

ഇന്ത്യയുടെ അക്ഷാംശിയസ്ഥാനം നിങ്ങൾക്ക് അറിയുള്ളതാണല്ലോ. ഉത്തര അക്ഷാംശം 8°4' മുതൽ 37° 06' വരെയാണിൽ. ഇന്ത്യയുടെ മധ്യഭാഗത്തുകൂടി കിഴക്കുപട്ടണത്താരായി കടന്നുപോകുന്ന ഉത്തരാധന രേഖ ഇന്ത്യയെ രണ്ടു ഭാഗങ്ങളായി തിരിക്കുന്നു. ഉത്തരാധന

നരേഖയ്ക്ക് വടക്കുഭാഗം (ഉത്തരങ്ങളും) ഉപോഷ്ണമേഖലയിലും മിത്തോഷ്ണമേഖലയിലും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഉത്തരാധനരേഖയ്ക്ക് തെക്കുഭാഗം ഉഷ്ണമേഖലയിൽ (Tropical zone) ഉൾപ്പെടുന്നു. ഭൂമധ്യരേഖയ്ക്ക് അടുത്തായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതിനാൽ ഉഷ്ണമേഖലയിൽ വർഷം മുഴുവൻ ഉയർന്ന താപനിലയും കുറഞ്ഞ വെന്നികതാപാരതവും കുറഞ്ഞ വെപ്പവും ഉയർന്ന അനുഭവപ്പെടുന്നു. ഉത്തരാധനരേഖയ്ക്ക് വടക്കുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ അവ ഭൂമധ്യരേഖയിൽനിന്നും അകലെ സാറിതിനും ചെയ്യുന്നതിനാൽ വെന്നികവും വാർഷികവ്യവസ്ഥയും ഉയർന്ന താപവ്യതിയാനങ്ങളാകുകയിൽ തീവ്രമായ കാലാവസ്ഥ അനുഭവപ്പെടുന്നു.

ഫീമാലയപർവ്വതം

ഇന്ത്യയുടെ വടക്കൻ അതിർത്തിയായി ഉയർന്നുനിൽക്കുന്ന ഫീമാലയപർവ്വതം തൃക്കംമലനിരകളും ചേർന്ന് ഒരു ഫലപദ്ധതിയാണ്. ഫീമാലയപർവ്വതം വടക്കൻ ശീതകാരാറിനെ പ്രതിരോധിച്ച് ഇന്ത്യൻ ഉപദ്വാസ്യത്തിനും തീരക്കാരാറു കഴിഞ്ഞിട്ടിട്ടും വൃത്തത്തിനുടെതുകൂട്ടുത്തു നിന്നും തീരവിച്ച് മധ്യ സ്ഥായിലേക്കും പൂർവ്വേസ്ഥയിലേക്കും വീശുന്നു. കൂടാതെ ഫീമാലയപർവ്വതം മൺസൂൺ കാറ്റുകളെ തടങ്കാതു നിർത്തുകവാഴി ഇന്ത്യൻ ഉപദ്വാസ്യത്തിലും സമീപപ്രദേശങ്ങളിലും വിവിധ കാലാജാളിൽ വ്യത്യസ്തമായ മർദ്ദക്കേന്ദ്രങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനിൽ കാരണമാകുന്നു. മഴ ലഭിക്കുന്നതിന് സഹായകമാകുന്നു.

കരയുടെയും കടലിൻ്റെയും വിതരണം

ഇന്ത്യൻ ഉപദ്വാസ്യത്തിന്റെ മുന്നുഭാഗം ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്താലും വടക്കുഭാഗം ഉത്തരങ്ങളിൽക്കുന്ന തൃക്കംചുഡായ ഫീമാലയത്താലും ചുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കടലിനെ അപേക്ഷിച്ച് കര വേഗത്തിൽ ചുടുപിടിക്കുകയും വേഗത്തിൽ തണ്ടുകൂടകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് ഇന്ത്യൻ ഉപദ്വാസ്യത്തിലും സമീപപ്രദേശങ്ങളിലും വിവിധ കാലാജാളിൽ വ്യത്യസ്തമായ മർദ്ദക്കേന്ദ്രങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനിൽ കാരണമാകുന്നു.

കടലിൻ്റെനുള്ള അകലം

ഇന്ത്യയിലെ വിശാലമായതും നീളമേറിയതുമായ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ സമുദ്രസാമീപ്യമുലം മിത്തമായ കാലാവസ്ഥയാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ഏന്നാൽ കടലിന്റെനുള്ള അകലെ സമീതി ചെയ്യുന്ന ഉൾപ്പെടെങ്ങൾ ഇൽക്കിനിൽ തീവ്രമായ കാലാവസ്ഥയാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്.

ഇതിനാലാണ് കൊക്കണ്ണിൽത്തീരത്തും മുഖബൈഡിലും ഉള്ള ജനങ്ങൾക്ക് താപനിലവും കൂത്യമായി അന്തരാജിക്കാത്തത്. ഡൽഫിൻ, കാണ്സപുർ, അമൃത്സർ, രാജസ്ഥാൻ ഉൾപ്പെടെങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ കാലാവസ്ഥയിലെ കാലിക്കമായ വ്യത്യാസം ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളെയും ബാധിക്കുന്നു.

ഉയരം

ഉയരം കൃത്യങ്ങളായും താപനിലയിൽ കുറത്തുവരുന്നു എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ. ഉയരമേറിയ പർവ്വതപ്രദേശങ്ങൾ സമതലങ്ങളേക്കാൾ തണ്ടപ്പൂളിളവയായിരിക്കും. ഉദാഹരണം: ആഗ്രയും ഡാർജിലിഡും ഒരേ അക്ഷാംശപ്രദേശത്ത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽപ്പോലും ജനുവരിയിലെ താപനില ആഗ്രയിൽ 10° സെൽഷ്യസും ഡാർജിലിഡിൽ 4° സെൽഷ്യസും ആണ്.

ഭൂപക്ഷി (Relief)

ഇന്ത്യയുടെ സവിശേഷമായ ഭൂപക്ഷി അതിന്റെ താപവിതരണം, അന്തരീക്ഷമർദ്ദം, കാറ്റിന്റെ ദിശ, വേദത, മാറ്റുകൾ എന്നിവ വിതരണം തുടങ്ങിയവയെ സാധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പദ്ധിമാലടമലനിരകളുടെയും അസമി നിന്റെയും കാറ്റിനിലിമുഖമായ ഭാഗങ്ങളിൽ ജൂൺ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെയുള്ള കാലങ്ങളിൽ മഴ ലഭിക്കുന്നോൾ പദ്ധിമാലടത്തിന്റെ മുഴചത്രിവിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന പീഠിയിലും തെക്കുഭാഗങ്ങളിൽ വരുന്ന കാലാവസ്ഥാ ധാരണ അനുഭവപ്പെടുന്നത്. കാരണം ഈ പദ്ധിമാലട അതിന്റെ മഴനിശ്ചിപ്പേദങ്ങളുണ്ട്.

അന്തരീക്ഷമർദ്ദവും കാറ്റുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഘടകങ്ങൾ

ഇന്ത്യയിലെ പ്രാദേശിക കാലാവസ്ഥാ വ്യത്യാസങ്ങളുടെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് താഴെ നൽകിയിട്ടുള്ള മുന്ന് ഘടകങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തന രീതി അഥവാ അന്തരീക്ഷങ്ങളുണ്ട്.

- (i) ഭൗമാപരിതലത്തിലെ അന്തരീക്ഷമർദ്ദത്തിന്റെയും കാറ്റുകളുടെയും വിതരണം.
- (ii) ആഗോളകാലാവസ്ഥയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ കാരണം രൂപപ്പെടുത്തുന്ന ഉന്നതതലപരിക്രമങ്ങൾ വിവിധ വായുസംഘടനയുള്ളുടെയും ജൈറ്റ് പ്രവാഹങ്ങളുടെയും കടന്നുവരവും.
- (iii) ശൈത്യകാലങ്ങളിൽ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന പശ്ചിമ അസാന്തത എന്നായിപ്പെടുത്താൻ മൾസ്സുണ്ട് കാലത്തുള്ള ഉഷ്ണമേഖലാ നൃത്യമർദ്ദങ്ങളുടെയും ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള വരവും ഇന്ത്യയിൽ മഴ ലഭിക്കുന്നതിന് അനുകൂലമായ കാലാവസ്ഥാ സുപ്പിട്ടുന്നു.

ഇന്ത്യയിലെ വേന്തുകൾക്കാലത്തെയും ശൈത്യകാലത്തെയും അടിസ്ഥാനമാക്കി ഈ മുന്ന് ഘടകങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തന രീതി കൃത്യാർഹമാക്കാനുത്തരം.

ശൈത്യകാലത്തെ കാലാവസ്ഥ


ഉപരിതല മർദ്ദവും കാറ്റുകളും

ശൈത്യകാല മാസങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയിലെ കാലാവസ്ഥ മയ്യുഷ്യയിലെയും പശ്ചിമേഷ്യയിലെയും അന്തരീക്ഷമർദ്ദസ്ഥിതിയുടെ സാധിത്തിലെയിരിക്കും. ശൈത്യകാലത്തെ മർദ്ദക്രമം ഒരു പ്രാഥമ്യമാണെന്ന് അഭ്യന്തരിച്ചിരിക്കും.

ലഭിച്ച ഫീമാലയപർവ്വതങ്ങൾക്ക് വടക്കുമാറി ഒരു ഉച്ചമർദ്ദക്രമം രൂപപ്പെടുന്നു. ഈ ഉച്ചമർദ്ദക്രമം പർവ്വതനിരയ്ക്ക് തെക്ക് ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂവണ്യത്തിലേക്ക് വടക്കുന്നും താഴ്ന്നതലങ്ങളിൽ വായുപ്രവാഹം സുപ്പിട്ടിക്കുന്നു. മയ്യുഷ്യയിലെ ഉച്ചമർദ്ദക്രമത്തിലെ ഉപരിതലവായു വരണ്ട ശൈത്യകാറ്റുകളായി ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂവണ്യത്തിലേക്ക് വീശുന്നു. ഈ വൻകരകാറ്റുകൾ വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ഇന്ത്യയിൽ വീശുന്ന വാണിജ്യവാതങ്ങളുമായി സമർക്കത്തിലാകുന്നു. ഈ സമർക്കമേഖലയിലുണ്ടായപ്പോഴും സ്ഥിരതയുള്ളവയല്ല. അപൂർവ്വമായി ഇത് കൃത്യതൽ പൂർവ്വിക്കിലേക്ക് മാറ്റുകയും മധ്യഗംഗാതകം വരെ ഏതൊക്കയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിന്റെ ഫലമായി മധ്യഗംഗാതകംവരെയുള്ള മഴുവാണ് ഉത്തരവേദനയും വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ഇന്ത്യയും വരണ്ട വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ശൈത്യകാറ്റിന്റെ സാധിത്തിലാകുന്നു.

ജൈറ്റ് പ്രവാഹങ്ങളും ഉന്നതതലവായുപാടും (Jet Streams and Upper Air Circulation)

ഇന്ത്യവരെ ചർച്ച ചെയ്തതു മഴുവാണ് ഭൗമാപരിതലത്തിനോട് ചേർന്നുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ വായുപംക്രമങ്ങളേക്കുറിച്ചാണ്. എന്നാൽ വൃത്തസ്തമായ വായുപ്രവാഹമാണ് ഭ്രാഹ്മാസ്മിയിൽ ഉപരിഭാഗങ്ങളിൽ, ഏകദേശം 3 കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ, കാണപ്പെടുന്നത്. അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ ഉയർന്നതലത്തിലെ വായുപ്രവാഹത്തിൽ ഉപരിതലവാതരീക്ഷമർദ്ദത്തിന് യാതൊരു പ്രാധാന്യവും ഇല്ല. പശ്ചിമേഷ്യയും മയ്യുഷ്യൻ പ്രദേശങ്ങളും ഈ കാലയളവിൽ 9 മുതൽ 13 കിലോമീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിൽ പടിഞ്ഞാറ് നിന്നും കിഴക്കോട്ട് സഖവരിക്കുന്ന പശ്ചിമ കാറ്റുകളുടെ സാധിത്തിലെയായിരിക്കും. ഈ കാറ്റുകൾ ഫീമാലയപർവ്വതങ്ങൾക്ക് വീശുവാൻ പിഠാലിക്ക് സമാനരഹമായി വീശുന്നു (ചിത്രം 4.1). ഈവയാണ് ജൈറ്റ് പ്രവാഹങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ടിബറ്റിൽ ഉന്നതതകം



ചിത്രം 4.1: ഇന്ത്യയിൽ ശൈത്യകാലത്ത് 9 - 13 കിലോമീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിലെയുള്ള കാറ്റിന്റെ ദിശ

ജെറ്റ് പ്രവാഹങ്ങളുടെ സാമ്യം പരമത്വിൽ ഒരു മാർഗ്ഗത ടെൻഡേറി നിലകൊണ്ട് ഇവയെ രണ്ട് ശാഖകളായി വിഭിഞ്ചുന്നു. ഇതിൽ ഒരു ശാഖ ടിബെറ്റിൽ ഉന്നത തടക്കിന് (High land) വടക്കുഭാഗത്തുകൂടി സംശ്രക്കുന്നു, അതെ സമയം ഇതിൽനിന്ന് തെക്കൻ ശാഖ ഹിമാലയത്തിൽനിന്ന് തെക്കുഭാഗങ്ങളിൽനിന്നും കിഴക്ക് ദിശയിൽ സംശ്രിക്കുന്നു. പ്രമേഖവരി മാസത്തിൽ ഇവ ഏകദേശം 25° വടക്ക് അക്ഷാംശ പ്രദേശങ്ങളിലും 200 മുതൽ 300 മി. മെറ്റോൺ അനുഭവപ്പെടുന്ന മേഖലയിലും വീശുന്നു. ജെറ്റ് പ്രവാഹങ്ങളുടെ തെക്കൻ ശാഖയ്ക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ശശ്രദ്ധകാല കാലാവസ്ഥ നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ സൂചിപ്പിച്ചാണെന്നു കണക്കാക്കുന്നു.

പശ്ചിമ അസ്ഥാനത്തെക്കളും ഉഷ്ണമേഖലയും (Western cyclonic disturbances and tropical cyclones)


ശശ്രദ്ധകാലമാസങ്ങളിൽ മെഡിററേറ്റീ കടൽപ്രദേശങ്ങളിൽ രൂപപ്പെടുന്ന ഉഷ്ണമേഖലയും ചക്രവാത്തങ്ങൾ പശ്ചിമ ജെറ്റ് പ്രവാഹങ്ങളുടെ സാധിക്കുന്ന തൊരിപ്പി പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിൽനിന്നും വടക്കുപടിഞ്ഞാർ ദിശയിൽനിന്നും ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖിലെ സാമ്യത്തിൽ ഏതെങ്കിലും രൂപീകരിക്കുന്നു. ഈ കാലയളവിലെ തുടർക്കാല താപനിലയിലെ ഉയർച്ച സാധാരണയായി ഈ ചക്രവാത്തങ്ങളുടെ നേര തെരയുള്ള വരവായിക്കുന്നു.

ബഹാർ ഉൾക്കടക്കിപ്പാദ്ധരത്തും ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലും ഉഷ്ണമേഖലയും ചക്രവാത്തങ്ങൾ വേഗത കൂടിയായും ശക്തിയേറിയ മഴയോടുകൂടിയായുമായിരിക്കും. ഇവ തമിഞ്ചാട്, ആസ്സൈപ്പറേർ, ദേശീയ തീരങ്ങളിൽ ആശീരിക്കുന്നു. വേഗതയേറിയ കാറ്റും, ശക്തിയായ മഴയും കാരണം ഇവയിൽ മിക്കവയും അതിവിനാശകരമായി കിട്ടും. ഇവയുടെ സാമ്യാദിത്തി ടെലിവിഷൻ റിപ്പോർട്ടുകളിൽ കളിൽനിന്നും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ.

വേനൽക്കാലത്തെ കാലാവസ്ഥ

(Mechanism of weather in the summer season)
ഉപരിലെ അനേകിക്കുമർദ്ദവും കാറ്റുകളും

വേനൽക്കാലാരംഭത്തോടെ സുരൂരേണ്ടി സറന്നു വാക്കോട്ട് മാറുന്നു. തുർപ്പമലമായി ഉപഭൂവണ്ണത്തിൽനിന്നും ഉപരിലെത്തിലെയും ഉയർന്ന തലങ്ങളിലെയും വായുസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രകടമായ ദിശാവൃതിയാം സംഭവിക്കുന്നു. ജൂലൈ മധ്യത്തോടുകൂടി ഉപരിലെത്തിനടുത്തുള്ള സൂര്യനമ്പ്രമേഖല (ITCZ - അഞ്ചൽ ഉഷ്ണമേഖല സംക്രമണമേഖല) ഹിമാലയത്തിൽ സമാനരമായി 20° - 25° വടക്ക് അക്ഷാംശ ദിശയിലേക്ക് നിങ്ങളും. ഈ സമയ തോടെ പശ്ചിമ ജെറ്റ് പ്രവാഹങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഭാഗത്തു നിന്നും പിൻവാങ്ങുന്നു. ITCZ-ൽ വടക്കോടുള്ള



ചിത്രം 4.2 : വേനൽക്കാലാരംഭത്തോടെ കാറ്റുകൾ, ഉപരിലെ വായുപംബക്കരണം

അന്തർ ഉഷ്ണമേഖലാ സംക്രമണമേഖല (Inter Tropical Convergence Zone (ITCZ))

ഭൂമധ്യരേഖയ്ക്കടക്കൽ വാൺജീവിവാതങ്ങൾ കുടിപ്പെടുന്ന ഒരു ന്യൂനമർദ്ദമേഖലയാണിൽ. ഇവിടെ വായു മുകളിലേക്ക് ഉയരുന്നു. ആലുവയ് മാസത്തിൽ ITCZ ഏറ്റ് സംഗമം 25° വടക്ക് അക്ഷാംശപ്രദേശത്ത് ഗംഗാസമതല താഴെയുള്ള മുകളിലായിട്ടുണ്ട്. ഇത് മൺസൂൺ തടം എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഇതു മൺസൂൺ തടം വടക്ക്, വടക്കുപടിഞ്ഞാൻ ഇന്ത്യയിൽ താപിയ ന്യൂനമർദ്ദമേഖല രൂപപ്പെടുന്നതിന് പ്രചോദനമാക്കുന്നു. ITCZ-ഏറ്റ് സംഗമ മാറ്റഭ്രംഗം ദക്ഷിണാർധഗ്രാമപ്രദേശത്തിലെ വാൺജീവിവാതങ്ങൾ കൊറിയോലിന് ബലംമുലം $40^{\circ}-60^{\circ}$ പൂർവ്വരേഖാം ശാഖശ്രീകിടക്കിൽ ഭൂമധ്യരേഖ മറികടന്ന് തെക്കുപടിഞ്ഞാറുനിന്നും വടക്കുപിശകൾ ദിശയിൽ വീശുവാൻ തുടങ്ങുന്നു. ഇവയാണ് തെക്കുപടിഞ്ഞാൻ മൺസൂൺ കാറ്റുകളാക്കുന്നത്. ശൈത്യകാലത്ത് ITCZ തെക്ക് ഭാഗത്തെക്ക് മാറുന്നു. അവയാണ് വടക്കുപിശകൾ മൺസൂൺ.

മാറ്റവും ഉത്തരേന്ത്യൻ സമതലങ്ങളിൽനിന്നുമുള്ള ഒരു പ്രവാഹങ്ങളുടെ പിൻമാറ്റവും പരം്പരം ബന്ധപ്പെട്ടി തിരുന്നു എന്ന് കാലാവസ്ഥാ ശാന്തത്തെതർ കണ്ണെ താഴിയിട്ടുണ്ട്. ഇവ തമിൽ ഒരു കാര്യകാരണബന്ധവും (Cause and Effect Relationship) നിലനിൽക്കുന്നു. ITCZ എന്നത് ഒരു ന്യൂനമർദ്ദമേഖലയായതിനാൽ ഇവ വിവിധ ദിശകളിൽനിന്നുമുള്ള കാറ്റുകളെ ആകർഷിക്കുന്നു. ദക്ഷിണാർധഗ്രാമപ്രദേശത്തിൽനിന്നും ഉഷ്ണമേഖലയിലേക്ക് വീശുന്നു. ആർദ്ദിതയാർന്ന ഈ വായുപ്രവാഹമാണ് തെക്കുപടിഞ്ഞാൻ മൺസൂൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്.


ജെറ്റ് പ്രവാഹവും ഉന്നതലെ വായുചട്ടക്കണ്ണവും (Jet streams and upper air circulation)

മുകളിൽ വിശദൈക്രിച്ചിട്ടുള്ള വായുമർദ്ദവും കാറ്റുകളും ഭൂമാന്തരിക്കാൻ മാത്രമാണ് രൂപപ്പെടുന്നത്. ജൂൺ മാസത്തിൽ മൺസൂനിൽ 90 കിലോമീറ്റർ വേഗതാിലുള്ള ഒരു കിഴക്കൻ ജെറ്റ് പ്രവാഹം ഉപദിവിപിന്റെ തെക്കുഗത്തുകൂടെ സംശയിക്കുന്നു. ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ ഇത് 15° വടക്കു, സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ 22° വടക്ക് അക്ഷാംശത്തിന് മുകളിലായും സംശയിക്കുന്നു. സാധാരണയായി ഈ കിഴക്കൻ കാറ്റുകൾ അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ മുകൾഭാഗത്ത് 30° വടക്ക് അക്ഷാംശത്തിന്നും വ്യാപിക്കാറില്ല. (ചിത്രം 4.3)

കിഴക്കൻ ജെറ്റ് പ്രവാഹങ്ങളും ഉഷ്ണമേഖല ചട്ടവാതങ്ങളും

(Easterly Jet streams and Tropical cyclones)

കിഴക്കൻ ജെറ്റ് പ്രവാഹങ്ങൾ ഉഷ്ണമേഖല ന്യൂനമർദ്ദങ്ങളെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ആന്തരിക്കുന്നു. ഈ ന്യൂനമർദ്ദങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂബനയിൽ മൺസൂൺ മഴയുടെ വിതരണത്തിൽ നിർണ്ണായക പങ്കുവഹിക്കുന്നു. ഇവയുടെ സംശയാർപ്പണത്തിലീം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ ഇതു ന്യൂനമർദ്ദങ്ങളുടെ ആവർത്തനം, വരവ്, ശത്രി, തീവ്രത എന്നിവയെല്ലാം തെക്കുപടിഞ്ഞാൻ മൺസൂൺ മഴയുടെ വിതരണത്തിൽ നിർണ്ണായിക്കുന്നതിൽ വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.



ചിത്രം 4.3 : വേനൽക്കാലത്ത് 13 കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ കാറ്റുകൾ ദിശ

ഇന്ത്യൻ മൺസൂൺിന്റെ സ്വഭാവം

(The Nature of Indian Monsoon)

സൃഷ്ടിക്കിത്തമാണെങ്കിലും അർദ്ധപഥമുത്രം അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാലാവസ്ഥാപ്രതിഭാസമാണ് മൺസൂൺ. ന്യൂനാഭ്യൂകളായി നിരീക്ഷണങ്ങൾ നടന്നുവരുന്നുണ്ട് കിരീകുടിയും മൺസൂൺ എന്നത് ശാന്തത്തെത്തുടർന്നുള്ള ഒരു പ്രതിഭാസമാണ്. മൺസൂൺിൻ്റെ ത്യാർത്ഥ സ്വഭാവവും കണ്ണെത്തുന്നതിൽ ധാരാളം ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ത്യവരെ ഒരു നിഖിലാത്തിനുപോലും മൺസൂൺിനെ പൂർണ്ണമായി വിവരിക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. സമീപകാലത്തായി ഒരു മുന്നേറ്റമുണ്ടായത് മൺസൂൺിനെ ആഗോളതല താഴിൽ പഠനവിധയമാക്കിയപ്പോൾ. ദക്ഷിണേഷ്യൻ പ്രാദേശങ്ങളിലെ മഴയുടെ കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് വ്യവസാധിക്കാനും മൺസൂൺിന്റെ കാരണങ്ങളെയും സവിശേഷതകളെയും സംബന്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്ന തിന്ന് ഏറെ സഹായകമായി. ഇതിൽ പ്രധാനമായത്;

- (i) മണിസ്യൂൺഡർ സ്റ്റേറ്റ്
 - (ii) രാഞ്ചാറ്റുകൾ (Rainboaring systems). ഉദാ: ഉപ്പണംവലാ വടക്കാത്തങ്ങൾ, അവയുടെ ആവർത്തനവും മണിസ്യൂൺ രാഞ്ചും തമിലുള്ള ബന്ധം
 - (iii) മണിസ്യൂൺഡർ ഹട്ടവും

മണ്ണം തോട്ട് (Onset of the Monsoon)




ආර්ථික ප්‍රතිපාදන සංඛ්‍යාව

କେବେଳା ଶାରୀରିକ ଓ ମନ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ

കൊന്തുപറിയേണ്ടതാൽ മാർഗ്ഗവാദം ആണ് കാരം തിരിച്ചെടുത്ത കോളേജിലെത്ത് എത്തുക്കയും വളരെ വിവരാക്കിൽ വ്യാപിച്ച് ആണ് ന തും ന തും മാറ്റു മുൻ്നേരായിരിക്കുമ്പോൾ കോളേജിലെത്തുക്കയും ആണ് തിരിച്ചെടുത്ത കോളേജിലെത്തുക്കയും ആണ് കാരം തിരിച്ചെടുത്ത കോളേജിലെത്തുക്കയും മുമ്പുന്ന് തും തും മാറ്റു മുൻ്നേരായിരിക്കുമ്പോൾ കോളേജിലെത്തുക്കയും ആണ് തിരിച്ചെടുത്ത കോളേജിലെത്തുക്കയും ആണ് (പിതൃ 4.5)

3.3. El Niño and Indian Monsoon

- (i) അധികാരിയുടെ പദ്ധതിയുടെ നിർവ്വഹണത്തിനുള്ള സഹായിത്താവളം
 - (ii) സമൃദ്ധിയും മാർഗ്ഗം-പികരണം കൂടാതെ തൊഴിൽ
 - (iii) സമൃദ്ധിയുടെ നിർവ്വഹണം എല്ലാം കൂറി വരുത്തുന്നത് യുദ്ധത്തിലോ ഏറ്റു വരുത്തിരുമ്പോൾ 'ബാലപാത്രം' (Child Clinic) കെന്ദ്രത്തിലെ സാര്വത്രയാളം വരുത്തുന്നത്. അഭിരുചിയുടെ ഫലമുണ്ട് എന്നതിനും ചിത്രങ്ങൾക്കുണ്ട് ഡോക്യുമെന്റേച്ച് എന്നതും പഠിക്കാം മുമ്പുമുണ്ട് അഭിരുചി മുൻ കാലം ചേരുന്നതിന് കാരണമാണ്.



ചിത്രം 4.5 : ഇന്ത്യ : രാഖ്യപരിസ്ഥിതി മന്ദിരത്തിൽ ശാമ്പാനയാളി ആരാറിക്കുന്ന ദിവസങ്ങൾ

മഴക്കാറുകളും മഴയുടെ വിതരണവും (Rain-bearing Systems and Rainfall Distribution)

ഇന്ത്യയിൽ രണ്ടുതരം മഴക്കാറുകൾ ലഭിക്കുന്നു. ബംഗാൾ ഉൾക്കൊളിൽ രൂപപ്പെട്ടുകയും ഉത്തരേന്ത്യൻ സമതലങ്ങളിൽ മഴക്ക് കാരണമാകുകയും ചെയ്യുന്ന താണ് ഓന്നാമത്തോട്. ഇന്ത്യയുടെ പശ്ചിമതീരങ്ങളിൽ മഴ നൽകുന്ന തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ ഒരു പിക്കടൽ ശാഖയാണ് രണ്ടാമത്തോട്. പശ്ചിമഘട്ടങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്ന മഴയിൽ കൂടുതലും പർവതവും ചീരുന്നു. കാരണം മൂലർപ്പം നിന്നെന്ന മഴക്കാറിനെ പശ്ചിമ ഘട്ടമലനിരകൾ തെരെഞ്ഞിർത്തുകയും തയ്യാലം മുകുളിലേക്ക് ഉയരുന്ന മൂല കാറ്റിൽ നിന്ന് മഴ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ പശ്ചിമതീരത്ത് ലഭിക്കുന്ന മഴയുടെ തീവ്രത രണ്ടു ഘടകങ്ങളെ ആശയിച്ചിരിക്കുന്നു.

- (i) പുറംകടൽ കാലാവസ്ഥാസ്ഥിതികൾ
- (ii) ആദ്ധ്യാത്മികയുടെ കിഴക്കൻ തീരങ്ങളിലെ മധ്യരേഖാ ജൈറ്റ് പ്രവാഹത്തിലോട് സന്ദര്ഭം

ബംഗാൾ ഉൾക്കൊളിൽ രൂപപ്പെട്ടുനാ ഉഷ്ണമേഖലാ നൃത്യമർജ്ജങ്ങളുടെ ആവുത്തി ഓരോ വർഷവും വൃത്യ സ്തമാണ്. മൺസൂൺ തെക്ക് (Monsoon trough) എന്ന നിയപ്പെട്ടുനാ ITCZ എന്ന സന്ദര്ഭത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ യുദ്ധ ഉത്തരം ചുട്ടുവരുന്നതും സമൂഹപരമായ നിർണ്ണായിക്കുന്നത്. മൺസൂൺ തെരുവിലോട് കൂടുന്ന മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ മഴക്കാറുകൾ ഉത്തരമർജ്ജങ്ങളുടെ സ്വാരം പാതയിലും ദിശയിലും ഏറ്റവും ചുട്ടുവരുന്നതിൽ മഴക്കാർ ഉണ്ടാവുകയും ലഭിക്കുന്ന മഴയിലെ അളവും തീവ്രതയും വർഷം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ചെയ്യുന്നു. തവണകളും ഇന്ത്യ ലഭിക്കുന്ന മഴ പശ്ചിമതീരങ്ങളിൽ പടിഞ്ഞാറു നിന്നും കിഴക്കോട്ടും, ഉത്തരേന്ത്യൻ സമതലത്തിലും ഉപദീപിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ വടക്കുഭാഗത്തും തെക്കുകിഴക്കുന്നും വടക്കുകിഴക്ക് ഭാഗത്തെക്കും കൂറുന്തുവരുന്ന പ്രവണത കാണിക്കുന്നു.

മൺസൂൺ ഇടവേള (Break in the Monsoon)

തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺകാലത്ത് ഏതാനും ദിവസങ്ങളിൽ തുടർച്ചയായി മഴ ലഭിച്ചതിനുശേഷം ദിവസാ അതിൽ കൂടുതലോ ആശ്രിക്കൾ മഴ ലഭിക്കാതി ലഭിക്കുന്നതാണ് മൺസൂൺ ഇടവേള. മഴക്കാലങ്ങളിൽ ഇത്തരം വരംബ ഇടവേളകൾ സാധാരണമാണ്. വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇത്തരം ഇടവേളകൾ വൃത്യത്തിൽ കാരണങ്ങളാൽ സംഭവിക്കുന്നു.

- (i) ഉത്തരേന്ത്യൻ ഭാഗത്തെ ITCZ അമ്പവാ മൺസൂൺ തെരുവിലും മഴക്കാറുകൾ തുടർച്ചയായി വീശാതിരുന്നാൽ ഇവിടെ മഴ ലഭിക്കാതിരിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു.
- (ii) പശ്ചിമതീരങ്ങളിൽ മൺസൂൺ ഇടവേളകളുണ്ടാകുന്നത് മഴക്കാറുകൾ തീരത്തിനു സമാനരമായി വീശുമ്പോഴാണ്.

ഇന്ത്യക്കണ്ണുകളുടെ താളിക്കെമ്പ

(The Rhythm of Seasons)

ഇന്ത്യക്കണ്ണുകളുടെ ചാക്കികമായ വാർഷിക ആവർത്തന നാലു അഭിസ്ഥാനമാക്കി ഇന്ത്യയിലെ കാലാവസ്ഥയെ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ മുഖ്യമായും താഴെ നൽകിയിട്ടുള്ള നാല് ഇന്ത്യക്കൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞാണ്.

- (i) ശൈത്യകാലം
- (ii) ഉഷ്ണാകാലം
- (iii) തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ കാലം
- (iv) മൺസൂൺ ഒരു വിശ്വാജിത്തിൽ കാലം


ശൈത്യകാലം

താപനില: സാധാരണയായി നവംബർ മധ്യത്തോടെയും ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ശൈത്യകാലമെത്തുന്നുന്നത്. ഡിസംബർ ജനുവരിയുമാണ് ഉത്തരേന്ത്യൻ സമതലങ്ങളിൽ ഏറ്റവും തണ്ണേപ്പുറിയ മാസങ്ങൾ. ഉത്തരേന്ത്യയിൽ മിക്ക സാലങ്ങളിലും ദേശനിക്ഷേരരാജാ താപനില 21° സെൽഷ്യസിൽ താഴെയായിരിക്കും. രാത്രികാല താപനില അതിലും കുറവായിരിക്കും. പലശ്ശൂഫും പഞ്ചാഭ്യൂം വിലും രാജാശാമിലും താപനില വരുങ്ങുന്നതും താഴെയായിരിക്കും. ഇക്കാലത്ത് വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന അതിശയത്തിന് മുഖ്യമായും മുന്നു കാരണം അഭ്യന്തരംമുള്ളതുണ്ട്.

- (i) സമുദ്രതീരത്തിലോട് മിത്രപ്പെട്ടതുനാ സ്വാഥിന തിരിക്കിന്നും അക്കലെയായതിനാൽ പഞ്ചാഭ്, ഹരിയാന, രജസാഹി എന്നീ സംസാഹാരങ്ങളിൽ വർക്കരാകാലാവസ്ഥാ അനുഭവപ്പെടുന്നു.
- (ii) സമീപത്തുള്ള എമിലേഷൻ പർവതനിരകളിലെ മണ്ണതുവീഴ്ച ശൈതകാറ്റിന് കാരണമാകുന്നു.
- (iii) ഫെബ്രൂരി മാസത്തോടെ കാസ്പിയൻ കടൽപ്പേരേശത്തുനും തുക്കക്കമെന്നിംഗ്രാമത്താറിക്കിനും വരുന്ന ശൈതകാര്റ്റ് വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ഇന്ത്യ തിൽ ശൈതതരംഗം, ഹിമം, മുടൽമണ്ണ് എന്നി വയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു.

മൺസൂൺ ഒരു അറിയാൻ

കരയിലും കടലിലും അതാരീക്ഷത്തിലുന്നിന് ശൈത ക്രീപ്പെട്ടുനാ വിവരങ്ങളെ ആധാരമാക്കി മൺസൂൺ സിരിസ് സഭാവും പ്രവർത്തനരാജിയും മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നുണ്ട്. വടക്കൻ ആന്ധ്രപ്രദ ലിയയിലെ പോർട്ട് യാർബിനിലെല്ലാം (12°30' തെക്ക് 131° കിഴക്ക്) കിഴക്കൻ പസഫിക്കിലെ ഫ്രെഞ്ച് പോളി നേഡു അശുദ്ധയിൽ ഉൾപ്പെട്ടു തെരിതി (20° - 140°) യിലെവും അന്തരീക്ഷമർദ്ദത്തിലെ വൃത്യാംസ് കണക്കാ കുകവഴി ദക്ഷിണ ആങ്ങാളുന്നതിന്റെ ഭാഗമായ തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ കാറ്റുകളുടെ തീവ്രത കണക്കാക്കാനാകും. 16 സുചകങ്ങളുടെ അടിസാഹ തിൽ ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥയും വകുപ്പും മൺസൂൺ ഒരു സാഹാരം പ്രവച്ചിക്കാൻ സാധിക്കും.



விடை 4.6 : இனி கணக்கினால் பத்திரிகைகள் வெளியிட வேண்டுமென்று சொல்லும்

ഉപദീപിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ ശൈത്യകാലം കൂട്ടു മായി അനുഭവപ്പെടാറില്ല. സമുദ്രസാമൈപ്പുംമുലവും ആമധ്യരേഖയോടുത്ത് സർത്തിചെയ്യുന്നതിനാലും തിരുപ്പദേശങ്ങളിൽ താപവിതരണത്തിൽ കാരുമായ കാലികവ്യതിയാനം അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല. ഉദാഹരണത്തിന് ജനുവരി മാസത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് ശരാശരി ഉയർന്ന താപനില 31° സെൽഷ്യസ് രേഖപ്പെടുത്തു ദോൾ ജൂൺ മാസത്തിൽ ഇത് 29.5° സെൽഷ്യസ് ആയിരിക്കും. ഇക്കാലയളവിൽ പശ്ചിമാലൂറുത്തിലെ കുന്നിൻപ്രദേശങ്ങളിൽ താപനില താരതമ്യനു കുറവായിരിക്കും. (ചിത്രം 4.6)

മർദ്ദവും കാറ്റുകളും: ഡിസംബർ അവസ്ഥയോടൊന്ന് (ഡിസംബർ 22) സുരൂമ്പര്യേ സുനനം ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക വരുക്ക് മുകളിൽ ഏതുകൂടുതൽ ഇക്കാലയളവിൽ ഉത്തരേ നൃസിന്ധു സമതലങ്ങളിൽ ശക്തികുറഞ്ഞതു ഉച്ചമർദ്ദമേഖല രൂപപ്പെടുന്നു. ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക അന്തരീക്ഷമർദ്ദം അൽപ്പം കുറവായിരിക്കും. 1019 മില്ലീബാർ സമർദ്ദരേഖ വടക്കുപടിശ്രദ്ധാനിൽ ഇന്ത്യയിലും ദേശാന്തരം 1013 മില്ലീബാർ സമമർദ്ദരേഖ ഇന്ത്യയിലും തെക്കുഭാഗങ്ങളിലും ഒരു നൃപോക്കുന്നു. (ചിത്രം 4.7)

ഇതിന്റെ ഫലമായി വടക്കുപടിശ്രദ്ധാനിൽ ഉച്ചമർദ്ദപ്രദേശത്തുനിന്നും ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലെ നൃസിന്ധുപ്രദേശങ്ങളെക്ക് കാര്യ വീശുന്നു.

കുറഞ്ഞ മർദ്ദവും താപനിലം വേഗത കുറഞ്ഞ മുട്ടുവായ കാറ്റ് ഐക്കദേശം മനിക്കുനിൽ 3 മുതൽ 5 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ പുറത്തോക്ക് വീശുന്നു. പ്രദേശത്തിന്റെ ഭൂപ്രകൃതി വലിയ തോതിൽ കാറിന്റെ വേഗത്താം സ്ഥായിനിക്കുന്നുണ്ട്. ഗംഗാതാഴ്വരൂപത്തിൽ ഇവ പടിശ്രദ്ധാനിൽ അല്ലെങ്കിൽ വടക്കുപടിശ്രദ്ധാനിൽ കാറ്റുകളാണ്. ഗംഗാ-ബേഹമപുത്ര ദൈർഘ്യപദ്ധതാർത്ഥം ഇവ വടക്കു ദിശയിൽനിന്നും വീശുന്നു. ബംഗാൾ ഉൾക്കെടുത്താം തെക്കുഭൂപ്രകൃതി സ്ഥായിനില്ലാത്തതിനാൽ ഇവ വ്യക്തമായി വടക്കുകുറിച്ച് ദിശയിൽ വീശുന്നു.

ശൈത്യകാലത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പ്രസന്നമായ കാലാവസ്ഥയാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ഇതരം പ്രസന്നമായ കാലാവസ്ഥയെ ചില ചക്രവാതങ്ങൾ അസ്ഥിരപ്പിക്കുന്നു. മെഡിറോനീയൻ കടലിന്റെ കിഴക്ക് രൂപപ്പെടുന്ന ഇവ കിഴക്ക് ദിശയിൽ സഞ്ചരിച്ച് പശ്ചിമശ്രൂതിയിൽ അനുഭവിക്കുന്നു. ഇവ കാലാവസ്ഥയെ അനുഭവപ്പെടിശ്രദ്ധാനിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഏതു ചേരുന്നു. ചക്രവാതങ്ങൾ അവയുടെ സഞ്ചാരത്തിനും യിൽ വടക്ക് കാസ്പിയൻ കടലിൽനിന്നും തെക്ക് പേരിഷ്യൻ ദശപാളിനിന്നും ഇംഗ്ലീഷ് സബ്സിപ്പിനാകും നും. ഈ നൃസിന്ധുമർദ്ദങ്ങളെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിൽ ജീറ്റ് പ്രവാഹങ്ങളുടെ പങ്ക് എന്നായിരിക്കും?


മഴലുജ്ഞ (Rainfall): കരയിൽനിന്നും കടലിലേക്ക് വീശുന്നതിനാൽ ശൈത്യകാല മൺസൂൺകാർ മുത്തക് കാരം

സമാകുന്നില്ല. ഇതിനും കാരണങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാറൂന്ന വയാൺ; ഓനാമതായി ഇവയിൽ വളരെ കുറച്ച് ആർട്ടു തമാത്രമെ ഉണാവുകയുള്ളൂ. ഓനാമതായി കരയിലെ പ്രതിചക്രവാതങ്ങൾ ഇവയിൽ മാത്രക്കുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നു. അതിനാൽ ഇന്ത്യയിൽ ഭൂമിഭാഗം പ്രദേശങ്ങളിലും ശൈത്യകാലത്ത് മഴ ലഭിക്കുകയില്ല. എന്നിരുന്നാലും ചിലയിടങ്ങളിൽ ഇതിന് മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കാറുണ്ട്.


- മെഡിറോനീയൻ കടൽ പ്രദേശത്തുനിന്നും വരുന്ന ശക്തികുറഞ്ഞ മിത്രാഷ്ണ (Mediterranean) ചക്രവാതങ്ങൾ വടക്കുപടിശ്രദ്ധാനിൽ ഇന്ത്യയിൽ പശ്ചിമാംഗം മായും ശാഖാടു ആളുവ് കുറവാണെങ്കിലും ഇവ രാബി വിജയക്ക് അതുകൊം ഗുണകരമാണ്. ഹിമാലയ പർവതഭാഗത്ത് വർഷണം മണം വീഴ്ചയുടെ രൂപത്തിലായിരിക്കും. ഹിമാലയയൻ നടക്കളിൽ വേറ്റൽക്കാലത്തും നീംബല്ലുക്ക് നിലനിർത്തുന്നത് ഇരു മണം വീഴ്ചപ്രമൂലമാണ്. സമതലങ്ങളിൽ പടിശ്രദ്ധാനിനും കിഴക്കുഭാഗം പ്രവാതപദ്ധതങ്ങളിൽ വടക്കുനിന്നും തെക്കുദിശയിലേക്കും വർഷണം തിരിക്കും ആളുവ് കുറഞ്ഞുവരുന്നു. ഉദാഹരണത്തിൽ, ഡിസംബർമിറ്റിനിന്നും വീഴ്ചപ്രമൂലമാണ്. സമതലങ്ങളിൽ പടിശ്രദ്ധാനിനും വീഴ്ചപ്രമൂലമാണ്. 53 മില്ലീമീറ്ററുണ്ട്. പശ്ചിമാംഗം വിഹാരിലിലും ഇതിനും ഇതുവരെ തന്മാക്കം 25 മില്ലീമീറ്ററിനിനും 18 മില്ലീമീറ്ററിനിനും ഇടയിലായിരിക്കും.
- മധ്യ ഇന്ത്യയിലും തെക്കൻ ഉപദീപിയ ഇന്ത്യയുടെ വടക്കുഭാഗങ്ങളിലും ശൈത്യകാലങ്ങളിൽ മാത്രമുണ്ടാക്കാറുണ്ട്.
- ഇന്ത്യയുടെ വടക്കുകിഴക്കൻ ഭാഗങ്ങളിൽ അരുണാചലപർവ്വതം അസംമിലും ശൈത്യകാലമാസങ്ങൾ തീരങ്ങൾ, ആറുന്നേപ്പറവേശിന്റെ തെക്കുഭാഗത്തുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ, കർണ്ണാടകത്തിന്റെ തെക്കുകിഴക്കൻ പ്രദേശങ്ങൾ, കേരളത്തിന്റെ തെക്കുകിഴക്കൻ പ്രദേശങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ശക്തമായ മുത്തക് കാരണമായും ചെയ്യുന്നു.
- കെട്ടോബൻ, നവംബർ മാസങ്ങളിൽ വടക്കുകിഴക്കൻ മണംമൺസൂൺ ബംഗാൾ ഉൾക്കെടുപ്പിലും സഖവ തിക്കുന്നോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഉൾക്കെടുപ്പുകയും തമിഴ്നാട്ട് തീരങ്ങൾ, ആറുന്നേപ്പറവേശിന്റെ തെക്കുഭാഗത്തുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ, കർണ്ണാടകത്തിന്റെ തെക്കുകിഴക്കൻ പ്രദേശങ്ങൾ, കേരളത്തിന്റെ തെക്കുകിഴക്കൻ പ്രദേശങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ശക്തമായ മുത്തക് കാരണമായും ചെയ്യുന്നു.

ഉഷ്ണാകാലം

താപനില: മാർച്ച് മാസത്തിൽ സുരൂമ്പര്യേ ആപേക്ഷിക്കുന്ന കാലാവസ്ഥയും ഉത്തരായന്ത്രയിൽ താപനില 30° സെൽഷ്യസിനും 32° സെൽഷ്യസിനും ഇടയിലും തുടരുന്നതിൽ മാസത്തിൽ ഉത്തരായന്ത്രം മാർച്ച് മാസങ്ങളിലും താപനില 30° സെൽഷ്യസിനും 32° സെൽഷ്യസിനും ഇടയിലും അനുഭവപ്പെടുന്നത്. മാർച്ച് മാസത്തിൽ ഉത്തരായന്ത്രം താപനില



വിജാ 4.7 : ഇന്ത്യ, അദ്ദേഹിച്ച ഉപരിതല കാറ്റവലം (ശ്രൂവത്തിൽ)



ചിത്രം 4.6 : ഭൂപടി അനുസരം കാണാവുള്ള പ്രകാരം നിന്ന് കാണിക്കുന്ന താപനില

നിലയായ 38° സെൽഷ്യൂസ് ഡിഗ്രീമിലും ശത്രുവാസ്തവിക്കാരുണ്ട്. എന്നാൽ ഏപ്രിൽ, മെയ് മാസങ്ങളിൽ ഗുജറാത്ത്, മധ്യപ്രദേശ് എന്നീ സംസാര നാട്ടളിൽ താപനില 38° സെൽഷ്യൂസ് മുതൽ 43° സെൽഷ്യൂസ് വരെ ഉയരവുണ്ട്. മെയ് മാസത്തിൽ താപമേഖല കൂടുതൽ വടക്കോട് മാറുന്നതിന്റെ ഫലമായി വടക്കുപടിനാട്ടാൻ ഭാഗങ്ങളിൽ 48° സെൽഷ്യൂസ് വരെ താപനില അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്. (ചിത്രം 4.8).

ഉത്തരേന്ത്യയെ അപേക്ഷിച്ച് ഒക്സിജോന്റെയിൽ
ഉൾഖണകാലം അതു കരിനമല്ല. ഉത്തരേന്ത്യയെക്കാളും
ഒക്സിജോന്റെയിൽ താപനില കുറവായിരിക്കുന്ന
തിനുകാരണം ഉപവീപിയസിനാവും സമൃദ്ധസാമീപ്യ
വുമാണ്. അതിനാൽ താപനില 26° സെൽഷ്യൂസിനും
32° സെൽഷ്യൂസിനും മുടയിലായിരിക്കും. ഉയരം കൂടുതലായതിനാൽ പശ്വിമഘട്ടത്തിലെ കൂനുകളിൽ താപനില 25° സെൽഷ്യൂസിൽ താഴെയായിരിക്കും. തീരദേശങ്ങളിൽ സമതാപനേകൾ തീരത്തിൽ സമാനരഹമായി കാണപ്പെടുന്നത് താപനില വടക്കുന്നു; തെക്കേഞ്ചുകൂടിയുണ്ടായി എന്ന വസ്തുത ശരിവയ്ക്കുന്നു; എന്നാൽ തീരത്തുന്നും ഉൾപ്പെടെശത്രക്ക് ഇത് കുറിവിരുന്നു; ഉൾഖണകാലമാസങ്ങളിൽ കുറഞ്ഞ ഒരുനിക്കൾക്കാണ് താപനില അൽപ്പം ഉയർന്നുതന്നെ നിൽക്കുന്നു. അപൂർവ്വമായി ഇത് 26° സെൽഷ്യൂസിൽ താഴെയാകാറാണ്.

അന്തരീക്ഷമർദ്ദവും കാറ്റുകളും വടക്കേ മുന്ത്യയിൽ വേതനമാസങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതയാണ് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം കുറഞ്ഞതുവരുന്നതും അത്യുഷ്ണവും. ഉപഭൂ വണ്ണം ഉയർന്ന താപത്രിയിൽ സ്വാധീനത്തിലാകുന്ന തിനാൽ ITCZ വടക്കോട്ടുമാരി ജൂലൈ മാസത്തിൽ 25° അക്ഷാംശപ്രദേശത്ത് എത്തുന്നു. ഈ മണസ്സുണ്ടതക നൃത്വമർദ്ദമേഖല വടക്കുപടിനാശം താർ മരുഭൂമി മുതൽ കിഴക്ക്-തെക്കുകിഴക്കൻ ഭാഗത്തു സറിത്തെപ്പറ്റുന്ന പാർപ്പന, ചേരാട്ടാനാഗ്രപുർ പിരിഞ്ഞിവരെ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്നു (ചിത്രം 4.9). നൃത്വമർദ്ദമേഖലയായ ITCZ പശ്ചിമത്തിൽ തുടർന്നു തെക്കുപടിനാശായി വീശുന്ന കാറ്റുകളിലൂം പശ്ചിമബഹാളിന്റെയും ബാഹ്യാഞ്ചലിന്റെയും തീരങ്ങളിൽ വീശുന്ന കാറ്റുകളിലൂം ആകർഷിക്കുന്ന മൂല വടക്കൻ ബംഗാളിലും ബീഹാറിലും കിഴക്കേ തെക്കുകിഴക്കൊ ദിശയിൽ വീശുന്നവയാണ്. ഈ തെക്കുപടിനാശൻ മണസ്സുണ്ണക്കാടുകൾ സിനമാറ്റം സംഭവിച്ച മധ്യരേഖാ പശ്ചിമവാതങ്ങളാണ്. വടക്കൻ ബംഗാളിലും ബീഹാറിലും ഈ തെക്കുകിഴക്ക് ദിശയിൽ വീശുന്ന മുസ്സ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തെക്കുപടിനാശൻ മണസ്സുണ്ണ പ്രവാഹങ്ങൾ ധമാർമ്മത്തിൽ സിനമാറ്റം സംഭവിച്ച മധ്യരേഖാ പശ്ചിമവാതങ്ങളാണ്. ജൂൺ മധ്യത്തോടെയും ഈ കാറ്റുകളുടെ കടനുവരവ് മഴക്കാലത്തിന് മുഴുവനിയായി കാലഘനപ്പയിൽ മാറ്റു ക്കാണുവരുന്നു.


வடக்குப்பின்னையில் இறையில் ITCZ என்கேட்டு
ஏதால் ரூபபெப்புடும் வரை உப்புக்காடுகளை லூ
(100). பலபோடும் இவ அச்சுமொட்டிவரை நீண்ட
நிலைக்காரணம். பலவைப், ஹனியான், கிடிகளில் ரைஜ்
ஸமாள், உறுத்திரப்போடு ஏனிலிவிடங்களில் வெகுனேற
அல்லில் பொடிகிளின்ற கார்ட் ஸாயாகளையான். இறைம்
ப்ரான்திக் கார்ட்டுக்கள் பெரிய தொழிலுறுத் தீவிரம்
நேரில் கார்ட்டினும் கார்ணமாகுங்கிடுகிறது அதிகரிதம்
மாய் வேற்கி பூசித்தினும் அதைப் பாதுகாப்பாக நாக்கு
நூ. சில ஸங்கிளங்களில் அதுபோது நிர்வாக கார்ட் கார்ட்
மாற்றமேவரும் ஸமீபத்தைக் குறிக்கின்பெப்புடும்.
வரை வாயுவும் அதுபோதையாகின் உப்புவாயுவும்
தழிலுள்ளதைக்காடு வழிர பெட்டுக்கூடுதல் ஸபாரிக்கமல்லும்
ஶக்தமாய் ப்ரான்திக்கவாதனங்கள் ரூபபெப்புடும். இந்
ப்ரான்திக் கொடுக்காடுகள் சில ஸமயங்களில்
ஶக்தமாய் கார்ட்டினும் பேமாரிக்கும் அதுபீப்புஷ்டு
நூவரை கார்ணமாக்கும்.

ഉച്ചനമേവലയിലെ പ്രധാന പ്രാദേശിക കാര്യക്ഷേ

- (i) മാവശക്കാർ (Mango Shower): വേലിപ്പെട്ട അവ സാന്തോഷകളിൽ കേരളത്തിലും കർണ്ണാടക തീരത്തും സാധാരണയായി രൂപപ്പെട്ടുന്ന മൺസുഗ്ഗിൻ മുഖനാടിക്കായുള്ള വൈദികമുകളാണുകളാണിവ. മാവശം നേരത്തെ പഴത്ത് പാക മാകാൻ സഹായകമാക്കുന്നതിനാലും ഈ പ്രാദേശികമായി മാവശക്കാർ എന്നറിയപ്പെട്ടുന്നു.
 - (ii) കാളി പുവിട്ടു മഴ (Blossom Shower): കേരളത്തിലും പരിസരപ്രദേശങ്ങളിലും കാളി പുക്കുന്നത് ഈ മഴയോടെയാണ്.
 - (iii) നോർവേസ്റ്റർ (Nor Wester): ബംഗാളിലും അസം മില്ലു രൈവകുണ്ണംരങ്ങളിൽ രൂപപ്പെട്ടുന്ന ശക്ത മായ തുടിമിന്നലോടുകൂടിയ കൊടുക്കാറ്റുകളാണിവ. ‘വൈദാവലമാസത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന പ്രക്രിയക്ഷാല’ എന്നർഹിറ്റാം ‘കാരിക്കെപ്പ ശാഖി’ എന്ന പ്രാദേശികനാമത്തിൽ നിന്നു തന്നെ ഈ വയ്ക്കുട വികാശകരമായ സഭാവം വ്യക്തമാണ്. ഈ കാറ്റുകൾ തേയില, ചൗം, കൈപ്പ് തുടങ്ങിയ വിളകൾക്ക് അനുകൂലമാണ്. അസംതിൽ ഈ ‘ബർഡാളി ചീര്’ എന്നറിയപ്പെടുന്നു.
 - (iv) ലു (Loo): വടക്കെ ഇന്ത്യൻ സമതലങ്ങളിൽ പഞ്ചാബ് മുതൽ ബിഹാർ വരെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ രൂപപ്പെട്ടുന്ന ശക്തിയേറിയ വരും ഉഷ്ണിംഗ്കാറ്റുകൾ. ധർമ്മക്ഷേണ പാർന്നുക്കൂട്ടു മട്ടിയിൽ ഹവയുടെ തിന്പവരത കുടക്കുന്നതിൽക്കൂടും

തെക്കുപടിന്തുറഞ്ഞ മണിസുണികാലം

ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳୀଙ୍କ ସମତଳାଙ୍ଗତିରେ ମହି ମାସତେବେଳେ ତାପନିଯ ବାତାର ବେଶତିରେ ଉତ୍ସବାଙ୍ଗିକାରେ ହୁଏ ପ୍ରତ୍ୟେକତାର ରୂପପ୍ରେତିକ୍ରମ ନ୍ୟୁନମରିଂ କୃତିକରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପିକଷୁଣ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ମାସତରୀଣୀ ଅନୁରାଗତେବେଳେ ହୁଏ ଡକ୍ଷିଣାଧ୍ୟ ଦେଶରେ ଉତ୍ସବମହାମୁଦ୍ର



விடை 4.9 : மாண் வர்த்தும் உபவிளை கருக்கலை (கட்சிலை)

തിരിക്കിന്നും വരുന്ന വാൺജ്യവാതങ്ങളെ ആകർഷിക്കാൻ കാരിതക ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നു. ഈ തെക്കുകിഴക്കൻ വാൺജ്യവാതങ്ങൾ ഭൂമധ്യരേഖ മരിക്കന് ഇന്ത്യയിലെ വായുചാട്ടക്കമണ്ണത്തിൽ എത്തുന്നതിനായി അബിക്കട ലില്ലും ബാധാശ ഉൾക്കടലില്ലും എത്തുന്നു. ഈ മധ്യ രേഖാ ഉഷ്ണജലപ്രവാഹം മരിക്കനാവയായതിനാൽ ഇംഗ്ലീഷ് സംഖ്യപ്രകാരം കാറ്റുകളാണ്. ഭൂമധ്യരേഖ മരിക്കനാശം തെക്കുപടിഞ്ഞാർ ദിശ സീക്രിക്കേറു ഇംഗ്ലീഷ് കാറ്റുകളാണ് തെക്കുപടിഞ്ഞാൻ മണ്ണിസുണ്ണ എന്ന നിയപ്പേട്ടുന്നത്.

തെക്കുപടിഞ്ഞാൻ മണ്ണിസുണ്ണകാലത്ത് മഴ വളരെ പെട്ടെന്നുതന്നെ ആരംഭിക്കുന്നു. ആദ്യമശയോടെതന്നെ താപനില കുറയാൻ തുടങ്ങും. ഇടിമിന്നലോടുകൂടി എത്തുന്ന ഇന്ത്യരും ജലഘാഷ്പം നിരഞ്ഞ മഴക്കാറുക ഇടുന്ന പെട്ടെന്നുള്ള വരവിനെന്നും മണ്ണിസുണ്ണിൽ പൊട്ടിപ്പുറപ്പാട് (Burst or Break of the Monsoon) എന്നു പറയുന്നത്. കേരളം, കർണ്ണാടകം, മഹാരാഷ്ട്ര, ഗോവ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ ജൂൺ ആദ്യ ആഴ്ചയോടെതന്നെ മണ്ണിസുണ്ണ വന്നെന്നുന്നു. എന്നാൽ രാജ്യത്തിൽ ഉൾഭാഗങ്ങളിൽ ഇത് ജൂൺ ആദ്യ ആഴ്ചയോടെ മാത്രമേ എത്തുകയുള്ളൂ. ജൂൺ പകുതിക്കും ജൂൺ ലൈ പകുതിക്കുമിടയിൽ പകൽ സമയങ്ങളിൽ താപനിലയിൽ 5° സെൽഷ്യസ് മുതൽ 8° സെൽഷ്യസ് വരെ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

മണ്ണിസുണ്ണകാറ്റുകൾ കരയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതോടുകൂടി ഭൂപ്രകൃതി വ്യത്യാസങ്ങളും വടക്കുപടിഞ്ഞാൻ ഇന്ത്യയിലെ താപിയന്നുനമർദ്ദവുംലും കാറ്റുകളുടെ തെക്കുപടിഞ്ഞാൻ ദിശയ്ക്ക് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നു. മണ്ണിസുണ്ണ ഉപഭൂവണ്ണത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് രണ്ടു ശാഖകളായാണ്:

- അബിക്കടൽ ശാഖ
- ബാധാശ ഉൾക്കടൽ ശാഖ

അബിക്കടലിലെ മണ്ണിസുണ്ണ കാറ്റുകൾ

അബിക്കടലിൽ തുപാക്കാളുന്ന മണ്ണിസുണ്ണ കാറ്റുകൾ വീണ്ടും മുന്നു ശാഖകളായി പിരിയുന്നു.

- ഒരു ശാഖയെ പദ്ധിമല്ല മലനിരകൾ തന്നെ നിർത്തുന്നു ഈ കാറ്റുകൾ 900 മുതൽ 1200 മീറ്റർവരെ ഉയരത്തിൽ പാർവതാഗണത് ആണോ ഹണം ചെയ്യുകയും പെട്ടെന്നുതന്നെ തന്നുക്കൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിൽ ഫലമായി സഹ്യാദ്രിയുടെ കാറ്റിനിമുഖമായ ചരിവുകളില്ലോ പദ്ധിമ തീരസമതലങ്ങളില്ലും 250 സെറ്റീമീറ്റർ മുതൽ 400 സെറ്റീമീറ്റർവരെയുള്ള അളവിൽ അതിശക്തമായ മഴ ലഭിക്കുന്നു. പദ്ധിമല്ലമലനിരകൾ കടക്കുന്നതോടെ ഈ കാറ്റുകൾ താഴേക്കു പ്രവേശിക്കുകയും തന്നുലും ചുടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ


കാറ്റിലെ ആർഡ്രതയുടെ അളവ് കുറയുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു. ഇതിൻറെ ഫലമായി പദ്ധിമല ട്രാൻസ് കിഴക്കൻ ചതിവുകളിൽ ഈ കാറ്റുകൾ വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ മാത്രമേ മഴ നൽകുന്നുള്ളൂ. ഈത്തരം മഴ കുറഞ്ഞത് പ്രദേശങ്ങളും മഴനിശ്ചൽപ്പദേശങ്ങൾ (Rain shadow areas) എന്നു പറയുന്നത്.

കോഴിക്കോട്, മംഗലം, പുരു, ബംഗലൂരു എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലെ മഴയുടെ അളവ് കാറ്റുകൾ വ്യത്യാസം രേഖപ്പെടുത്തുക. (ചിത്രം 4.10)

- അബിക്കടൽ മണ്ണിസുണ്ണിൽ മറ്റാരുശാഖാ മൂളവെബ്യുഫ്രെ വടക്ക് തീരത്ത് വന്നെന്നതുകയും നിർമ്മാണ, തപ്പി താഴ്വരകളിലുടെ സഖവിച്ച് മധ്യ ഇന്ത്യയിലെ വിശാലമായ പ്രദേശത്ത് മഴ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ കാലയളവിൽ ഷോട്ടാനാർപ്പണ പീറ്റേമിറ്റിൽ 15 സെറ്റീമീറ്റർ മഴ ലഭിക്കുന്നത് ഈ ശാഖയിൽ കുറവുണ്ടാണ്. ഇതിനുശേഷം ഈ ഗംഗാസമതലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് ബംഗാശ ഉൾക്കടൽ ശാഖയുമായി കൂടിച്ചേരുന്നു.
- ഈ മണ്ണിസുണ്ണകാറ്റിൽ മുന്നാമത്തെ ശാഖ സൗഖ്യം ഉപദിപില്ലും കച്ചു മേഖലയില്ലും വീണിയടക്കുന്നു. പിന്നീൽ പദ്ധിമ രജാസ്ഥാനിലും അഞ്ചുവലിയിലും നേരിയതോതിൽ മഴ നൽകിക്കൊണ്ട് കടന്നുപോകുന്നു. ഈ പദ്ധാഖിലും ഹരിയാന തിലും വച്ച് ബംഗാശ ഉൾക്കടൽ ശാഖയുമായി ചേരുന്നു. ഈ രണ്ടു ശാഖകളും പരസ്പരം കൂടി ചേർന്ന് ശക്തിയാർജിച്ച് പദ്ധിമഹിമാലയൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ മഴ നൽകുന്നു.

ബംഗാശ ഉൾക്കടലിലെ മണ്ണിസുണ്ണ കാറ്റുകൾ

ബംഗാശ ഉൾക്കടൽ മണ്ണിസുണ്ണിലെ മൂളവെബ്യുഫ്രെ തെക്കുകിഴക്കൻ ബംഗാശഭേദിലും വീശിയടക്കുന്നു. മൂളമേർ തീരത്തുള്ള അരക്കൽ കുന്നുകൾ ഈ കാറ്റിൽ നല്ലാരുശാഖാം ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂവണ്ണത്തിലേ കുറത്തെന്ന തിരിച്ചവിടുന്നു. അതിനാൽ പദ്ധിമബംഗാശ തിലും ബംഗാശഭേദിലും മണ്ണിസുണ്ണ തെക്കുപടിഞ്ഞാറു ദിശയിൽ നിന്നുള്ളതെ തെക്കുനിന്നും തെക്കുകിഴക്കുനിന്നും പ്രവേശിക്കുന്നു. പദ്ധിമബംഗാശഭേദിലും ബംഗാശഭേദിലും വച്ച് ഈ മണ്ണിസുണ്ണ ശാഖ ഹിമാലയപർവതത്തിൽനിന്നും വടക്കുപടിഞ്ഞാറും സംശയിക്കപ്പെടുന്നതുകൂടി പിരിയുന്നു. ഈ അളവിൽ ഒരു ശാഖ പടിഞ്ഞാർ ദിശയിൽ സഖ തിച്ചു പദ്ധിമബംഗാശ ദിശയിൽ സഖയിൽ ചെയ്യുപെട്ട സമതലവാല എത്തുന്നു. മറ്റാരുശാഖ പ്രവഹപ്പെട്ട താഴ്വരയുടെ വടക്ക്, വടക്കുകിഴക്ക് ദിശയിൽ സഖയിൽ ചെയ്യുപെട്ട പുലാപകമായ മഴയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു. ഈ അളവിൽ ഉപശാഖ മേഖലയയിലെ ശാഖോ, വാസികുന്നുകളിൽ വീണ്ടും, ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ



ചിത്രം 4.10 : ഇന്ത്യ: മനുഷ്യരാജിപദ്ധതി (ജൂൺ - ഓസ്പിതാവർ)

വാർഷിക ശരാഖൻ മഴ ദേശപ്പെടുത്തുന്ന മൂന്നിൽനാം എന്ന സംഗമം വാസികുന്നുകളിലാണ് സറിതിചെയ്യുന്നത്.

ഇക്കാലയളവിൽ തമിഴ്നാട് തീരങ്ങളിൽ മഴ ഉണ്ടാക്കാതെ വരഗ്രൂപം അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയമായ വന്നതു. ഇതിനു പ്രധാനമായും രണ്ടു കാരണങ്ങളാണുള്ളത്.

- (i) തമിഴ്നാട് തീരം തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ സീരീസ് ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ ശാഖയ്ക്ക് സമാനമായാണ് സഫിതിചെയ്യുന്നത്.
- (ii) തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ സീരീസ് അബിക്ക ടൽ ശാഖയുടെ മഴനിശ്ചൽപ്പേശാന്താണ് തമിഴ്നാട് തീരം സറിതിചെയ്യുന്നത്.

മൺസൂൺ മഴയുടെ സവിശേഷതകൾ

(Characteristics of Monsoon Rainfall)

- (i) ജൂൺ മാസത്തിനും സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിനും ഇടയിൽ ലഭിക്കുന്ന തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ മഴ കാലിക്കസഭാമുള്ളവയാണ്.
- (ii) മൺസൂൺ മഴ പ്രധാനമായും ഭൂപ്രക്ഷതിയാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു. ഉദാഹരണത്തിൽ പശ്ചിമ ഘട്ടത്തിൽ കാറ്റിനഭിമുഖമായ ഭാഗങ്ങളിൽ 25 സെന്റീമീറ്ററിൽ കുടുതൽ മഴ ദേശപ്പെടുത്തുന്നു. കൂടാതെ വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്ന കനത്ത മഴ വടക്കുകിഴക്കൻ കുന്നുകളുടെയും കിഴക്കൻ ഫീമാലയത്തിന്റെയും സ്ഥാധിനിതിലാണ്.
- (iii) കടലിൽനിന്നും അകലുന്നതോടും മൺസൂൺ മഴയുടെ അളവ് കുറയുന്നു. കടലിന്തീരത്തിനടുത്തുള്ള കൊൽക്കത്തയിൽ തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺകാലത്തിൽ 119 സെ.മീ. മഴ ലഭിക്കുമ്പോൾ, പാട്ടനയിൽ ഇത് 105 സെന്റീമീറ്ററും അല്ല ഹബ്ബാറിൽ 76 സെന്റീമീറ്ററും ഡിഫൈനിറ്റിൽ 56 സെന്റീമീറ്ററും ആണ്.
- (iv) ഏതൊന്തും ഭിവസണങ്ങൾ നീണ്ടുനിർക്കുന്ന തവണ കളായാണ് മൺസൂൺ മഴ ലഭിക്കുന്നത്. ഇതരം നന്ദബാർന്ന തവണകൾക്കിടയിൽ മഴയില്ലാത്ത വരണ്ട ഇടവേളകളുണ്ടാവും. ഇത് മൺസൂണിലെ ഇടവേള (breaks) എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഇതരം മൺസൂൺ ഇടവേളകൾ ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ ഭാഗത്ത് ചക്രവാത്തങ്ങളുടെ രൂപപ്പെടലും കരയിലേക്കുള്ള അവയുടെ കടന്നുവരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ ന്യൂനമർദ്ദങ്ങളുടെ അവും തിയം തിയം തീവ്രതയും കൂടാതെ ഇവയുടെ സംശാരണതയും അവും പൊതുമായാണ് മഴയുടെ സംശാരണതയും വരണ്ട കാലാവസ്ഥയായിരിക്കും. പക്ഷേ ഉപദീപിശ്ചേരിക്കിടക്കും അവയിൽ ഇതു കാലയളവിൽ മഴ ലഭിക്കുന്നു. ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒക്കെബാബർ ചുട്ട് എന്ന റിയപ്പെടുന്നു. ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ഒക്കെബാബർ രണ്ടാംപകുതിയോടെ താപനില വളരെപെട്ടു കുറയാൻ തൃടഞ്ഞു. മൺസൂൺ പിംഗാളകാലത്തിൽ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ വരണ്ട കാലാവസ്ഥയായിരിക്കും. പക്ഷേ ഉപദീപിശ്ചേരിക്കിടക്കും അവയിൽ ഇതു കാലയളവിൽ മഴ ലഭിക്കുന്നു. ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒക്കെബാബർ ചുട്ട് എന്ന റിയപ്പെടുന്നു.
- (v) അതിശക്തമായി വേറുമും വലിക്കുത്താണ് നീംകുടുക്കിനും മണ്ണാലിപ്പിനും കാരണമാകുന്നു.

(vi) ഇന്ത്യയുടെ കാർഷിക സംവർദ്ധവസ്തുക്കിൽ മൺസൂൺ പരമ്പരയാനമായ പങ്കുവഹിക്കുന്നു. കാരണം, രാജ്യത്ത് ആകെ ലഭിക്കുന്ന മഴയുടെ നാലിൽ മൂന്നുഭാഗവും തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ കാലത്താണ്.

(vii) മൺസൂൺ മഴയുടെ പ്രാഭേശിക വിതരണം അഞ്ചുലിതമാണ്. ഇത് 12 സെന്റീമീറ്റർ മുതൽ 250 സെന്റീമീറ്റർവരെ വ്യത്യാസപ്പെടിക്കുന്നു.

(viii) രാജ്യത്ത് മമാത്രമായോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലയിടങ്ങളിൽ മംഗ്രംമായോ ചില വർഷങ്ങളിൽ മഴയുടെ ആരംഭം ഗണ്യമായി വെക്കുന്നു.

(ix) മൺസൂൺ മഴ ചില വർഷങ്ങളിൽ പതിവില്ലും നേരത്തെ അവസാനിക്കുന്നു. ഇത് നിലവിലുള്ള വിളകൾക്ക് നാലു വരുത്തുകയും ശീതകാലവിളകൾ വിതയ്ക്കുന്നതിന് പ്രധാനകരമായും ചെയ്യുന്നു.

മൺസൂൺഡി പന്ത്രണ്ടി കാലം

കെട്ടാബർ, നവംബർ മാസങ്ങളിലാണ് മൺസൂൺ പിന്നാറുന്നത്. സുരൂവാദി ദക്ഷിണാർബ ഗോളത്തിലേക്കുള്ള അയനാരംഭത്തോടെ ഗംഗാസമതലത്തിലേക്കുള്ള അവധിമര്ദ്ദമേഖലയും തെക്കോട്ട് നീണ്ടാൻ തുടങ്ങും. തമ്മിലും സെപ്റ്റംബർ അവസാനത്തോടെ തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ ദുർബവലപ്പട്ടാൻ തുടങ്ങുന്നു. പശ്ചിമ രാജ്യ സംഗാനിൽനിന്നും സെപ്റ്റംബർ ആദ്യവരേത്തോടെ മൺസൂൺ പിന്നാറുന്നു. സെപ്റ്റംബർ ആവസാനത്തോടെ രാജസംഗാൻ, ഗുജറാത്ത്, പട്ടാംതാൻ ഗംഗാസമതലം, മധ്യന്തരത്തങ്ങൾ (Central high lands) എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്നും മൺസൂൺ പിന്നം റൂനും ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽനിന്നും വടക്കുഭാഗങ്ങളിൽ കെട്ടാബർ ആരംഭത്തോടെ ന്യൂനമർദ്ദം വ്യാപിക്കുന്നു. നവംബർ തുടങ്ങത്തിൽ ഇത് കർണ്ണാകാം, തമിഴ്നാട് പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് നീണ്ടുനിന്നു. ഡിസംബർ മധ്യത്തിൽ ന്യൂനമർദ്ദമേഖലയും ഉപഭൂക്താം ഉപദീപിപിയ ഇന്ത്യയിൽനിന്നും പൂർണ്ണമായും നീക്കംചെയ്യപ്പെടുന്നു. തെളിഞ്ഞത് ആകാശവും ഉയരുന്ന താപനിലയും പിംഗാളാം മൺസൂൺഡി പ്രതേകതയാണ്. ഈ സമയത്തും കുറഞ്ഞ വളരെ ദുരിക്കപ്പെട്ടു കുറയാൻ തുടങ്ങുന്നു. മൺസൂൺ പിംഗാളകാലത്തിൽ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ വരണ്ട കാലാവസ്ഥയായിരിക്കും. പക്ഷേ ഉപദീപിശ്ചേരിക്കിടക്കും അവയിൽ ഇതു കാലയളവിൽ മഴ ലഭിക്കുന്നു. ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒക്കെബാബർ ചുട്ട് എന്ന റിയപ്പെടുന്നു.

ആൻഡ മാൻ കടൽപ്പറ്റേശങ്ങളിൽ രൂപപ്പെട്ട് തെക്കൻ ഉപദീപിയ ഇന്ത്യയുടെ കിഴക്കൻ തീരങ്ങളിൽ കടന്നു സഞ്ചരിക്കുന്ന ചക്രവാത്തങ്ങളാണ് ഈ കാലത്ത് വ്യാപകമായ മശയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നത്. ഇവ അതുകൊം വിനാശകാർക്കളാണ്. കൂഷ്ഠം, ഗോബാവൽ, കാവേരി നിൽ കളുടെ ജനസാമ്പദതയെന്നെ യെൽറ്റപ്പറ്റേശങ്ങളിൽ ഇത്തരം ചക്രവാത്തങ്ങൾ സാധാരണയായി വിശേഷം. ഓരോ വർഷത്തിലും കൊടുക്കാറ്റ് ഇവിടങ്ങളിൽ വലിയ നാശം വിതര്യക്കുന്നു. പുരുക്കംചില ചക്രവാത്തങ്ങൾ പശ്ചിമഖഗാർഡ്, ബംഗ്ലാദേശ്, മൂന്നാർ തുടങ്ങിയ തീരങ്ങളിലും വിശ്രിതക്ഷേത്രങ്ങൾ, കോരമണ്ഡൽ തീരത്ത് ലഭിക്കുന്ന മഴയിൽ ഏറ്റവും തുടർച്ചയാണ് നിന്നുമാണ്. ഇതുപോലെ ഒരുപോഴുള്ള ചക്രവാത്തങ്ങൾ അബ്ദിക്കരിക്കിയെല്ലാം സാധാരണമല്ല.

പരമ്പരാഗത ഇന്ത്യൻ ഔദ്യുക്കൾ

പരമ്പരാഗതമായി ഇന്ത്യയിൽ ഒരു വർഷത്തെ ആർത്ഥികമാനം ഔദ്യുക്കളായി വിജിച്ചിരിക്കുന്നു. ഉത്തരേന്ത്യയിലും മധ്യ ഇന്ത്യയിലും സാധാരണയായി ജനങ്ങൾ പിൻതുടരുന്ന ഇല ഔദ്യുക്കം അവരുടെ പ്രായോഗിക ജനങ്ങളിലും കാലാവസ്ഥപരിശോഭങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് കാലങ്ങളായുള്ള അവബോധവും ആധാരമാക്കി രൂപപ്പെട്ടവയാണ്. എന്നിരുന്നാലും ഇവയ്ക്ക് ഉക്കിഞ്ചേരു യിലെ ഔദ്യുക്കങ്ങളായി സമാനത കുറവാണ്. കാരണം ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ ഔദ്യുക്കളിൽ വളരെചെറിയ വ്യത്യാസം മാത്രമെ പ്രകടമാകുന്നുള്ളൂ.

ഔദ്യുക്കൾ	മാസങ്ങൾ (ഇന്ത്യൻ കലണ്ടർ (പ്രകാരം))	മാസങ്ങൾ (ഹംഗ്രീഷ് കലണ്ടർ (പ്രകാരം))
വർഷം	ഒപ്പതു-ഒമ്പാശം	ജൂലൈ-ഓഗസ്റ്റ്
ശരത്	ശ്രാവണം-ഭാദ്രം	സെപ്റ്റംബർ-ഒക്ടോബർ
ഫോമത്ത്	ആഗസ്റ്റ്-ഓഗസ്റ്റ്	നവംബർ-ഡിസംബർ
ശിഡിംഗ്	മാർച്ച്-പാത്തിഗൃഹം	ജനുവരി-ഫെബ്രുവരി

മഴയുടെ വിതരണം (Distribution of Rainfall)

ഇന്ത്യയിൽ ശരാശരി വാർഷികവർഷപാതം 125 സെൻ്റിമീറ്ററാണ്. പക്ഷേ ഇത് സാന്നിധ്യമായി വളരെയിക്കം വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. (ചിത്രം 4.11)

ഉയർന്ന മഴ ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: പശ്ചിമതീരങ്ങൾ, പശ്ചിമാളംപ്രദേശം, വടക്കുകിഴക്കൻ ഉപദീപിമാലയിൽ പ്രദേശങ്ങൾ, മേലാലയ കുന്നുകൾ എന്നിവ യാണ് ഉയർന്ന മഴ ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ. ഇവിടങ്ങളിൽ 200 സെൻ്റിമീറ്ററിൽ കുടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്നു. വാസി, ജനത്തിനു കുന്നുകളിലെ ചിലയിടങ്ങളിൽ 1000 സെൻ്റിമീറ്ററിൽ കുടുതലായി മഴ ലഭിക്കുന്നു. ഭേദമായി താഴ്വരയിലും സമീപദേശങ്ങളിലും മഴ 200 സെൻ്റിമീറ്ററിൽ താഴ്യവാണ്.

മിതമായ മഴ ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ

100 സെൻ്റിമീറ്ററിനും 200 സെൻ്റിമീറ്ററിനും ഇടയിൽ മഴ ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളുണ്ടും. ദക്ഷിണ ഗുജറാത്ത്, കിഴക്കൻ തമിഴ്നാട്, ബഹിഷ ഉൾപ്പെടുന്ന വടക്കുകിഴക്കൻ ഉപദീപിയ ഇന്ത്യ, ത്യാർവബൻ, ബീഹാർ, കിഴക്കൻ മധ്യപ്രദേശ്, ഉപഹിമാലയത്തിന്തെയും കുചുർ താഴ്വരയുടെ ഭാഗമായി വരുന്ന ഉത്തരഗംഗാസമതലം, മനിപ്പുർ തുടങ്ങിയവയാണ് മിതമായ മഴ ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ.

കുറഞ്ഞ മഴ ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ

പശ്ചിമ ഉത്തരപ്രദേശ്, യൻഹൻ, ഹരിയാന, പഞ്ചാബ്, ജമ്മുകാഷ്മീർ, കിഴക്കൻ രാജസ്ഥാൻ, ഗുജറാത്ത്, ദേക്കാൻ പീറിബും എന്നിവിടങ്ങളിൽ 50 സെൻ്റിമീറ്റർ റിനും 100 സെൻ്റിമീറ്ററിനുമിടയിൽ മഴ ലഭിക്കുന്നു.

പരമിതമായ അളവിൽ മഴ ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: അന്ധ്യാപദ്മേശ്, കർണ്ണാടകം, മഹാരാഷ്ട്ര എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന ഉപദീപിയ പ്രദേശങ്ങൾ, ലഡാക്ക് മേഖല, പശ്ചിമരാജസ്ഥാൻ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ 50 സെൻ്റിമീറ്ററിൽ താഴെമാത്രം മഴ ലഭിക്കുന്നു. ഫീമാലയൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ മാത്രം മഞ്ഞുവിച്ചപയ്യാകുന്നു.

ഇന്ത്യയിൽ മഴയുടെ വിതരണം കാണിക്കുന്ന രൂപം വിശകലനം ചെയ്ത് മഴയുടെ വിതരണക്രമം കണ്ടെത്തുക.


മഴലഭ്യതയുടെ ഏറ്റവുംചീൽ

ലഭ്യതയിലെ ഏറ്റവുംചീലിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ മഴയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത. മഴലഭ്യതയിലെ ഏറ്റവുംചീൽ കണക്കുന്നത് ഇപ്പകാരമാണ്:


$$C. V. = \frac{\text{Standard Deviation}}{\text{Mean}} \times 100$$

ഇവിടെ C.V. എന്നത് coefficient of variation.

C.V. മുല്യം കാണിക്കുന്നത് ശരാശരി മഴ ലഭ്യതയിലുള്ള മാറ്റത്തെയാണ്. ചിലയിടങ്ങളിൽ മഴയിൽ 20 മുതൽ 50 ശതമാനംവരെ മാറ്റം അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്. C.V. മുല്യത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇന്ത്യയിൽ ധമാർമ്മ ത്തിൽ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള മഴയിലെ വ്യത്യാസത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. പശ്ചിമതീരങ്ങൾ, പശ്ചിമാളംപ്രദേശം, വടക്കുകിഴക്കൻ ഉപദീപിയ പ്രദേശം, കിഴക്കൻ ഗംഗാസമതലം, വടക്കുകിഴക്കൻ ഇന്ത്യ, ഉത്തരാവാസ്യ, ഫീമാലയൻ ചിലപ്പോൾ ജമ്മുകാഷ്മീർഒന്നിൽ തെക്കുപടിഞ്ഞാറാണ് ദക്ഷിണ ശരത്തെ തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളിലെ മഴ ലഭ്യതയുടെ ഏറ്റവുംചീൽ ചീൽ 25 ശതമാനത്തിൽ താഴെയാണ്. ഈ പ്രദേശങ്ങൾ തീരിൽ വാർഷിക മഴ 100 സെൻ്റിമീറ്ററിൽ കുടുതലാണ്. പട്ടണങ്ങൾ രാജസ്ഥാൻ, ജമ്മുകാഷ്മീർഒന്നിൽ വടക്കുംഗാംഡാണ്ഡ്, യക്കാൻ പീറിബും ഇപ്പുറയുടെ മഴലഭ്യതയിലെ ഏറ്റവുംചീൽ 50 ശതമാനത്തിൽ കുടുതലാണ്. ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ വാർഷിക മഴ 50 സെൻ്റിമീറ്ററിൽ കുടുതലാണ്. ശേഷിക്കുന്ന ഭാഗ



വി.ഡി. 4.11 : ഇന്ത്യ വാർഷിക ഓഫ്



ചിത്രം 4.12 : ഇന്ത്യ വന്വസ്തീക ശാഖയുടെ വ്യതിയാനം

അതിൽ 25 മുതൽ 50 ശരമാനംവരെ മഴ ലഭ്യതയിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചില്ലാണോക്കുന്നു. ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ 50 സെന്റീമീറ്റർ മുതൽ 100 സെന്റീമീറ്റർവരെയാണ് വാർഷിക മഴ ലഭ്യത. (ചിത്രം 4.2)

ഇന്ത്യയിലെ കാലാവസ്ഥാമേഖലകൾ

ഇന്ത്യയിൽ പൊതുവായി മൺസൂൺ കാലാവസ്ഥ യാണോക്കില്ലോ വിവിധ കാലാവസ്ഥാമേഖലകളുടെ സമന്വയം പ്രാദേശികതലത്തിൽ കാലാവസ്ഥയിൽ ധാരാളം വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തുന്നു. ഈ പ്രാദേശിക വ്യത്യാസങ്ങളും മൺസൂൺ കാലാവസ്ഥയിൽ ഉപഭോഗം അംഗങ്ക് അടിസ്ഥാനമാക്കുന്നത്, ഇതിനുസരിച്ചാണ് കാലാവസ്ഥ മേഖലകൾ നിർണ്ണയിക്കുന്നത്. വിവിധ കാലാവസ്ഥാമേഖലകളുടെ കുടിച്ചേരുത്തിമുളമാണ് സമാനസ്വഭാവവിശേഷതയുള്ളത് കാലാവസ്ഥാമേഖലകൾ തുപ്പപ്പെടുന്നത്. എല്ലാ കാലാവസ്ഥ വർഗ്ഗീകരണ മാതൃകകളില്ലോ നിർണ്ണായകമായി പരിഗണിക്കുന്ന രണ്ട് ഘടകങ്ങളും അന്തരീക്ഷമർദ്ദവും മഴലഭ്യതയും കാലാവസ്ഥാവർഗ്ഗീകരണം തു സങ്കീർണ്ണമായ ഉദ്യമമാണ്. പലതരം കാലാവസ്ഥ വർഗ്ഗീകരണമാതൃകകൾ നിലവിലുണ്ട്. കെപ്പുൻ്റെ കാലാവസ്ഥാവർഗ്ഗീകരണ മാതൃകപ്രകാരം ഇന്ത്യയുടെ കാലാവസ്ഥാമേഖലകൾ താഴെപ്പറയുന്നവയാണ്.

കെപ്പുൻമാതൃക പ്രതിമാസ ഉഷ്ണമാവിശ്വാസ്യും മഴലഭ്യതയുടെ അളവ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് തയാറാക്കുന്നതു.

ചിത്രം 4.1 : കെപ്പുൻമാതൃകപ്രകാരം ഇന്ത്യയിലെ കാലാവസ്ഥ മേഖലകൾ

കാലാവസ്ഥ തരങ്ങൾ	പ്രദേശം
Aw - പ്രസാനമായ വരണ്ട കാലാവസ്ഥാ കാലാവസ്ഥ	ഗാന്ധാക്ക് തെക്കുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പദ്ധതിരിം
As - വരണ്ട വേന്നലോടുകൂടിയ മൺസൂൺ കാലം	തമിഴ്നാട്ടിൽ കോറമാൻസിൽ തിരാ
Aw ഉഷ്ണമേഖല സാവന (Tropical savannal)	കൈശിണായനരേഖകൾ തെക്കുള്ള ഉപവിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചു; അർധമരുഭ്യം (Semi arid) കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അദ്ദേഹം 'S' എന്നും മരുഭ്യകാലാവസ്ഥയ്ക്ക് 'W' എന്നീ അക്ഷരങ്ങളും ഉപവിഭാഗങ്ങൾ വിശദമാക്കുന്നതിന് ചെറിയ അക്ഷരങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചു.
BShw - അർധമരുഭ്യം സ്നേഹി കാലാവസ്ഥ	വടക്കുപിണ്ഠാരിൽ ശുജാത്ത്, പഹിമ രജസ്ഥാന്റെയും പബ്ലോ ബിശ്രയും ചില ഭാഗങ്ങൾ
BWhw ഉഷ്ണമരുഭ്യം	പഹിമ രജസ്ഥാൻ
Cwg - വരണ്ടതെന്തുകാലത്തോടുകൂടിയ മൺസൂൺ	ഗംഗാസമതലം, കിഴക്കൻ രജസ്ഥാൻ, വടക്കൻ മധ്യപ്രദേശ്, വടക്കുപിണ്ഠൻ ഇന്ത്യയുടെ മിക്കവാറും ഭാഗങ്ങൾ
DSc - ചെറുവേന്നലോടുകൂടിയ തണ്ണുത്ത ആർട്ടിക്കുള്ള ശൈത്യകാലം	അരുണാചലപത്തിപ്രദേശ്
E മൃദുവീഘ കാലാവസ്ഥ	ജമുകാർഡി, ഹിമചൽപ്പദ്മൻ, ഉത്തരവാസ്യ

പെട്ടത്. കെപ്പുൻമാതൃകപ്രധാന കാലാവസ്ഥ ഉപവിഭാഗങ്ങൾ കണ്ണടത്തായിട്ടുണ്ട്.

- ഉഷ്ണമേഖലാ കാലാവസ്ഥ (Tropical climates): ശരാശരി പ്രതിമാസ ഉഷ്ണമാവ് വർഷം മുഴുവൻ 18°സെൽഷ്യൂസിൽ കുടുതലുള്ള പ്രദേശങ്ങളാണ് ഇതിൽപ്പെടുന്നത്.
- വരണ്ട കാലാവസ്ഥ (Dry climates): താപനിലയിൽ യോക്കാളും മഴലഭ്യത കുറവായതിനാൽ വരൾച്ച


അനുഭവപ്പെടുന്നു. വരണ്ട അവസ്ഥ കുറവാണ കിൽ അർധമരുഭ്യം (semi-arid) കാലാവസ്ഥയും (S); വരൾച്ച കുടുതലാണെങ്കിൽ മരുഭ്യം (arid) കാലാവസ്ഥയായിരിക്കും (W).

- ഉഷ്ണ മിഡേഷ്യൻ കാലാവസ്ഥ (warm temperate climate), ശൈത്യമേറിയ മാസത്തിൽ ശരാശരി ഉഷ്മാവ് 18° സെൽഷ്യൂസിൽക്കും മെമനസ് 3° സെൽഷ്യൂസിൽക്കും ഇടയില്ലെങ്കിൽ.
- ശൈത മിഡേഷ്യൻ കാലാവസ്ഥ (cool temperate climate): ഉഷ്ണമേറിയ മാസത്തിലെ ശരാശരി താപനില 10° സെൽഷ്യൂസിൽ കുടുതലും ശൈത്യമേറിയ മാസത്തിലെ ശരാശരി താപനില 15° സെൽഷ്യൂസിൽ കുറവുമായിരിക്കും.
- പരിമാഡു കാലാവസ്ഥ (ice climates): ഉഷ്ണമേറിയ മാസത്തിലെ ശരാശരി താപനില 10° സെൽഷ്യൂസിൽ താഴെയായിരിക്കും.

കാലാവസ്ഥ വിശദങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനായി കെപ്പുൻമാതൃകപിഹനങ്ങളും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിൽ. ഓരോ കാലാവസ്ഥാവിഭാഗവും മഴലഭ്യതയുടെയും അന്തരീക്ഷ താപനിലയിലെയും വ്യത്യാസങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി വിശദും ഉപവിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചു; അർധമരുഭ്യം (Semi arid) കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അദ്ദേഹം 'S' എന്നും മരുഭ്യകാലാവസ്ഥയ്ക്ക് 'W' എന്നീ അക്ഷരങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചു.

ഉപവിഭാഗങ്ങൾ

- പര്യാപ്തമായ അളവിൽ മഴ ലഭിക്കുന്നു (Sufficient precipitation)
- വരണ്ട മൺസൂൺ കാലാവസ്ഥയായിട്ടും മഴക്കുള്ളിട്ടും
- ഗംഗാസമതലം
- വരണ്ട ശൈതകാലം
- നാലുമാസത്തിൽ കുറവാണ ശരാശരി ഉഷ്മാവ് 10 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യൂസിൽ മുകളിൽ



(w) വരെത്തും പുട്ടുകൂടിയതും

ഇപ്പകാരം ഇത്യും എട്ട് കാലാവസ്ഥാ മേഖലകളായി തിരിക്കാം. (പട്ടിക 4.1, ചിത്രം 4.13)

മൺസുണ്ണും ഇന്ത്യയിലെ സാമ്പത്തിക ജീവിതവും

- (i) ஹட்டியுடைய கார்ஷிக் காலபுக்ரதினிற் அடிக்கால நம்முடைய கேட்டு அதற்குத் தொண்டின் மள்ளிழைன். காலென், ஹட்டியுடைய பெருமானம் ஜனனைக்கும் அவற்றுடைய ஜில்லைதொழிலையும் கார்ஷிக்கவுடன்தி யிலேற்பெழுத்திருக்குமானவர்கள். தெகுபூப்திரை எல் காலங்களைத்து அதுசூரியிச்சாள் ஹட்டியில் கூஷி செறுப்பத்.
 - (ii) ஹிமலயங்கள் பிரேரங்களிலே காலங்களைத்து அல்லது யிட்டைக்குமில்லை வர்ஷங் முழுவதில் விழுக்கல் அல்லது கிரி ஸ்ஸுங்கால் வழக்குமானதின் அடிக்காலங்களைத்து.
 - (iii) மள்ளிழைன் காலங்களைத்து அல்லது வழக்குமானதின் ஸ்ஸுங்காலங்களைத்து விவியதரம் விழுக்கல் கூஷி செறுப்பதின் ஸ்ஸுங்காலங்களைத்து.
 - (iv) மத்தியபூர்வகால ஏற்குக்குறித்து தொடர்புடைய பில காலங்களில் அரை வர்ஷங்கள் வர்ஷங்களைத்து அல்லது கிரி வெறுத்தபோக்கமே ஸஂவிக்கானிடமாகிறது.
 - (v) தமாஸமாதங்களில் வேஷத்து அல்லவில்லை கூடும் மாததை அதுசூரியிச்சாள் ஹட்டியுடைய கார்ஷிக் பிரேரங்களைத்து பூர்வமாக்குமானத். மாத குடியூக்காலங்களில், பிரதேகக்கிழமை ஜலங்கள் படி ஸ்ஸுங்கால் விக்காலிச்சில்லாத பிரேரங்களில்லை, கூஷி செறுப்பு பிரதிக்குமல்லாத வொயிக்கூடும்.
 - (vi) பெட்டுமை மள்ளிழைன் அதுமானம் ஹட்டியுடைய கீலை ஏறு வலிய பிரேரங்கள்து மறைவில்லைக்கும் காலங்களைத்து.
 - (vii) மினோப்ஸ் சுக்கவாதனைச் சூஷ்டிக்கூடும் செதையுக்கால மாத உத்தரையுடையிலை எல்லி விழுக்கல்க்கு அத்துக்கூடும் டூளாக்கமான்கள்.
 - (viii) வெவியிழுமான் கெச்சன், வார்த்தா, வீட்குக் கூடும் மாதாக ஏற்கிவழித்து ஹட்டியுடையிலை பிரேரங்களிக் காலங்களை வழதியாக்காலங்கள் பிரதிமலி கூடும்.

അനുശോള്ളത്വപരമം

மார்ட் குடு பிரக்டுதி தியமமான். காலங்வசமயூங் முள்காலங்களில் ஆரோமாயூங் பிரபநிக்கமாயூங் மார்ட் கைக்கு வியெழலிடுவான். காலங்வசம் ஹஃபூஷூங் மார்ட் கொட்டிரிக்கூன்னான். பக்ஷ ஹு மார்ட் அபுஸும் என்னு மார்க். ஓமுவஏற்ற விரைலமாய் பிரபநிக்கைக்கு மற்று மற்ற மார்ட் முடிவுக்கு விரைலமாயிருக்கிறது என்னான் இம் விஜ்ஞானியமாய் தெளிவுக்குத்திருக்கிறோம் வெளிவாகு நான் (Fundamentals of Physical Geography - பாபாவு

என்கூட் - பார் 2 - Geological Time Scale). ஆகோது தாவப்பகுதி நினைவு வாயிக்கூக்கொண்டு அவரை செல்கிறது? பிரகாரம் உங்கள் கூடாதை வள்ளுதலிலும் வழியிடுவதற்கு மிகவும், அதற்கு கஷ்டத்தில் மலிநிகர்ணத்தில் காரணமாய வாதகண் இடங்களினிடையிலும் ஆகோதுதாவப்பகுதிகள் காரணம். ஆகோதுதாவப்பகுதிகளில் பர்ப்பு செய்யுமோல் பரிதாரமாக போன்ற நினைவுகளைக் கேட்கிறார்கள் மலோ.

ആര്യോദയത്വപനിലി സാരമായി വർധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായി പൂറ്റി ഒളപ്പെടുന്ന കാർബൺ ദൈവം ഓക്സിഡേറും പ്രധാനകാര്യം. ഫോസിൽ ഇന്ധനം കത്തിക്കുന്നതിലൂടെ ഈ വാതകം വൻതോതിൽ അഭ്യരിക്ഷയ്ക്കിലെത്തുന്നു. കാർബൺ ദൈവം ഓക്സിഡേറും അന്തരീക്ഷത്തിൽ കുറഞ്ഞ അനുവിൽക്കാണപ്പെടുന്ന വാതകങ്ങളായ മീമെറ്റിൻ, ക്ലോറോഫ്ലൂറോ കാർബൺ, ടൈറ്റാസ് ഓക്സിഡേറും ഹരിതഗൃഹവാതകങ്ങൾ എന്നവിയപ്പെടുന്നു. ഈ വാതകങ്ങൾ ആര്യോദയ താപനാശിനി ആക്കം കുടുന്നു. ഈ വാതകങ്ങൾ കാർബൺ ദൈവം ഓക്സിഡേറും കുടുതൽ ഭീമാഖരംഗങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കണം ചെയ്യുന്നതിനും ഹരിതഗൃഹപ്രവാവം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും പര്യാപ്തമായവയാണ്. ആര്യോദയത്വപനാംഗം ഡ്യൂബ്ലിനിലെ ഫിലിപ്പബേബിവും പ്രവർത്തണാഖരിലെ ഫിലിപ്പ നികളും ഉരുക്കുന്നതിനും തയ്യാലം സമ്പ്രദായികൾ ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നതിനും കാർബൺമാക്സ് എന്ന കരുതപ്പെടുന്നു.

இழுதிலை கரையில் வால்ஷிக் தாபகிலாயில் கடினம் 150 வர்ஷத்தினிடதில் வர்யனவு உள்ளதிரு ஸ்க். 2100-லை இழுவதை தாபகிலாயில் 2° எஸ்தீஷ்யு ஸிலெஞ் வர்யன ஸாவிக்கூ ஏற்று காணக்கூப்போடு நூ தாபகிலாயிலிருந்து முதல் வர்யன மர்த் பல மார்த் தீக்கூ காணமாகுா. ஹிமானிக்கூ கடலிலை மனதூபாதிக்கூ உருகுந்தான் பியானமாயூ ஸமு செனிவெட் உயருந்திருக்கானதைக் காணமாகுந்த.

സമീപകാല പ്രവചനങ്ങൾപ്രകാരം 21-ാം നൂറ്റാം ശതകത്തിൽ അവസാനത്തോടെ സമുദ്രിനിപ്പ് ശരാശരി 48 സെൻ്റീമീറ്റർവരെ ഉയരും തുടർച്ചായായാണ് വർഷിപ്പിക്കും. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം, സുക്ഷ്മാബന്ധകൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളായ മലേറിയ പോലുള്ളതുവ പടരുന്നതിന് കാരണമാകും. ചില പ്രദേശങ്ങൾ നന്ദാരിനാരും മറ്റുള്ളവ വരുത്തുമായി മാറ്റപ്പെട്ടും. കാർഷികസ്ഥാനങ്ങൾ മാറുകയും മനുഷ്യരാജിയും ആവാസവ്യവസായയും മാറ്റങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയും ചെയ്യും. സമുദ്രം പ്രേ എ സെൻ്റീമീറ്റർ ഉയർന്നാൽ മുന്ത്യൻ കടക്കാനുണ്ടാകുക?

ചോദ്യങ്ങൾ



1. ചുവടെ നൽകിയിട്ടുള്ളവയിൽനിന്നും ശത്രുതതരം തിരഞ്ഞെടുത്തുതുക.
 - (i) ശൈത്യകാലത്തിന്റെ ആരാത്തിൽ തമിഴ്നാട് തീരങ്ങളിൽ മഴ ലഭിക്കുന്നതിന് കാരണമെന്ത്?
 - (a) തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ
 - (b) മിത്രാഷ്ട്ര പ്രക്രാതിജ്ഞൻ
 - (c) പട്ടാളക്കരിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ
 - (d) പ്രാദേശിക വായുപ്രക്രമണം
 - (ii) 75 ശതമാനത്തിൽ കുറവ് വർഷിക വർഷപരതം ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ വിസ്തൃതിയുടെ ഏതു ഭാഗമാണ്?
 - (a) പകുതി
 - (b) മുന്നിലോന്ന്
 - (c) മുന്നിരിൽ തണ്ട്
 - (d) നാലിലോന്ന്
 - (iii) നൽകിയിട്ടുള്ളവയിൽ ദക്ഷിണാഫ്രീക്ക് സംബന്ധിക്കുന്ന വസ്തുതയ്ക്കാൽത്തെ ഏത്?
 - (a) ഇവിടെ ദൈനനിക ശരാശരി താപനില കുറവാണ്.
 - (b) ഇവിടെ വർഷിക ശരാശരി താപനില കുറവാണ്.
 - (c) ഇവിടെ താപനില വർഷിക മുഴുവൻ ഉയർന്നതായിരിക്കും.
 - (d) ഇവിടെ തീവ്രമായ കാലാവസ്ഥ അനുഭവപ്പെടുന്നു.
 - (iv) സുരൂരശ്ശമികൾ ദക്ഷിണാഫ്രീക്ക് പാബമായി പതിക്കുന്നേയാൽ ചുവടെ നൽകിയിട്ടുള്ളവയിൽ എത്ര കാലാവസ്ഥമുണ്ടാക്കിണ്ടോന്നും നാലേക്കുന്നും?
 - (a) കുറഞ്ഞ താപനിലമും വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ഇന്ത്യയിൽ ഉച്ചമരിം രൂപൊപ്പുന്നു.
 - (b) ഉയർന്ന താപനില നിമിത്തം വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ഇന്ത്യയിൽ നൃനമർഡം രൂപൊപ്പുന്നു.
 - (c) വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ഇന്ത്യയിൽ താപനിലയിലും അന്തരിക്കശമ്പാൽത്തിലും ധാതനാരു മാറ്റവും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്.
 - (d) വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ഇന്ത്യയിൽ ‘ലു’ കാറ്റ് വിശേഷം.
 - (v) നൽകിയിട്ടുള്ള എത്ര ഇന്ത്യൻ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് കെപ്പുംബൈ കാലാവസ്ഥ മാതൃകപ്രകാരം ‘As’ തരം കാലാവസ്ഥ അനുഭവപ്പെടുന്നത്?
 - (a) കേരളവും, തീരാദേശ കിഴക്കാടകവും
 - (b) ആൻഡമാൻ നികോഡമാൻ ദീപിപ്പുകൾ
 - (c) കോമറാൻ തീരം
 - (d) അസാമിലും അനുഭാചൽപ്പരാശരിലും
2. താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മുപ്പുത് വാക്കിൽ കുറയാതെ ഉത്തരവെച്ചുതുക.
 - (i) ഇന്ത്യയിലെ അന്തരീക്ഷസ്ഥിതിയെ സ്ഥാധിനിക്കുന്ന മുന്ന് പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ എന്തെല്ലാം?
 - (ii) അന്തർ ഉൾഖനങ്ങളെല്ലാ സംക്രമണങ്ങളെല്ലാം?
 - (iii) മണസ്സുണിയ്ക്ക് പൊട്ടിപ്പുറപ്പാട് (bursting of monsoon) എന്നാലെന്ന്? ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കുടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്ന സംഗ്രഹം എന്ത്?
 - (iv) ‘കാലാവസ്ഥാമേഖല’ വിശദീകരിക്കുക. കെപ്പുംബൈ കാലാവസ്ഥ വർഗ്ഗീകരണത്തിന് അടിസ്ഥാനം എന്തെല്ലാം?
 - (v) ശൈത്യകാലങ്ങളിൽ വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ഇന്ത്യയിൽ മഴയ്ക്ക് കാണണമാകുന്നത് എത്രതരം ചാക്രവർ അഭ്യന്തരാണ്? ഇവ ഏവിടെയാണ് രൂപൊപ്പുന്നത്?
3. ചുവടെ തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് 125 വാക്കിൽ കുറയാതെ ഉത്തരവെച്ചുതുക.
 - (i) വിശാലമായ കാലാവസ്ഥ ഏകത്തരതിനതിനും മഴയിൽ ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥയിൽ ധാരാളം പ്രാദേശിക വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. ഈ പ്രസ്താവന അനുയോജ്യമായ ഉദാഹരണങ്ങൾ സഹിതം വിശദമാക്കുക.
 - (ii) ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാവകുപ്പിയ്ക്ക് വർഗ്ഗീകരണപ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽ ഏതുതരം ഇന്ത്യക്കൂടാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്? ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇന്ത്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാലാവസ്ഥ പ്രത്യേകതകൾ വിശദമാക്കുക.

പ്രവർത്തനം, പ്രോജക്ട്

ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപടത്തിൽ താഴെ നൽകിയിട്ടുള്ളവ രേഖപ്പെടുത്തുക.

- (i) ശൈത്യകാല മഴ ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ
- (ii) വേനൽക്കലാവത്തിൽ കാറ്റിന്റെ ശരം
- (iii) 50 ശതമാനത്തിൽ കുടുതൽ മഴയിൽ ഏറ്റുകൂടംചുണ്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ
- (iv) ജനുവരിയിൽ 15° സെൽഷ്യൂസിൽ കുറവ് ഉംഖംമാവ് അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ
- (v) 100 സെൻ്റിമീറ്റർ സമവർഷ രേഖ



15V2X5

卷之三

5

സാഭാരികസ്ഥാപാലങ്കൾ

നാണ്ണൻ എല്ലപ്പും വാന്നത്തിൽ കാണുന്നതുകൂടെ അപ്പോളിക്കുന്നും? വാന്നത്തിൽ വരുത്തുന്ന പദ്മ മണംമുഖം ചെറി കുറു നാമ്മുട പാനാടുകൂലിലും കാണാറുണ്ടെന്ന്. ഏറ്റവും യാഥാർത്ഥ സ്വഭാവം കാണുന്നതുകൂലിലും നാടുവായിരിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങൾക്കും വ്യത്യസ്ഥലപ്പെടിക്കേണ്ടത്? നാണ്ണൻ വാന്നത്തിൽ നാടുവായിരിക്കുന്നതുനാണു വരുത്തുന്നതു; എന്നാൽ അംഗം നാണ്ണനുകൂലിൽ ഒരു പുന്നു നാടുവായിരിക്കുന്നതുകൂലിൽ.

ମନ୍ଦିରରେ ଅପରିଵୃତ୍ତାଳ୍ପରିକରଣ କରିବାକାଳେ ଏହା
ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଯେଉଁଠିକରାଯାଏ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଯେଉଁଠିକରାଯାଏ
ଆମଙ୍କୁ କରିବାକାଳେ ଏହାକାରରେ ଯେଉଁଠିକରାଯାଏ ଏହାକାରରେ
ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଯେଉଁଠିକରାଯାଏ ଏହାକାରରେ ଯେଉଁଠିକରାଯାଏ

സാമ്പത്തികസൗജ്യംമുണ്ടാക്കിയെന്ന് എന്ന വൈവിധ്യം
മുണ്ട് നാടകാർ തുണ്ട്. അതിനുപയോഗിച്ചുതന്നീരുകളിലെ
ചീറ്റുരം-വണ്ണാനാന്തും ആവശ്യമാർ, പദ്ധതിക്കൊണ്ടിരുമുണ്ട്
നാടകിലെ നാടകക്കാശം ദിവസക്കുള്ളില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാണ
അവധി മരഞ്ഞാക്കൽ, ബാധിൽപ്പാടുക്കുള്ളിലെ ഉണ്ടാണ
അവധി വന്നുണ്ടു് കാലാന്തരംഡാക്കുന്നു, നാടകാനന്ദി ഒരു
എതിരില്ലും അനീക്കമരുമുള്ളിപ്പാടുമാണു് വൃദ്ധക്കമാറി
കാണുന്നതുനാ കൂളിക്കുർക്കുട്ടി (Castem) എന്നിലൂം നാടു
അവധിയുടെ ഒരു വിധിയുണ്ടുണ്ടു് എന്നും
പ്രാഥമികാന്തരം കാലാന്തരാനന്ദിഡാക്കുന്നു മന്ത്രിക്കുമ്പും
വ്യത്യാസാനന്ദിഡാക്കുന്നും ഇന്ത്യയിൽ അനുകാലിക്കു
മണ്ണും വ്യത്യാസാനന്ദിഡാക്കുന്നും സാമ്പത്തികമുണ്ടാക്കാൻ

விவரங்களை கண்டுபடுத்தி நூலை முறையில் போடகூடிய எவ்வளவிலேயும் காலாங்காலமைய அனுகூலமாக பொறுதியிலேயாகக் கூட அடிகாலாகவே கூறுவதிலேயிருப்பதை விதிவிளைவாக விடுகிறேன்.

- i) இங்களேவும் விதைபார்வையளவுடைய அமைப்பு என்று பல்கலைகளும்
 - ii) இங்களேவும் ஆலூபார்சியை வாணிபதி

- iii) ഉള്ളണാമുകവാഹനത്തോടു

- iv) ປົກລົງທາງອາຫາດວິທີ


- v) കാര്യക്രമ പത്രപ്പുത്തിലെ വകുപ്പുകൾ

தங்களும் வலு நிதியுதவிக் கடன்களும்

അക്കാദമിക്സ് പരിപാലന വന്നുണ്ട്.

അടിവാസിന്മാരുടെ പരിശീലന കമ്മീറ്റീയുടെ രൂപാദാനക്രമിലെ ഒരു കുറഞ്ഞ പ്രത്യേകതയുണ്ട്. എന്നു





வாழ்வதைக் கண்டு வாழ்வதை என்று வடித்திருக்கிற மூல வாய்களின் நிலைமைகளை உள்ளடக்கம் ஏற்கும் படித்து கொள்கிற, கொடுத்துக் கொண்டு வருகிற ஒரு வகையான பெயர்.

ഉന്നുവിലെ വന്നെല്ലാട്ട് സ്ഥാപനങ്കിൽ പ്രായംതും ശിഖിക്കുമ്പോൾ തിരിപ്പറിഞ്ഞിരുന്നു; അതുകൊണ്ട് അണ വസ്തുക്കൾക്കു ദേഹവിൽ മാറ്റുമ്പോൾ പ്രക്രിയയും അവർ നബ്ദിക്കിരുന്നു; അഡാൻ ഉന്നുവിലെ വന്നെല്ലാട്ട് ആം നാളിലും കാര്യക്കാരികളും വന്നു; ഗവർണ്ണറിലേംതന്നും കൂടി ആജനിലെവയും കാർഷിക വന്നുവിൽ ഏറ്റപ്പുംതോറി ഒപ്പിലോ എൻ ദാട്ടപിടിപ്പിച്ചു, എറിക്കിൽ ഓപ്പുന്നതും വിശ്വാസം ആവശ്യമാക്കിനായിരുന്നു മുത്. തെരിയി, കംപ്പി, റൈഫീൽ ദാട്ടപിടിക്കുവന്നുവയും സ്ഥാപനിക വന്നുവിൽ മുതി ആശാറി. കമ്മറ്റി പ്രതിക്രിയയിലേംവന്നുറ്റ ഒരു വസ്തുക്കൾ വന്നെല്ലാട്ട് ഉപയോഗിച്ചു, നമ്മുടെ പ്രക്രിയയാട്ടും സ്ഥാപനിക്കുന്നുംകൊണ്ടുനിന്നും ഉപയോഗിച്ചുവന്നിരുന്നു വന്നെല്ലാട്ട് ഉപയോഗം അഡാൻ വന്നുവിൽ ആശാറുംകൊണ്ടുനിന്നും ഉപയോഗിച്ചുവന്നിരുന്നു.

இங்கோடுவார் கலாசிற்பியை வருளாது



క్రితం 5.3 : ప్రాచీనమైన ఇంగ్లోష్యుల్జిస్ట్ వాచాలు

100 മുതൽ 200 ദശലിറ്റിൽറുൾ ടാ പാസ്സേറ്റു പ്രദാനമായിരുന്നു. തുലക്കാരിയും വന്നാൽ വ്യാപകമായി കണക്കുന്നുണ്ട്. വടക്കുപിശ്ചാവൽ സംസ്ഥാനമാറ്റിയും ഏറ്റു ലഭിച്ച അംഗീകാരമായും പാരിസാലൈറ്റിന്റെ കിട്ടുകൾ പരിശോധിയും ബന്ധിപ്പിയും തുല കാണുന്നതുനാശക്കും, സാൻ, അഡ്വോ, ഫൂറ, ഫാരൂ, കെല്ലി, സാഫർ, കുറാഖു, പരമം ടുടഞ്ചിയവയാണ് ഇവിടെ വളരുന്ന പ്രധാന അടിസ്ഥാനം.

ବିଜ୍ଞାନର କଥାରେ ପ୍ରତିକାଳିକାରୀ

(Tropical Thorn Forests)

50 എഞ്ചിനീയറുടെയും കാരാ മാ ലഭിക്കുന്ന പ്രദാനം അളവിലോൻ്റെ ഉപഭൗംഗവല്ല വൃഥിക്കുന്നതുകൾ കാണുന്നു എന്നത്. ഒരുവർധിച്ചുമാറ്റിനു പ്രസ്തുതയും കുറിപ്പുകൾക്കുള്ളു നിംബന്തതാണ് ഈ വാദങ്ങൾ. കൂർക്കപ്പട്ടികയാണ് പ്രമുഖാന്വീരിയ സംഘവാദാം പ്രസംഗം ചെയ്യും, എറിയാനും, അജ്ഞാനാം, ഗുണാം, മയ്യപ്പാദം, ഉദാഹർജ്ജപ്പാദം എന്നവിൽക്കൊള്ളിപ്പും മുഖ്യം ദാനാദാം കാഡാക്കപ്പട്ടാം, വർഷാശാലിപ്പും ആരിക്കാം, സംശയങ്കുളിപ്പും ഈ പ്രദാനം ചെയ്തിട്ടും മുലകളിലൂടെ ദാനാദാരിൽ ഒരു കുറിക്കാടിലാണ് പ്രതിനിധിയാണ്. നാമാവും, വാദം, ഒരുംപിള്ള ദാനർഹം, ഒരുമി, റൈറ്റ് ഓഫീസി, പ്രഭാന്തി



Лист 5.4 : генерация ошибок

തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രധാന വൃക്ഷങ്ങൾ. മരങ്ങളുടെ അടിക്കാടായി പൂർവ്വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടുന്ന കുണ്ണോക്കി 2 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽവരെ വളരുന്നു.

പർവതവനങ്ങൾ (Montane Forests)

പർവതപ്രദേശങ്ങളിൽ ഉയരം കുടുമ്പതിനനുസരിച്ച് ഉഷ്ണമാർപ്പ കുറയുന്നതിനാൽ കൈനസർജിക സസ്യങ്ങൾ അഞ്ചലിലും ആനുപാതികമാറ്റം വരുന്നു. പർവതവനങ്ങളെ വടക്കൻ പർവതവനങ്ങളെത്തുന്നും തെക്കൻ പർവതവനങ്ങളെത്തുന്നും രണ്ടായി താഴ്തിരിക്കാം.

ഉയരവുതുംസമനുസരിച്ച് ഉഷ്ണമേഖലാ വനങ്ങൾ തിരികിന്നും തുടരാവനങ്ങളിലേക്കുള്ള സസ്യങ്ങളും മാറ്റത്തിൽ ഒരു തുടർച്ചയാണ് എന്നാലുതന്നിരകളിൽ കാണപ്പെടുന്നത്. എന്നാലുതന്നിരകൾ താഴ്വാൻങ്ങളിൽ മാറ്റത്തിൽ ഒരു തുടർച്ചയാണ് എന്നാലുതന്നിരകൾ താഴ്വാൻങ്ങൾ മലപൊഴിയും വനങ്ങളാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. ഇതിൽ തുടർച്ചയായി 1000 മുതൽ 2000 മീറ്റർ ഉയരത്തിനിടയിൽ ആർദ്ധമിത്തോഷ്ണ വനങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നു. വടക്കുകിഴക്കൻ ഇന്ത്യയുടെ ഉയരം കുടിയ മലനിരകൾ, ഉത്തരാവണ്ണിയിൽനിന്നും പശ്ചിമബംഗാളിൽനിന്നും മലബ്രദ്ദേശങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഓക്ക്, ചെറുനടക്ക പോലുള്ള വലിയ മലകളുള്ള നിത്യഹരിത മരങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കുടുതലായതു്. 1500 മീറ്റർന്നും 1750 മീറ്റർന്നും ഇന്ത്യൻ പൊൻമരങ്ങളാണ് കുടുതലായി വളരുന്നത്. വാൺിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഏറ്റവും കുടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചിര പൊൻ ഇവിടെ വ്യാപക മായി കാണപ്പെടുന്നു. തദ്ദേശീയ വിശാനത്തിന്ത്തുപെടുന്ന വളരെ വിലപിടിച്ച ദിയോൻ മരങ്ങൾ (ദേവദാരു) എന്നാലുതന്നിരകൾ പട്ടണത്താൻ നിരകളിൽ വ്യാപകമായി വളരുന്നു. നിർമ്മാണ ആവശ്യത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നതും കുടുതൽ കാലം ഇന്ത്യക്കുന്നതുമായ മരങ്ങൾ ദേവദാരു (ദിയോൻ), കാർണ്ണിരകൾ കരകൗശല വസ്തുക്കളുടെ നിർമ്മാണത്തിനുപയോഗിക്കുന്ന ചിന്നാറും വാർന്നട്ടും ഈ മേഖലയിൽത്തന്നെയാണ് വളരുന്നത്. 2225 മുതൽ 3048 മീറ്റർവരെ ഉയരത്തിൽ പ്ലാറ്റേജും സ്റ്റൈസും കാണപ്പെടുന്നു. മിത്തോഷ്ണ



ചിത്രം 5.5 : പർവതവനങ്ങൾ

പൂർണ്ണമാക്കളും ഈ മേഖലയിൽ പല പ്രദേശങ്ങളിലും കാണപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ഉയരം കൂടിയ മേഖലകളിൽ ഈ വനവിഭാഗം ആരംഭപ്പെട്ട് വനങ്ങളായും പൂർണ്ണമാക്കളായും പരിണമിക്കുന്നു.

3000 മുതൽ 4000 മീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിനിടയിൽ സിൽവർഫിൽ, ആനിപേർ, പൈൻ, ബിർച്ച്, റോഡോ ഡെൽഡോൾ തുടങ്ങിയ കാണപ്പെടുന്നു. ഗുജജർ, ബൈക്കർവാൾ, അംടിയാ, റാബി എന്നീ ശൈത്രവർഗ്ഗങ്ങൾ ഇലെ ഇടയാൽ ഈ പൂർണ്ണമാക്കളെ ദേശാനന്തര ഇടയാഡിത്തിനായി (Transshistomaceous) ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാലുതന്നിരക്ക് വടക്കൻ ചരിവുകളിൽ കുടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ കുടുതൽ സസ്യങ്ങളും കാണപ്പെടുന്നു. ഉയരമാപ്രദേശങ്ങളിൽ പായൽ സസ്യ വർഗ്ഗങ്ങൾ (Mosses), കൽപ്പായലുകൾ (Lichens) എന്നീ തുടരസസ്യങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യവുമുണ്ട്.

ഉപദിവിപീയ ഇന്ത്യയിലെ മുന്ന് വ്യത്യസ്ത പ്രദേശങ്ങളിലെ വനങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് തെക്കൻ പർവതവനങ്ങൾ. പശ്ചിമഘട്ടം, വിസ്യൂംനിരകൾ, നീലഗിരി എന്നീ പ്രദേശങ്ങളാണിത്. ഉഷ്ണമേഖലയാട്ക ചേർന്ന് സമുദ്രജലനിരപ്പിൽനിന്ന് 1500 മീറ്റർ മാത്രം ഉയരത്തിലുള്ളതായ പ്രദേശങ്ങളായതുകൊണ്ടുതന്നെ ഉയർന്ന മേഖലയിൽ മിത്തോഷ്ണസസ്യങ്ങളും പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ താഴ്ന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ ഉപോഷ്ണ സസ്യങ്ങളും കാണപ്പെടുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് കേരളം, തമിഴ്നാട്, കർണ്ണാടകം എന്നിവിടങ്ങളിൽ, നീലഗിരി, ആനമല, പള്ളി കുന്നുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ മിത്തോഷ്ണവനങ്ങളെ ചോലവനങ്ങൾ (Sholas) എന്നു വിളിക്കുന്നു. ഈ വനങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന മർന്മോളി, ലോറൽ, സിക്കോൺ, വാട്ടിൽ എന്നീ മരങ്ങൾ കുടുതൽ സാമ്പത്തിക പ്രധാനമുള്ളവയാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള മരങ്ങൾ സത്പുര-മെമക്കലും നിരകളിലും കാണപ്പെടുന്നു.

കടലോര ചതുപ്പുനിലങ്ങൾ (Littoral and Swamp Forests)


ഇന്ത്യയിൽ വളരെ സമ്പന്മായ തണ്ട്രീർത്തം ആവാസക്കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട്. ഈ പ്രദേശങ്ങളായും 70 ശതമാനത്തോളം വിസ്തൃതയിലും നെൽകുഷിയാണ് നടക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ 3.9 മില്ലിയൺ ഹെക്ടർ തണ്ട്രീർത്ത ഭൂമിയുണ്ട്. അതാണാശ്വർ തണ്ട്രീർത്ത ഉടൻവി (ഒംസാർ ഉച്ചകോടി) പ്രകാരം ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സമലങ്ങൾ നീർപ്പാവ സാരക്കണ്ണതിനായി തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചിത്രക തകാകം (ഇഡിഷ്), കിഡോലാഡിയേര നാഷണൽ പാർക്ക് (ഭരതപുരി) എന്നിവയാണിത്.

ബാക്കുരാഷ്ട്രസമ്പദ്ധിയാണ് അംഗരാജ്യങ്ങൾ തമിലുള്ള കരാറാണ് അംഗരാശ്വർ ഉടൻവി.

ഇന്ത്യയിലെ തണ്ട്രിക്കടങ്ങളേ എട്ട് വിഭാഗങ്ങളായി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു.

- (i) തെക്കെ ഇന്ത്യയിലെ ദേശവാസി പീഠിയുമിയിലെ അണ്ണക്കടുകളും തെക്കുപടിനാറൻ തീരപ്രദേശ ശത്രൂ കായലുകളും, മറ്റ് തണ്ട്രിക്കടങ്ങളും
- (ii) കച്ചു ഉൾക്കെൽ, ഗുജറാത്, രാജസ്ഥാൻ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലെ വിശാലമായ മുഴു പാടങ്ങൾ
- (iii) ഗുജറാത്തിൽനിന്നും കിഴക്കോട്ട് മധ്യപ്രദേശ്, രാജസ്ഥാൻ (കിയോലാധിയോ ദേശിയ ഉദ്യാനം) സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ശുശ്വര തടക്കണ്ണളും അണ്ണക്കടുകളും
- (iv) ഇന്ത്യയുടെ കിഴക്കൻ തീരത്തെ ദൈർഘ്യത്തണ്ണളും കായലുകളും (ചിൽക്കടകം)
- (v) ഗംഗാസമതലത്തിലെ ശുശ്വര ചതുപ്പുകൾ
- (vi) ദേഹമവുതെ നദിയുടെ പ്രളയസമതലങ്ങൾ, വടക്കുകിഴക്കൻ ഇന്ത്യയുടെയും ഹിമാലയൻ താഴ്വരയിലെയും ചതുപ്പുകളും ചെള്ളപ്രദേശങ്ങളും
- (vii) കാർമ്മിനിലെയും ലഡാക്കിലെയും പർവതപ്രദേശങ്ങളിലെ നദികളും തടക്കങ്ങളും
- (viii) ആൻഡമാൻ - നികോബാർ ദീപ്പുകളിലെ കണക്കിക്കാടുകളും മറ്റ് തണ്ട്രിക്കടങ്ങളും

ലവണ്ണജലത്തിൽ വളരാൻ കഴിയുന്ന നിരവധി സസ്യ ഇനങ്ങൾ ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്നു. വേലികൾ അനുഭവപ്പെടുന്ന തലങ്ങും വിലങ്ങുമായ വെള്ളക്കെട്ട് (Creeks) പ്രദേശങ്ങളും കുളങ്ങൾ ഇതു വനങ്ങൾ അനേകം പക്ഷിവർഗ്ഗങ്ങൾക്കും അഭ്യന്തരക്കുന്നു.



ചിത്രം 5.6 : കണക്കിലെ വനങ്ങൾ

ഇന്ത്യയിൽ 6740 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററുകളോളം കണക്കിക്കാടുകൾ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്നുണ്ട്. ലോകത്തിലെ കണക്കിക്കാടുകളുടെ ഏഴ് ശതമാനമാണിത്. പശ്ചിമബംഗാളിലെ സുരജരവനങ്ങളിലും ആൻഡമാൻ നികോബാർ ദീപ്പുകളിലും ഇത് വ്യാപകമായി കാണ

പ്പെടുന്നു. ഈ കുടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു ശാഖയാണ് മഹാനബി, ശോദാവരി, കൃഷ്ണ ധർശന പ്രദേശങ്ങളാണ്. കണക്കിക്കാടുകളും ഇപ്പോൾ ഭീഷണിയിലാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇവയുടെ സംരക്ഷണവും അനിവാര്യമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു.

ഇന്ത്യയിലെ വനപ്രദേശം

സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നും ലഭ്യമായ രേഖകൾപ്രകാരം ഇന്ത്യയുടെ ആകെ ഭൂവിസ്ത്രീയുടെ 23.28 ശതമാനം വനമാണ്. വനപച്ചയും തമാർമ്മ വനപ്രദേശവും (Actual forest area) തമിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. വനങ്ങളുടെ മേഖലപ്പെടുത്തപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം വനപച്ചയും പറയുന്നത്. സംസ്ഥാന റവന്യൂവകുപ്പിരുൾക്കുളാം കണക്കളാണ് വനപ്രദേശം നിശ്ചയിക്കുന്നതിന് അടിസ്ഥാനം. വനപ്പുയുടെ അടിസ്ഥാനം ആക്കാശിയ ചിത്രങ്ങളും ഉപഗ്രഹപിത്തങ്ങളുംാണ്. 2011-ലെ ഇന്ത്യാ വനറിപ്പോർട്ടു പ്രകാരം 21.05 ശതമാനമാണ് ഇന്ത്യയിലെ തമാർമ്മ വനപ്രദേശമുള്ളത്. ഇതിൽ തിന്നിയ വനപ്രദേശങ്ങളും ഒരു ശതമാനവും തുറന്ന വനപ്രദേശമുള്ളത് 8.75 ശതമാനവുമാണ്.

വനപ്രദേശവും പച്ചപ്പെട്ടിരുള്ള അളവും ഓരോ സംസ്ഥാനത്തും വ്യത്യസ്തമാണ്. ലക്ഷ്യപീപിൽ വനപ്രദേശം പൂജ്യം ശതമാനമാണെങ്കിൽ ആൻഡമാൻ നികോബാർ ദീപ്പുകളിൽ 46.93 ശതമാനമാണ്. രാജ്യത്തിന്റെ വടക്ക്, വടക്ക് പടിനാറൻ ഭാഗങ്ങളിലെ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ 10 ശതമാനത്തിലും താഴ്യാം വനപ്രദേശം. രാജസ്ഥാൻ, ഗുജറാത്, പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന, ധരംഹർ തുടങ്ങിയവയാണിത്. കൂഷിക്കുവേണ്ടിയാണ് പഞ്ചാബിലെയും ഹരിയാനയിലെയും ഭൂതിഭാഗം വനങ്ങളും മുൻഡുമാറ്റപ്പെട്ടത്. പശ്ചിമബംഗാളിലും തമിഴ്നാട്ടിലും 10 മുതൽ 20 ശതമാനം വരെ മാത്രമെ വനമുള്ളു. തമിഴ്നാട്ട്, ദാദ്രാനഗർ ഹരവേലി, ശോവ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളും ചെംപിച്ചു ഉപാപീപിയ ഇന്ത്യയിൽ 20 മുതൽ 30 ശതമാനം മാത്രമാണ് വനം. വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ 30 ശതമാനത്തിലെയിക്കും വനമുണ്ട്. കുന്നുകളുള്ള ഭൂപ്രദേശവും നല്ല മഴയും വനത്തിന്റെ വളർച്ചക്ക് ഏറെ ശുശ്രേഷ്ഠമാണ്.

യമാർമ്മ വനവിസ്തൃതിയിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഓരോ സംസ്ഥാനത്തും വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. ജമ്മുകാശ്മീരിൽ 9.56 ശതമാനമാണെങ്കിലും ആൻഡമാൻ നികോബാർഭൂരൂപം 84.01 ശതമാനമാണ്. താഴെ തന്നിന്നക്കുന്ന പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യയിലെ വനങ്ങളുടെ വിതരണം കാണിച്ചിരിക്കുന്നു (Appendix IV). 15 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ വനവിസ്തൃതി മൊത്തം വിസ്തൃതിയുടെ മുന്നിലെണ്ണിൽ കൂടുതലാണെന്ന് ഇത് പട്ടികയിൽനിന്ന് വ്യക്തമാക്കും. പാർസിനിക്കിസത്തുലുന്ന നിലനിർത്തുന്നതിന് ഇതുയും വനവിസ്തൃതി അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.

തമാർത്തു വനവിന്റെതൃതിയുടെ ശതമാനത്തിൽ അടിസാന്നത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സംസാനങ്ങളെ നാല് പ്രദേശങ്ങളായി താരതിതിക്കുന്നു.

മേഖകൾ	വനവിന്റു തിരുത്ത ശതമാനം
i) ഉയർന്ന വനവിന്റെതൃതിയുള്ള മേഖ	> 40
ii) വനവിന്റെ നിത്യാധിക മേഖ	20 - 40
iii) വനവിന്റെ കുറഞ്ഞ പ്രദേശം	10 - 20
iv) വനവിന്റെ തിരുത്ത കുറവായ മേഖ	< 10

അനുഭവം 17-ലെ വിവരങ്ങളുപയോഗിച്ച്
വനവിന്റെതൃതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സാമ്പാനങ്ങളെ
നാല് മേഖകളായി തിരിക്കുക.

വനസ്പതിക്ഷണം

വനങ്ങൾക്ക് ജീവന്മാം പരിസ്ഥിതിയുമായി അഭേദ്യ മായ ബന്ധമുണ്ട്. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽനിന്ന് സുപ്രധാന വ്യവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്നതുമൂലം നിരവധി ആനുകൂല്യം ലൈസൻസ് വനം നൽകുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ മനുഷ്യരാശിയുടെ അഭിവ്യുദ്ധിക്കും അതിജീവനത്തിനും വന സംരക്ഷണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഇതിനായി രാജ്യവ്യാപകമായ വനസ്പതിക്ഷണം നയങ്ങൾ ഇന്ത്യ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1952-ൽ ഒരു ദേശീയ വനനയവും ഇന്ത്യ മുന്നോട്ടുവച്ചു. 1988-ൽ ഇത് വീണ്ടും നവീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. പുതിയ വനനയം സുസ്ഥിര വന പരിപാലനത്തിനും വനസ്പതിക്ഷണത്തിനും വനവ്യാപ നൽകിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും പ്രദേശിക ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ ആവശ്യപൂർത്തികരണത്തിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും വിഭാവനം ചെയ്യുന്നു.

വനനയം ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് താഴെ പറയുന്നവാണ്.

- 33 ശതമാനം വനവിന്റെതൃതി ഉറപ്പാക്കുക.
- പാരിസ്ഥിതിക സംരക്ഷണം തകരാറിലായ സാഹാരാളിൽ പാരിസ്ഥിതിക സിരിത നിലനിർത്തുകയും വനങ്ങൾ പുനസ്ഥിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക.
- രാജ്യത്വരിൽ പ്രകൃതിപെത്തുകം, ജൈവ വൈവിധ്യം, ജനിതകസംബന്ധം എന്നിവ സംരക്ഷിക്കുക.
- മണ്ണോലിപ്പ്, മരുഭൂവൽക്കരണം എന്നിവ തുടങ്ങുക. വൈള്ളപ്പുകവും വരശ്ചയും കുറയ്ക്കുക.
- തരിശ് ഭൂമിയിൽ സാമൂഹ്യവനവർത്തകരണവും വനവർത്തകരണവും നടത്തി വനവിന്റെതൃതി വർധിപ്പിക്കുക.
- വനത്തെ ആശേഷിച്ചു കഴിയുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് ആഹാരലഭ്യത, കാലിത്തീറ്റ ലഭ്യത എന്നിവ ഉറപ്പുവരുത്തുക, വിറക്, തടി എന്നിവയുടെ ലഭ്യത ത്തുക്കായി വനത്തിൽ ഉൽപ്പാദനക്ഷമത വർധിപ്പിക്കുക.

കൂക്, വിറകിനുപകർമ്മളുടെ ഉപയോഗം പ്രൊത്സാഹിപ്പിക്കുക.

- vii) വനവത്കരണത്തിനുള്ള ജനകീയ ബോധവൽക്കരണ കുട്ടാംശം മുഖ്യമായി നിരവധി തടയ്ക്കയും നിലവിൽ വനത്തിനേലുള്ള സമർപ്പണം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുക.

വനവും ജീവിതവും

നിവധി ആദിവാസി ഗോത്രവിലാഗങ്ങളുടെ വിട്ടും ഉപജീവനവും അതിജീവനവുമാണ് കാട്. ക്ഷേമം, വിവിധതരത്തിലുള്ള പച്ചമുഖങ്ങൾ, ക്ഷേമത്തോറ്റുമായ ഹലകൾ, തെൻ, കിഴങ്ങുകൾ തുടങ്ങിവെരുപ്പാം അവർക്ക് നൽകുന്നത് കാഡാണ്. വിട്ട നിർമ്മാണങ്ങളിനുള്ള വന്തുക്കല്ലും കലാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള വന്തുക്കല്ലും ലഭിക്കുന്നതും വനത്തിൽ നിന്നാണ്. ഗോത്രജനതയുടെ സാധാപര്യംപ്രത്യേകം ഉപജീവനത്തിനും പ്രധാന ഉറവിടം കാഡാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാന നാലുകൾ. കാട്ടിനോടും പ്രകൃതിയോടും ചെർന്നു നിന്നാണ് ഓരോ ആദിവാസി ഗോത്രജനതയും ജീവിക്കുന്നതെന്നാണ് പൊതുവെയ്യുള്ള പിശവം. ആകെയുള്ള 593 ജില്ലകളിൽ 188 എണ്ണം ഗോത്ര ജില്ലകളായി തിരിച്ചിറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. രാജ്യരേത 59.61 ശതമാനം വനവും ഇരു 188 ആദിവാസി ഗോത്ര ജില്ലകളിലാണ്. എന്നാൽ രാജ്യത്തെ മൊത്തം വിന്തുത്തിയുടെ 33.63 ശതമാനം മാത്രമാണ് ഇരു 188 ജില്ലകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഗോത്രജില്ലകൾ പന്പുദ്ദേശംകൊണ്ട് സാധാരണം നാമാണ്.

കാടും ആദിവാസി സമൂഹങ്ങളും തമിൽ അടുത്ത ബന്ധമാണുള്ളത്. നൂറോളംകൾ പച്ചമുഖുള്ള കാടിനെക്കുറിപ്പുള്ള അവരുടെ അറിവ് കാടിന്റെ വികസനത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. ആദിവാസികളുടെ ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാരെയും കേവലം കാടിന്റെ വന്തുകൾ അവരിൽ വളർച്ചക്കും സംരക്ഷണത്തിനുംവേണ്ടത്.

വനസ്പതിക്ഷണം നയങ്ങൾ ഭാഗമായി താഴെ പറയുന്ന നടപടികൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ തുടക്കം കൂറിച്ചു.

സാമൂഹ്യവനവത്കരണം (Social Forestry)

പാരിസ്ഥിതിക-സാമൂഹിക-ഗ്രാമവികസനങ്ങൾ ലക്ഷ്യമാക്കി തരിശുഭൂമിയിൽ വനവത്കരണവും വനസ്പതിക്ഷണവും വനപരിപാലനവുമാണ് സാമൂഹിക വനവത്കരണം എന്നതുവും തുടങ്ങുന്നത്.

ദേശീയ കാർഷിക കമ്മീഷൻ (1976) സാമൂഹിക വനവത്കരണത്തെ, നഗര വനവത്കരണം, ഗ്രാമീണവനവത്കരണം, കുഷ്ഠിയിട വനവത്കരണം എന്നിങ്ങനെ മൂന്നായി തിരിക്കുന്നു.

നഗരങ്ങളും പൊതുസാലത്തും സ്കാറ്റുസാഗ ലത്തും മരങ്ങളുടെ പരിപാലനവും വൃക്ഷത്തെന്നു നടുന്നതുമാണ് നഗരവനവത്കരണം. നഗരങ്ങളിലെ ഹരിതവത്കരണം, പാർക്കുകൾ, റോഡ്രികുകളിലെ തണൽ മരങ്ങൾ വച്ചുപിടിപ്പിക്കൽ, വ്യാവസായിക വാണിജ്യക്രൈഞ്ഞളിലെ ഹരിതവത്കരണം തുടങ്ങിയ വയാൺ നഗരവനവത്കരണത്തിലേർപ്പിച്ചാന പ്രവർത്തനങ്ങൾ.

കാർഷിക വനവത്കരണവും സാമൂഹികവനവത്കരണവും ഉള്ളാൻ നൽകുന്നതാണ് ശ്രാമവനവത്കരണം. കാർഷിക വിളകൾക്കുപോലും മരങ്ങളും വച്ചുപിടിപ്പിക്കുകയും അതുവഴി കൂഷിസംഘങ്ങളിലെ ഒഴിവായിക്കിടക്കുന്ന ഭൂമിയെക്കുടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് കാർഷികവനവത്കരണം (Agric-Forestry). കൂഷിയോടൊപ്പം വനവത്കരണവും സാധ്യമാകുന്നതുവഴി ഭക്ഷണം, തീറ്റ, പിരിക്ക്, തടി, പഞ്ചാം എന്നിവയുടെ ഉൽപ്പാദനവും ക്രോസ്മെയറിംഗ് ടെക്നോളജികളിൽ മരങ്ങൾ വച്ചുപിടിപ്പിക്കുന്നതാണ് സമൂഹവനവത്കരണം. ശ്രാമികൾ പുരിമേടുകളിൽ, ആരാധനാലുംങ്ങൾക്കുചുറ്റും, റോധിക്കുകൾ, കനാൽ തീരങ്ങൾ, ദൈഖിക്കുവേലെൽക്കും അരികുകൾ, നീകുളുകൾ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലെ വനവത്കരണമാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള പദ്ധതിയുടെ ഗുണം സമൂഹത്തിന് മൊത്തമായാണ് ലഭിക്കുക. ഈ പദ്ധതിയിൽ ദുരഹിതരായവർക്കുകൂടി പകാളികളാകാൻ കഴിയുന്നതിനാൽ ഭൂവൃദ്ധമകൾക്കു മാത്രമായി പരിഹിതപ്പെടുത്തുന്ന ശൃംഗാരങ്ങൾ ഇവർക്കും പ്രാപ്യമാകുന്നു.

കൂഷിയിട വനവത്കരണം (Farm Forestry)

കൂഷിഭൂമിയിൽത്തന്നെ വാണിജ്യ-വാണിജ്യത്തെ ആവശ്യങ്ങളെ മുൻനിർത്തി മരങ്ങൾ വച്ചുപിടിപ്പിക്കുന്ന തിന്നുയാണ് കൂഷിയിടവനവത്കരണം എന്നു പറയുന്നത്.

ചെറുകിട-ഇടത്തരം കർഷകർക്ക് വിവിധ സംസാര നങ്ങളിലെ വനംവകുപ്പ് ഇതിനായി സഞ്ചന്യമായി ദേതകളും വിത്തുകളും വിതരണം ചെയ്യുന്നു. കൂഷിയിടങ്ങളുടെ അതിരുകൾ, പുരിമേടുകൾ, വീടിന് ചുറ്റുമുള്ള സംഘങ്ങൾ, കാലിത്തൊഴുക്കുകൾ സമീപസംഘങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇതുവരെ മരങ്ങൾ വച്ചുപിടിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.

വന്യജീവികൾ

മുഗ്രശാലയിൽ നിന്നും മുഗ്രശാലയും പക്ഷികളും കൂടുകളിൽ അടച്ച് വളർത്തുന്നത് നിങ്ങൾക്കിട്ടുണ്ടായും. മഹത്തായ പ്രകൃതിപെട്ടുകമാണ് ഇതുവരെ വന്യജീവിസ്വാത്രം. കണ്ണക്കുകൾ പ്രകാരം ലോകത്തിലെ അനിധിപ്പെടുന്ന സസ്യങ്ങളാണുടെ 4 മുതൽ 5 ശതമാനം ഇനങ്ങൾ ഇതുവരെ കാണപ്പെടുന്നവയാണ്.

കൂനു. പതിറ്റാണ്ടുകളായുള്ള സംരക്ഷണത്തിൽനിന്നും പരിശോനയുടെയും ഫലമാണ് ഈ മഹത്തായതും വൈവിധ്യപൂർണ്ണവുമായ ആവാസവ്യവസ്ഥകൾ. എന്നാൽ കൂറ വർഷങ്ങളായി മനുഷ്യപ്രവർത്തന ഔദ്യോഗിക്കാണ്ട് വന്യജീവികളുടെ ആവാസവ്യവസ്ഥക്ക് തകരാർ സംഭവിക്കുകയും വന്യജീവികളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞ് വരുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ചില ജീവികൾ വംശനാശത്തിന്റെ വകിലില്ലമാണ്.

വന്യജീവിസ്വാത്രത്ത് കൂടിയാനുള്ള ചില കാരണങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നു:

- (i) വൃവസായിക-സാങ്കേതിക കൂതിച്ചുചാട്ടത്തിൽനിന്നും ഫലമായുള്ള വൻതോതിലുള്ള വനവിഭവ ചൂഷണം.
- (ii) കൂഷി, കെട്ടിടാർമ്മങ്ങൾ, റോധ്, വനനം, അണ ക്കട്ടുകൾ എന്നിവയ്ക്കാൽ കൂടുതൽ ഭൂമി യിലെ മരങ്ങൾ മുറിച്ചുമാറ്റുന്നു.
- (iii) പ്രാജോഡികമായ മരംറിക്കലും തീറ്റക്കും ഇന്ന നൽകിനുമായുള്ള വർദ്ധിതമായ ചൂഷണവും കാട്ടിനുമേൽ അഭിരുചി സമർപ്പണ ചെയ്യുന്നതു.
- (iv) വളർത്തൽ മുഗ്രശാലയുടെ മേച്ചിൽ വന്യജീവിസ്വാത്രത്തിനും അവയുടെ ആവാസവ്യവസ്ഥയെയും പ്രതികുലമായി ബന്ധിക്കുന്നു.
- (v) വരേസ്യവർഗ്ഗത്തിൽ വിനോദമായ വെട്ടയാടലിലും നൃസ്വാക്കിൽ വന്യജീവികളാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നത്.
- (vi) കാട്ടുതീ

പരിസ്ഥിതിസ്വാഹാര (Eco Tourism) മുന്നോട്ടെത്തിനും രാജ്യത്തെയും ലോകത്തെയും പെപ്പട്ടുക്കണ്ണുകളുടെ അതിജീവനത്തിനും വന്യജീവിസംരക്ഷണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഇവകെല്ലക്കും സർക്കാർ ഇവ മേഖലയിൽ നടത്തുന്നത്?

ഇന്ത്യയിലെ വന്യജീവിസംരക്ഷണം

വന്യജീവികളുടെ സംരക്ഷണത്തിൽ വളരെ വലിയ ഒരു പാരമ്പര്യം ഇതുവരുത്തുക്കാണ്ട്. വന്യജീവികളുടെയുള്ള സ്ഥാനങ്ങൾ വിവരിക്കുന്ന നിരവധി കമകളുണ്ടുന്ന പദ്ധതിയിൽ കമകൾ, ജംഗിൾബുഡുകൾ തുടങ്ങിയവ വായിച്ചു വളർത്തുന്ന ഒരു തലമുറയാണ് നമ്മുടെത്.

1972-ലാം സമഗ്രമായ വന്യജീവിനിയമം ഇന്ത്യയിൽ നിലവിരിക്കുന്നത്. വന്യജീവികളുടെ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള നിരമഹാമായ ചട്ടക്കൂട്ടാണ് ഇത് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. ഒൻപത് പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് ഇതിനുള്ളത്. വംശനാശഭീഷണി നേരിട്ടുന്ന ജീവികളുടെ സംരക്ഷണവും സംരക്ഷിതപ്രദേശങ്ങളുടെ അശൈല്യങ്ങളും വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങൾ എന്നിവകൾ നിയമപരമായ പിന്തുണയും ഉറപ്പ് വരുത്തുക എന്നിവയാണ് ഈ നിയമത്തിൽനിന്നും ലക്ഷ്യങ്ങൾ. 1991-ൽ

ഈ നിരക്കണ്ണൻ സാമ്പാദനവും അതിനു സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദാഹിത്യഭാവമുണ്ട് കൂടാതെ ശിഖാനാട്ടപട്ടികൾ ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വാഗ്മിയാണിപ്പാനാ അനുഭവം പ്രത്യേക സാമ്പു-ജീവിതശാഖയുടെ നാശ ക്ഷമാനത്തിനുള്ള റിക്വിഷൻമുണ്ട്. ലഭിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന അനുഭവം നിലപാതിപ്പിക്കുന്നു.

103 എഡിസിസ്റ്റും 535 വന്യജീവി മാറക്ക്
എല്ലാ അനുഭവിയിലെങ്കിൽ (Appendix V).

മനു-ക്കൂദാശിയുടെ തിലതിൽപ്പെട്ടിൽ വരുത്തിവിഹാര ക്ഷേമം വളരെ പ്രധാനമായും തുടർന്നുണ്ട്. മനു-സാമ്യൂഖിക സാമ്പത്തിക വാര്ത്ത പാരമ്പര്യ ഭൂത്തിന്റെ പ്രധാനം തിരിച്ചറിയുന്നതാണ് യൂനോഎക്സാമീൻ (UNESCO'S 'Man and Biosphere' Programme) യൂഡായി പേരിന്റെ മഹത്തും ഗവൺമെന്റ് പ്രത്യേകനാമനിപ്പിത്ത മുൻകൊടുക്കുന്നത് സാമ്പത്തിക ജോലിക്കൂട്ടും ക്ലിഫാൾക്കൂട്ടും നാംകുക്കണ്ണപുരിയുടെ അഭിക്ഷാഖയിൽ നാംകുക്കണ്ണപുരിയായാണ്.

கிழவாக்கர் வகைச் (1973), குபாஜக்ர் ஏற்பிளோ (1982) என்றிய அடிக்கம் கடுவாலையை வழங்க தொழுப் பருக்கங்களினால் ஸல்காச் நகரிலிருந்து வழங்கினார்.

1982-ൽ തിരുവാളമുന്ന് പാലത്തിലൂടെ “സ്വപ്നക്ക് ഏറ്റവും അനുകൂല സംരക്ഷണാർത്ഥിയുടെ പദ്ധതിയാണെന്ന്, ദിശാവലക്കാലയുദ്ധവിൻ അനുകൂലമായ സ്വന്തം പാലത്തിലൂടെ സംരക്ഷണാർത്ഥിയുടെ പദ്ധതിയും ഒരു പാലത്തിലൂടെ സംരക്ഷണാർത്ഥിയുടെ പദ്ധതിയും മുമ്പായാണെന്ന് ഇരു പാലത്തിലൂടെ പാലത്തിലൂടെ പാലത്തിലൂടെ പാലത്തിലൂടെ

ହୁଏ ପାତଳିକର୍ମକୁ ପୁଣେ ଉତ୍ତଳ ପାତଳି,
ଦୂଷାଜିକକ ହାତୁମୁଦ୍ରା, ହାତମୁଦ୍ରାକୁ କଟନ୍ତୁରିଲାଗି ଶାତ
କଣା ପାତଳି ପୁଣିବସୁନ୍ଦର ହୁଅୟ ଶବ୍ଦରେଣ୍ଟି କାହାରେଣ୍ଟିଲାଗିଲାଏନ୍ତି

ஜெவகளையும் ரிஸர்வேகளை (Biosphere Reserves)



வினா 5.7: விடைகள் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்குக் கோரி

திருவாவட்டமலையிலிருந்து இல்லாவட்டமலையிலிருந்து காட்டினால் புதுள்ளது எனவாகவும் காராச்சன் வெசுவமளை என்றும் கூறுகிற காலத்தோலை (UNESCO) “மனு-குடும்ப வெசுவமளையும் பழனி” (Man and Biosphere) க்கு கீழ்க்கண்ணால் தொலை மீதம் கொடுக்கிற கூறுகளையிருந்து விடுவதே பிரசுர் திருக்கு வாழ்வதற்கு நீண்ட நாட்கள் பிடித்து விடுவதே பிரசுர் திருக்கு வாழ்வதற்கு நீண்ட நாட்கள் பிடித்து விடுவதே பிரசுர்



абзац 3, в : заменяется пятью, а не четырьмя

ହୁଅଯିବ ଓ ରଜାବମୟାବ ଗିରାନ୍ତିଷ୍ଟକାଳୀଙ୍କ ଉପରେ
ତ. (ପତ୍ରିକ ୫.୧, ଏପ୍ରିଲ ୧୦) ପାଞ୍ଚ ରଜାବମୟାବ
ଗିରାନ୍ତିଷ୍ଟକର୍ତ୍ତ ଯୁଗମର୍ଦ୍ଦକାର୍ଯ୍ୟର ଦୂରତ୍ଵରେ ଉପରେବିଶିଷ୍ଟ
ଦୂରତ୍ଵ ବ୍ୟାକାରୀତିରେ ରକ୍ତଶିଖିର କାନ୍ଦିତିରେବିଶିଷ୍ଟ

प्राचीन विद्या का अध्ययन

മുന്തായിലെ ഒരു കുറവായ ബഹുജനപാർപ്പന അർത്ഥാംഗങ്ങൾ നീക്കേണ്ടതിൽ മുഴുവൻപാര്പ്പന റിസർവ് (NBR), 1988 ദാപ്പക്കാബദിലോൺ മുൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പാർത്ഥിന്റെ വാദം വാഗ്ദാനം എബ്രേഖാരൂപ ബഹുജനപാർപ്പന, മുന്തായാഥാം നീലമന്ത്രിയിലെ സന്ദേശങ്ങൾ, നീലമന്ത്രിയിൽ പിംബാഡിയുടെ

പട്ടിക 5.1 : ജൈവമണ്ഡല റിസർവ്വേകൾ

ക്രമ നം.	ജൈവമണ്ഡല റിസർവ്വേകളുടെ പേരും വിസ്തീരണവും (ച.ക്ര.ഖ.)	സംബന്ധിത പരിഷദം	ജൈവമണ്ഡല റിസർവ്വേകളുടെ സംബന്ധം
1.	നീലഗിരി (5620)	01.08.1986	വയനാട്ടിൽ ഒരു ഭാഗം, നാഡിപ്പോരുതു, ബാബിപുരി, മുതുമലലെ, നീലമുക്ക്, സൈലന്റ് വാലി, ശിരൂപാണിക്കുന്ന് (തമിഴ്നാട്, കേരളം, കർണ്ണാടകം)
2.	നൗമേഖി (5860.69)	18.01.1988	ചാലുമലി ജില്ലയുടെ ഒരുഭാഗം, പിത്തുമലയിൽ, അരംബൻ ജില്ലകൾ (ഇന്ത്യാഭാഗം)
3.	മോക്കാട് (820)	01.09.1988	മേലാംലയത്തിലെ ശാന്താകുന്ന്, ജില്ലയുടെ കിഴക്കുപടിശ്ശേരി, തെക്ക് ഭാഗങ്ങൾ
4.	മനാസ് (2837)	14.03.1989	ആസാമിലെ കോക്കാഖാലിൽ ഒരു ഭാഗം, ചിബാംഗഹവോൾ, ബാർബേറ്റ്, നാഡിപ്പോരു, കാരൂപ്, മാരംഗ് ജില്ലകൾ
5.	സുരഖ്യം (9630)	29.03.1989	പത്രിമംഗലംഗാളിലെ ശാന്താധിക്കുന്നുടെ ഭാഗം, ദ്രോമപുത്രനദീ പുറമ്പണിക്കുന്ന് ഭാഗങ്ങൾ
6.	തഞ്ചെട് എഫ് മാനാർ (10500)	18.02.1989	ഗൾഫ് ഓഫ് മാനാറിൽ മുന്തുപ്പിലെ ഒരു ഭാഗം, വടക്കു ദാമേശ്വരം ദിവിത്തിനിന്ന് തുടങ്ങി തമിഴ്നാട്ടിൽ തെക്ക് കന്ധാകുളിൽ വരെയുള്ള പ്രദേശം
7.	ബുദ്ധ് നിക്കോബാർ (885)	06.01.1989	ആസാമിലെ ദിവുമുഹ് ജില്ലയുടെ ഒരു ഭാഗവും കിഴിസുകിയ ജില്ലയും
8.	സിമിപ്പാത്ത് (4374)	21.06.1994	ബധിച്ചയിലെ മാർക്കണ്ഠ് ജില്ലയുടെ ഒരു ഭാഗം
9.	പ്രിബു-കാലബോവ (765)	28.07.1997	അസാമിലെ ദിവുമുഹ് ജില്ലയുടെ ഒരു ഭാഗവും കിഴിസുകിയ ജില്ലയും
10.	പിന്നാംഞ് ദിബാംഗ് (51115)	02.09.1998	അരുണാചൽപ്പരാബ്രാഹ്മിലെ അപൂർ സിക്കംഡ്, പടിഞ്ഞാൻ സിക്കംഡ്, ദിബാംഗ് താഴ്വാ ജില്ലകളുടെ ഭാഗങ്ങൾ
11.	പച്ചമിച്ചി (498172)	03.03.1999	മധ്യപാടശ്ശേരിലെ അപ്പട്ടിക്കുന്ന് ഒരു ഭാഗം, ഹോൺഗിലാബാട്, പിങ്കൊവാസ് ജില്ലകൾ
12.	കാഞ്ചീൻഗാർ (2619.92)	07.02.2001	സിക്കിമിലെ വടക്കൻ, പടിഞ്ഞാർ ജില്ലകളുടെ ഭാഗങ്ങൾ
13.	അഗസ്ത്യമല (3500.36)	12.11.2001	തമിഴ്നാട്ടിലെ തിരുത്തുരുത്തിലെ ജില്ലയുടെ ഭാഗവും കന്ധാകുളി ജില്ലയും കേരളത്തിലെ തിരുവന്തപുരം, കൊല്ലം, എറണാട് ജില്ലയും
14.	അചാനക്കാർ- ഓമർക്കണ്യക (3835.51)	30.03.2005	മധ്യപാടശ്ശേരിലെ അപൂർ ഭാഗവും ജില്ലയും
15.	കുച്ച് (12454)	29.01.2008	സുജാതാക്കാലിലെ കുച്ചിലും ഒരു ഭാഗം, ഒരുക്കുന്ന്, പട്ടാൻ ജില്ലകൾ
16.	കോർമ്മ ചിലാസർട്ട് (7770)	28.08.2009	പിന്നവാലി ദേശാദ്യാന്തപുരാ ചുറ്റുവട്ടവും, ഹിമാചൽപ്പരാബ്രാഹ്മിലെ ചുരുതാർ, സർപ്പ കിബിൽ പന്ത്രണ്ടിലെക്കും
17.	മേഖലാപാലം (4755.997)	20.09.2010	പുത്രാന്തരാന്തിലെ ശേഷാപാലം കുട്ടിൻ നികർ, ആറ്റുമലപ്രദേശിലെ ചിറ്റാർ, കയപ്പ് ജില്ലകൾ
18.	പനാ (2998.98)	25.08.2011	മധ്യപാടശ്ശേരിലെ ചതുരപ്പും ജില്ലകളുടെ ഭാഗങ്ങൾ

* കുടുതൽ തത്ത്വപ്പേരുകളും നൽകിയിരിക്കുന്നവ ആന്റർക്കോട്ടുടെ വേദിയിൽനിന്നും ഒരു ബന്ധാന്റ് റിസർവ്വിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി രാഖാൻ.

ഔദ്യാത്രം: 203-14 പാർഷ്വികരിപ്പോർട്ട്, വനപാർപ്പിനിന്തീ മുന്താലയം, ഭാരത് സർക്കാർ

ഉയർന്ന ഭാഗം, സൈലന്റ് വാലി, ശിരൂപാണി കുന്നുകൾ എന്നിവ അടങ്കുന്നതാണ് നീലഗിരി ബധിച്ചയാൻ ചിത്രയിൽ റിസർവ്വ്. 5520 ചതുരശ്രകിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതിയാണ് ഇതിനുള്ളത്.

വിവിധതരം ആവാസവ്യവസ്ഥകൾ നീലഗിരി ബധിച്ചയാൻ പരിശീലനം ഏറ്റു പെട്ടെന്നും ഉള്ള സൈക്കതം അഭിയാസിച്ചു എല്ലാക്കുന്നും വരുത്താൻ കാരണം. വംശനാശഭീഷണി നേരിട്ടുന്ന രണ്ടു പ്രധാന ജീവികളുടെ ആവാസക്കും ഏറ്റു പെട്ടെന്നും ഉള്ള സൈക്കതം അഭിയാസിച്ചു എല്ലാക്കുന്നും നീലഗിരി വരുത്താൻ കാരണം. സിംഹവാലി കുരഞ്ഞെല്ലാം ഏറ്റുവരുതു അഭിയാസിച്ചുവരുന്നു. ആന, കടുവ, കാട്ടപോതൽ, മൂഞ്ച് (Sambar), പുള്ളിമാൻ (Chital) എന്നീ മുഗ്ഞങ്ങൾ ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കുടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ പ്രധാനമായും എന്നാൽ വംശനാശഭീഷണി നേരിട്ടുന്നതുമായ അനേകം സസ്യങ്ങളും ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്നു. നിരവധി ആദിവാസി സമൂഹങ്ങളും ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നു. കാടുമായി ഇണങ്ങിയുള്ള ആവരുടെ ജീവിതവും ഏറ്റുപ്പെടുന്നതാണ്.

നീലഗിരി ബധിച്ചയാൻ പരിശീലനം റിസർവ്വിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി വരുത്തിയാണ്. 250 മീറ്റർ മുതൽ 2650 മീറ്റർ ഉയരംവരെ ഇത് വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്നു. പശ്ചിമ ഘട്ടത്തിലെ 30 ശതമാനം സപുഷ്പിതസസ്യങ്ങൾ നീലഗിരി ജൈവമണ്ഡലത്തിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്.

നൗമേഖി ജൈവമണ്ഡല റിസർവ്വ്

ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ നൗമേഖി ജൈവമണ്ഡല റിസർവ്വ്. ചാമോഡി, അർമ്മോറ, പിത്തുമലയിൽ, ബാഗൈ ദേശാദ്യാശിഡ്യാശിൽ തുടങ്ങിയ അർക്കിലിൽ ഇവിടുന്ന പശ്ചിമപ്പുലി, കരുത്ത കരടി, തവിട്ടു കരടി, കസ്തൂരിമാൻ, ഹിമപുലി, കരുത്ത കരടി, തവിട്ടു കരടി, കസ്തൂരിമാൻ, ഹിമക്കോഡി, സുവർണ്ണപുരുത്, കരി സതുര തുടങ്ങിയ ജീവിയാണുള്ളത്.

മിത്തോഷണ വനങ്ങളാണ് ഇവിടെ കുടുതലായും കാണപ്പെടുന്നത്. സിൽവർ വീഡ്, ലാറ്റിഫോലി, ഓറോഡൈഡിഡിഡിയാശിൽ തുടങ്ങിയ അർക്കിലിൽ ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്നു. നല്ല ജൈവ സമ്പത്തിനുസൃജനിക്കുന്നത് ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്നത്. പുള്ളിമാൻ (Chital) എന്നീ മുഗ്ഞങ്ങൾ ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കുടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഇവിടെയാണ്. കുടുമ്പാശി, കുടുമ്പാശി, സുവർണ്ണപുരുത്, കരി സതുര തുടങ്ങിയ ജീവിയാണുള്ളത്.

വംശനാശഭീഷണി നേരിട്ടുന്ന സസ്യങ്ങളെ ഒഴുക്കിക്കുന്നത്, വേട്ടയാടൽ, കാട്ടുതീരി എന്നിവയാണ് ഇത് ആവാസവ്യവസ്ഥ നേരിട്ടുന്നതാണ്. വംശനാശഭീഷണി നേരിട്ടുന്നതുമായി അനേകം സസ്യങ്ങളും ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നു. നിരവധി ആദിവാസി സമൂഹങ്ങളും ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നു. നിരവധി പ്രധാനമായ ജീവികളും ഏറ്റുപ്പെടുന്നു.



வினா 5.9 கோடி ரூபாய்களை ஒதுக்கி

സൃഷ്ടിവിശദിപ്പിക്കുന്ന ജൈവമണ്ഡലം റിസർവ്

പശ്ചിമവശംലീലെ ഗംഗാനദിയുടെ ചതുപ്പ് നിറക്കുന്ന ധർമ്മാപദ്ധതിയാണ് ഈ സിനിമാ ചെയ്യുന്നത്. 9630 ചതുപ്പുകുലേമീറ്റർ വ്യാപ്തി ഈ പദ്ധതിനുണ്ട്. കണ്ണൻകാടുകൾ, ചതുപ്പുനിലങ്ങൾ, വന്നിനിധിമായ ദീപുകൾ തുടങ്ങിയവ ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്നു. 200 ഓളം റോയൽ ബാംഗാൾ കടുവകളുടെ സങ്കേതങ്കൂടി യാണ് സൃഷ്ടിവിശദിപ്പിക്കുന്നത്.

മനസ്യം മുതൽ ചെമ്മിൻ വരെയുള്ള നിരവധി ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾക്ക് കണ്ണൻകാടുകളുടെ വേദുകൾ സജീ വമായ ഒരു ആവാസവ്യവസ്ഥയാണ് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്. 170-ൽപരം വൈവിധ്യമാർന്ന പക്ഷികളുടെ സങ്കേതങ്കൂടിയാണ് ഈ കണ്ണൻകാടുകൾ.

ഈ മേഖലയിലെ ശ്രദ്ധാലുത്തോടു ലഭിക്കുന്ന തൊട്ടും താഴംതും പ്രാപിച്ചു കാണപ്പെടുന്ന നാടുകാണ്ഡുതനെ ഈ പാർക്കിലെ കടുവകൾ നല്കുന്ന നീതലുകാർക്കുടിയാണ്. പുള്ളിമാനുകൾ, കേര മാനുകൾ, കട്ടപനികൾ, കുരങ്ങുകൾ എന്നിവ

രെയ്യല്ലോ കടുവകൾ വേദുകയാടി കേഷിക്കുന്നു. തടിക്ക് പ്രായാനുമുള്ള സൃഷ്ടിക്കണകൾ (ഹൈറ്റിയേറ ഫോംസ്) എന്ന ഇന്നു കണ്ണൽക്കാടുകൾ സൃഷ്ടിവും തിരെ സവിശേഷതയാണ്.

ഗർഹം ഓഫ് മാനാർ ജൈവമണ്ഡലം റിസർവ്

ഇന്ത്യയുടെ തത്ക്കുറക്കിടക്കൻ തീരത്ത് 105000 ചതു രശ ഹൈക്കറ്റിൽ ഇത് വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു. സമുദ്ര ജൈവവൈവിധ്യത്തിൽ ലോകത്തെ സമ്പന്നമായ പ്രദേശങ്ങളിലെന്നാണിത്. അഴിമുഖങ്ങളുടുകൂടിയ 21 ദീപുകളും കടൽപ്പുറങ്ങളും കാടുകളും കടൽപ്പുല്ലികളും പരിപ്പൂര്ണമായും ലഭിച്ചുപ്പെട്ട നിലങ്ങളും കണ്ണൽക്കാടുകളും അടങ്കുന്ന പ്രദേശമാണിത്.

ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്ന 3600 ഓളം സസ്യ-ജന്തു ഇനങ്ങൾ അതാരാഫ്ട്രെറ്റൽത്തിൽത്തന്നെ വംശനാശം ഭീഷണി നേരിടുന്നവയാണ്. കടൽപ്പശ്ചാത്യം (Sea Cow - Dugong Dugong) ഇതിന് ഒരു ഉദാഹരണമാണ്. ഉപദീപി പീഡ ഇന്ത്യയുടെ തന്ത്രാധിക്രമം ആർ കണ്ണൽ ഇന്നു അളവിൽ വംശനാശഭീഷണിയിലാണ്.

ചോദ്യങ്ങൾ



1. താഴെ കാടുത്തിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ശത്രിയായ ഉത്തരം തെരഞ്ഞെടുത്തുക.
 - (i) പന്നമരം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വനങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണം
 - (a) നിത്യഹരിതവനം
 - (b) മുളാക്കാടുകൾ
 - (ii) താഴപ്പുരാധവയിൽ കടുവാസംരക്ഷണത്തിലേ ലക്ഷ്യത്തിൽപ്പെടുന്നത് എൽ?
 - (a) കടുവകളെ കൊല്ലുക
 - (b) കടുവകളെ മുഗ്ധലായിൽ അടയക്കുക.
 - (iii) നന്നാദേവി ജൈവമണ്ഡലം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം എത്രാണ്?
 - (a) ബീഹാർ
 - (b) ഉത്തരാവസ്ഥ
 - (c) യാർക്കാഖ
 - (d) മുൻസിപ്പാലി
 - (iv) യുനസ്കോ അംഗീകാരിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ജൈവമണ്ഡലിനാർബുകളുടെ എണ്ണം എത്ര?
 - (a) ഒന്ന്
 - (b) പത്ത്
 - (c) ഒരു ഒരു ഒരു
 - (d) ഒരു ഒരു
 - (v) ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ വനത്തുറപ്പകാരം എത്ര ശതമാനം ഭൂമിയാണ് വനമേഖലയ്ക്കായി വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്?
 - (a) 33
 - (b) 55
 - (c) 44
 - (d) 22
2. താഴപ്പുരാധവയിൽ 30 വാക്കിൽ ഉത്തരമെഴുതുക.
 - (i) എത്രാണ് നേന്താർഗ്ഗിക സസ്യജാലം? ഇഷ്ടാമേഖലാ നിത്യഹരിതവനങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ കാലാവസ്ഥ എന്ത്?
 - (ii) സാമ്പ്രദായവകുകളാണ് എന്നതുകാണുകൾ അനുമാക്കുന്നതെന്ത്?
 - (iii) ജൈവമണ്ഡലം റിസർവ്വുകളെ നിർവ്വചിക്കുക.
 - (iv) വനപ്രദേശങ്ങൾ വനപച്ചയും താഴിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തെല്ലാം?
3. താഴപ്പുരാധവയിൽ 150 വാക്കിൽ കവിയാതെ ഉത്തരമെഴുതുക.
 - (i) വനസ്പതികളെ മുഖപാലുകൾ എന്തെല്ലാം?
 - (ii) വനസ്പതികളെ വന്മാരിപ്പാർക്കണം ആകുകയുള്ളിട്ടും അങ്ങനെ കാര്യക്രമമാക്കാം?

ചോദ്യക്ക്/പ്രാബല്യത്തിനും

1. ഇന്ത്യയുടെ രൂപരേഖയിൽ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവ അടയാളപ്പെടുത്തുക
 - (i) കണ്ണൽക്കാടുകൾ കാണപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ.
 - (ii) ജൈവമണ്ഡലിനാർബുകളായ നന്നാദേവി, സൃഷ്ടിവൻ, ഗർഹം ഓഫ് മാനാർ, നീലഗിരി എന്നിവ.
 - (iii) മോറസ് സംരക്ഷിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ.
2. നിണ്ണലും സ്കൂളിനുചുറ്റുമായ കാണപ്പെടുന്ന മരങ്ങളുടെയും ചെറികളുടെയും കുറിച്ചേടിക്കളുടെയും പട്ടിക തയാറാക്കുക. ഇവയുടെ പ്രാബല്യിക പോലും ഉപയോഗവും എഴുതുക.

6

എലിയിലെ ഒരുവർഗ്ഗമാരനു സമ്പ്രദായങ്ങളെൽ്ലാം ചേരും വിളക്കുന്നതയും നിലനിൽക്കുന്നതും സാഹചര്യങ്ങൾ അടിസ്ഥാനാലോക്കമാണെന്ന് ടീബേഴ്സ് പിന്തുച്ചേരുന്നു. അപ്പീരുന്നതു ഒരു പ്രതിക്രിയയെല്ലാം വാദപ്പോൾ പിന്തുച്ചേരുന്നതും ജീവക്കാലങ്ങളും ഭാവനകൾ വരുട്ടുന്നതും ജീവക്കാലങ്ങളും ഉംഖിപ്പുന്നതും വരുന്നതും അനുഭവമാണെന്ന് പറിശീലപ്പെട്ടു കൂടുതലാക്കുന്നു. അനുഭവം എന്നും അവന്നിങ്ങനെല്ലാം ഏറ്റവും പ്രധാനമായും പാശ്ചാത്യ ചാരി ചാരി മാനസിക വിനിഷ്പിക്കപ്പെട്ട നാലുപ്പാതയും ഏറ്റവും വിലമന്ത്രിക്കുന്നതും ഒരു പ്രക്രമിക്കിപ്പിലെവിവരങ്ങൾ അഭ്യന്തരിച്ചുകൊണ്ട് ആവശ്യകമാണ്.



2F4A8

१६८

குழிகளைக் கடந்த கண்ணால் அது
பாதிக்கப் படுகிறது. மூவாவது கனமானத் (Horizon A)
என்ற பிழைக்குடை; ஏனென் இதுகுறிப்பதை வெவ்வேங்கொ
கனமாவது A (Horizon A). நானுபுத்தியும் நானுபுத்தியும்
ஒன்றைப்பார்மோலும் யான்; எனவேலும் போன்
காலங்களும் சிலவற்று இடம்பெற்று கண்ணாலும் என்ன
என்ன? கனமாவது A யானது; C யானது; பார்மோலை
வேலங்களும் கனமாவது B யானது; கண்ணாலும் என்ன
என்ன? பார்மோலைக்காலங்கள் உபயூக்தங்கள் இரு வகை
அல்லது பார்மோலைக்காலங்கள் இரு வகை அல்லது
ஒன்றைப்பார்மோலைக்காலங்கள் இரு வகை அல்லது
ஒன்றைப்பார்மோலைக்காலங்கள் இரு வகை அல்லது

மளர்திடு வசீகாக்குள்ளாம்

வழகுள்ளங்களை ஆய்வுக்கிறி, ஆராப்பண்டி, காலம் வடைய, என்குமாலைக்கு ஏற்றிவிடுவதன் துறையின்கீழ் இருக்கிறது. மூன்றாவது வழகுள்ளை இந்த சம்பந்தத்தை ஒப்பி கண்ணால்தான் கண்ணமால்லது.

ଏହିକଥର କାଳାବୟନ କରୁଥିଲା ତଣେ ପ୍ରମାଣ ଦିଲେଗଲା
ଶାଖାବ୍ୟନ ଅବସାଧିତିରେଖାରୁ; ଏହାରୁହିନେତରଙ୍କର କରୁଥିଲା
‘ଭର୍ତ୍ତବାନ’ (Fertile) ଏହାରୁ ବନ୍ଦକରୁଗଲେବୁରୁ କରୁଥିଲା
‘ଭାବୁନ’ (Arid) ଏହାରୁରୁବାଧିତିରୁ; କୁଠ ଦିଲେଗଲା.



എ.ഡി. പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മല്ലിനെ അതിരേഖയ്ക്കു തന്ത്ര സവിശേഷതയുടെയും തരികളുടെ വലിപ്പം (Texture), നിറം, ഭൂമിയുടെ ചർച്ച, മല്ലിലെ ജലാംശം എന്നീ ഒരു തന്ത്രികസ്ഥാവങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ വർഗ്ഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. തന്ത്രികളുടെ വലിപ്പ (Texture) തന്ത്രം അടിസ്ഥാനത്തിൽ മല്ലിനെ മണ്ണൻ (Sandy), കളിമല്ല് (Clayey), സിൽറ്റ്, ലോം തുടങ്ങിയവയായി തരം തിരിച്ചിരക്കുന്നു. നിരത്തിൽ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചുവപ്പ്, മണ്ണ, കറുപ്പ് മല്ലുകൾ എന്നിങ്ങനെയും മല്ലിനെ വർഗ്ഗീകരിച്ചിരക്കുന്നു.

സംബന്ധിച്ചുള്ള നിരവധി ഏജൻസികൾ ഇന്ത്യയുടെ മല്ലിനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ശാസ്ത്രീയമായ സർവ്വ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ദാമോദർ താഴ്വരഹോലൈറ്റുള്ള ഇന്ത്യയിലെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങളുടെ സമഗ്രമായ മല്ലിരേഖ പഠനത്തിനായി 1956-ൽ മല്ല് സർവ്വ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ റിസർച്ച് (ICAR) എൽ കീഴിൽ നാഷണൽ ബ്യാൻഡ് ഓഫ് സോയിൽ സർവ്വ & ലാൻഡ് യൂസ് ഫോറിന്റ് എന്ന സ്ഥാപനം ഇന്ത്യൻ മല്ലിനങ്ങളെക്കു രിച്ച് നിരവധി പഠനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്ഥാപന നടത്തിയെന്ന് ശ്രമിക്കുമ്പെട്ടാണെങ്കിലും ഇന്ത്യയിലെ മല്ലിനങ്ങളുടെ അന്താരാഷ്ട്രത്വത്തിലുള്ള താരതമ്പ്യപഠനത്തിനും സാധിച്ചു. United States Department of Agriculture (USDA) സോയിൽ ടാക്സോണമിയുടെ മാനദണ്ഡപ്രകാരം മല്ലിനങ്ങളുടെ സ്വഭാവസ്വിശേഷതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ICAR ഇന്ത്യൻ മല്ലിനങ്ങളെ വർഗ്ഗീകരിച്ചു.

USDA നാമകരണ പദ്ധതിപ്രകാരം ഇന്ത്യയിലെ മല്ലിന അഥവാ ICAR തംരംതിൽച്ച് തയാറാക്കിയ പട്ടിക

ക്രമ നം.	ക്രമം	വിസ്തീർണ്ണം (ആർക്കു ഹക്കറ്റിൽ)	ശതമാനം
i)	ഹൻസൈപ്പ് സോയിൻ	130372.90	39.74
ii)	എൻഡോസായിൻ	92131.71	28.08
iii)	അൾഫാസായിൻ	44448.68	13.55
iv)	ബെർട്ടിസായിൻ	27960.00	8.52
v)	അരിപിസായിൻ	14069.00	4.28
vi)	ഉൾട്ടിസായിൻ	8250.00	2.51
vii)	മോളിസായിൻ	1320.00	0.40
viii)	മറ്റൊളവ്	9503.10	2.92
ആകെ			100

അവലോം: ഇന്ത്യയിലെ മല്ലിനങ്ങൾ, നാഷണൽ ബ്യാൻഡ് ഓഫ് സോയിൽ സർവ്വ & ലാൻഡ് യൂസ് ഫോറിന്റ്, പ്രശ്ന ബീക്കറ്റാം നമ്പർ 94

ഉത്തരവം, നിറം, ഉള്ളടക്കം, സാഹസ്ര ഏന്റീവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ത്യൻ മല്ലിനങ്ങളെ താഴെ പറയുന്ന വയായി വർഗ്ഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

- (i) എക്കൽ മല്ല് (Alluvial Soils)
- (ii) കറുത്ത മല്ല് (Black Soils)
- (iii) ചുവന്തും മണ്ണത്തിലുള്ളതുമായ മല്ല് (Red and Yellow Soils)
- (iv) ചെകൽ മല്ല് (Laterite Soils)
- (v) വരണ മല്ല് (Arid Soils)
- (vi) ലവണ മല്ല് (Saline Soils)
- (vii) പീറ്റ് മല്ല് (Peaty Soils)
- (viii) വനമല്ല് (Forest Soils)


എക്കൽ മല്ല് (Alluvial Soils)

നബി തീരങ്ങളിലും ഉത്തരവേദ്യു സമതലങ്ങളിലും വ്യാപകമായി കാണുന്നപ്പെട്ടു മല്ലാണ് എക്കൽ മല്ല്. രാജ്യത്തിൽ മൊത്തം വിന്നത്തുതിയുടെ 40 ശതമാനവും എക്കൽ മല്ലാണ്. നദികളും അരുവികളും വഹിച്ചു കൊണ്ട് വന്ന് നിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ട മല്ലാണിത്. രാജസ്വാനിൽ കുറങ്കിയ വിന്നത്തിലെ തുടങ്ങി ശുജറാത്തിൽ സമതലങ്ങളിലേക്ക് ഇവ വ്യാപിക്കുന്നു. ഉപരിപീം മേഖലയിൽ കിഴക്കൻ തീരത്തും നദീതാഴ്വാരങ്ങളിലും ഇവ കാണപ്പെടുന്നു.



ചിത്രം 6.1 : എക്കൽ മല്ല്

മണ്ണൽ മല്ലു മുതൽ കളിമല്ല് വരെയുള്ള മല്ലിനങ്ങളുടെ വ്യത്യസ്തതാവാവങ്ങൾ പുലർത്തുന്നവയാണ് എക്കൽ മല്ല്. പൊതുപോലെ ശുശ്കവുമായ മല്ലാണിത്. ഉപരിപീം തരിലും മധ്യാലുട്ടതിലും ധാന്യാസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു വ്യത്യസ്തങ്ങളായ എക്കൽ മല്ലിനങ്ങൾ രൂപംകൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. വാദൽ മല്ലും അണിം ആരോ വർഷവും വൈള്ളപ്പെടുകയോളം നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്ന പുതിയ എക്കൽമല്ലിനെന്നായാണ് വാദൽ എന്നു വിളിക്കുന്നത്. കാൽസ്പ്രൂ സംയുക്തങ്ങൾ (kankars) അടങ്കിയ മല്ലാണ് വാദൽ മല്ലും. ബേഹമപുത്ര-ധാന്യാസ്ഥാനത്തിലുള്ള കീഴ്ചലുട്ടതിലും മധ്യാലുട്ടതിലും ഇതരം




கீழ்க்கண்ட பிரச்சினைகள்

മല്ല് കുടുതൽ നേർത്തതും കളിമല്ല് കലർന്നതുമാകാം. പടിഞ്ഞാറ് നിന്നും കിഴക്കോട് പോകുന്തോറും മണി ലിൻഡ് അംഗം കുറത്തുവരികയും ചെയ്യും.

എക്കൽ മല്ലിന്റെ നിറം മല്ലം ചാരനിറം മുതൽ കട്ടം ചാരനിറം വരെ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. നിക്ഷേപത്തിൻ്റെ കനം, തരികളുടെ വലിപ്പ്, പക്കമാർക്കന്തുക്കുന്ന സമയം എന്നിവയെ ആശയിച്ചുണ്ട് ഇതിന്റെ നിറം രൂപപ്പെടുന്നത്. എക്കൽ മല്ല് കൃഷിക്ക് വ്യാപകമായി ഉപയോഗപ്പെടുന്നുണ്ട്.

കറുത്ത മല്ല് (Black Soil)

ഡെക്കാൻ പീംഭുമിയുടെ ഭൂരിഭാഗം പ്രദേശങ്ങൾ ഇല്ലം കാണപ്പെടുന്ന മല്ലാണിത്. മഹാരാഷ്ട്ര, മധ്യ പ്രദേശ്, ഗുജറാത്, ആസ്സാധ്യേശ്, തമിഴ്നാട് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ചില ഭാഗങ്ങളിലുണ്ട് ഈ മല്ല് കാണപ്പെടുന്നത്. കൃഷ്ണ, ശോഭാവരി നദികളുടെ ഉയർന്ന ഭാഗങ്ങൾ, ഡെക്കാൻ പീംഭുമിയുടെ വടക്കു-പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ കറുത്ത മല്ല് വളരെ ആഴത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു. ഇതിനെ റിം മല്ല് എന്നും (Regur Soil) കറുത്ത പരുത്തി മല്ല് (Black Cotton Soil) എന്നും വിളിക്കുന്നു. പൊതുവെ കറുത്ത മല്ല് കളിമൺ സ്പാബാവത്തിലുള്ളതും ആഴത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നതും പ്രവേശനീയതയില്ലാത്തതുമാണ്. നന്ദി സോഡ് കുതിരിന്ന് വീർക്കുകയും വരംഭത്താകുംബാൾ ചുരുങ്ങിപ്പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വരൾച്ചാകാലത്ത് മല്ലിൽ വ്യാപകമായി വിള്ളലു കളിംബാകും. ഇതിനെ സയം ഉഴുതുമരിക്കൽ പ്രക്രിയ (Soil Ploughing) എന്നു പറയുന്നു. കുറഞ്ഞ തോതിലുള്ള ജല ആശിരണശൈലിയും ജലനഷ്ടവും കരണം കറുത്തമല്ലിന് ഏറ്റവും ഇളർപ്പം നിലനിർത്തും നൂൽ ശേഷിയുണ്ട്. ഈ പ്രത്യേകത കരാണ്ടുതന്നെ മാത്രയേ ആശയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കാർഷിക വിളകൾ വരൾച്ചാകാലത്തും അതിജീവിക്കുന്നു.



ചിത്രം 6.3 : വരംഭ കാലത്തെ കറുത്തമല്ല്

ചുമ്പാവ്, ഇരുവ്, മൾസിഫ്യൂറ്, അലൂമിനീ എന്നിവയാൽ സംബന്ധമാണ് കറുത്ത മല്ല്. പൊട്ടാഫ്യൂം ഈ മല്ലിൽ കാണപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ഫോസ്ഫറസ്റ്റിനും

രൈറ്റേജനും ജൈവാംബൈം ഈ മല്ലിൽ കുറവാണ്. കട്ടാകരുപ്പ് മുതൽ ചാരനിറംവരെ നിവൃത്യാസമുള്ള വയാൺ ഈ മല്ലിനും.

ചുവന്ന മല്ലും മഞ്ഞും

(Red and Yellow Soil)

ഡെക്കാൻ പീംഭുമിയുടെ കിഴക്കൻ ഭാഗത്തും പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തും മിക്ക കുറഞ്ഞതും പ്രദേശങ്ങളിൽ പരലി കുത്ത ആശോധണിലായിരിക്കിന്നും രൂപപ്പെട്ടതാണ് ചുവന്ന മല്ല്. പച്ചിമാലാട്ടണിൽ കീഴ്ചോതൽ നീതിയിൽ വ്യാപകമായി ചുവന്ന പരിമിയാർന്ന മല്ല് കാണാം. മധ്യഗം ഗാസമതലത്തിൽ തെക്കൻ ഭാഗങ്ങളിലും ചരൽതീസ്തവൾ, ദൈഹികയുടെ ഭാഗങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലും മഞ്ഞും ചുവപ്പും മല്ലിനങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നു. പരലിക്കുതമായ ശിലകളിൽനിന്നും കായാനത്തിൽശിലകളിൽ നിന്നും വേർപ്പെടുന്ന ഇരുവിന്റെ സാന്നിധ്യം മുലമാണ് ഈ മല്ലിനത്തിന് ചുവപ്പും നിറമുണ്ടാകുന്നത്. പെരും രൂപം ആർജിക്കമ്പുംപോൾ ഈ മല്ല് മഞ്ഞ മഞ്ഞ നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു. നേർത്ത ചുവപ്പും മഞ്ഞും കലർന്ന മല്ലിനങ്ങൾ പൊതുവെ ഫലഭൂതിപ്പംവുമാണ്. എന്നാൽ വരംഭ ഉത്തരം പ്രദേശങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്നതിൽ കുത്തമല്ലിനും മല്ലിനും ഫലഭൂതിപ്പം കുറവാണ്. ജൈവാംബൈം, ഫോസ്ഫറസ്റ്റിനും, രൈറ്റേജിൽ ചുവന്നും മല്ലിൽ പൊതുവെ കുറവാണ്.

ചെങ്കൽ മല്ല് (Laterite Soil)

ലാറ്ററിറ്റ് എന്ന പദം ലാറ്റിൻ ഭാഷയിലെ ലോറ്റ് (Later) എന്ന പദത്തിൽനിന്നാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. കല്ല് എന്നാണ് ഇതിന്റെ അർഥമം. ഉയർന്ന മാത്രം ഉംഖംമാവും ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലുണ്ട് ലാറ്ററിറ്റ് മല്ല് രൂപപ്പെട്ടുന്നത്. ഉഷ്ണമേഖലാ മാത്രയേ (Tropical rain) ഫലമായി ധാരാളം ജലം മല്ലിലേക്ക് ഉള്ളിരിഞ്ഞുകയും ഈ പ്രദേശത്തെ മല്ലിലാട്ടണിയിട്ടുള്ള കാരണസ്യം, നിലിക്കുന്ന എന്നു മുളക്കങ്ങൾ ജലത്തിൽ ലയിച്ച് ലഭിച്ച പോകുകയും (Leaching) ഇരുവ് ഓക്സിഡേശൻ, അലൂമിനിയം സംയുക്തങ്ങൾ എന്നിവ മല്ലിൽ അവശേഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഉയർന്ന ഉംഖംമാവിൽ ബാക്ടീരിയയുടെ പ്രവർത്തനഫലമായി ജൈവാംബൈം പെട്ടെന്ന് ഇല്ലാതാവുന്നു. ജൈവപപാർമ്മണാൾ, രൈറ്റേജിൽ, ഫോസ്ഫറസ്റ്റിൽ, കാർബിന്യൂം എന്നിവ ഈ മല്ലിൽ കുറവാണ്, അങ്കെന്ന മല്ലിൽ ഒക്കെന്നും പൊട്ടാഫ്യൂംകാണും സംബന്ധമാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ മല്ല് കൃഷിക്ക് ഫോസ്ഫറസ്റ്റിലും വളരും രാസവള്ളങ്ങളും ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാൽ മല്ലിന്റെ ഫലഭൂതിപ്പം വർദ്ധിക്കുകയും കൃഷിക്ക് യോഗ്യമാവുകയും ചെയ്യും.

തമിഴ്നാട്, ആസ്സാധ്യേശ്, കേരളം തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലെ ചുവന്ന ലാറ്ററിറ്റ് മല്ല് കലുവണ്ടിപ്പോലുള്ള വിളക്കുത്ത കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമാണ്.

വിൽ നിർമ്മാണത്തിനായി ലാറ്റോറിൽ മൺഡിനെ വെട്ടുകള്ളായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഉപദീപിയ പീറ്റേലിയുടെ ഉയരംകൂടിയ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഈ മൺഡി പ്രധാന മായും രൂപപ്പെടുന്നത്. കർണ്ണാകം, കേരളം, തമിഴ്നാട്, മധ്യപ്രദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിലും ദൈഷ, അസം സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മലയേണ്ണങ്ങളിലുമാണ് ഈത് സാധാരണയായി കാണപ്പെടുന്നത്.

വരണ്ട മൺഡി (Arid Soil)

ചുവപ്പ് മുതൽ തവിട്ടുനിന്നും വരെയുള്ള നിറമാണ് ഈ മൺഡി. ഘടനാപരമായി മനനരൂപവും ലവണ്ണതു സ്വഭാവമുള്ളതുമാണ് ഈ മൺഡി. ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉള്ളിൽ അംശം വളരെ കൃടുതലായിരിക്കുന്നു. സാധാരണ ഉപ്പ് ലഭിക്കുന്നത് ലവണ്ണജലം ബാഷ്പവികരിച്ചുണ്ട്. വരണ്ട കാലാവസരം ആയതുകൊണ്ടുതന്നെ ഉയർന്ന ഉഖമാവം ബാഷ്പവികരണ തോത് വർധിപ്പിക്കുന്നു. ജലംശവും ജൈവാംശവും ഈ മൺഡിൽ നന്നെ കുറവായിരിക്കുന്നു. ഈ മൺഡിൽ നെടുച്ചജിൽ ആളവ് തീരെകുറവും ഫോസ്ഫറസിന്റെ ആളവ് മിതമായ നിരക്കിലുമാണ്.



ചിത്രം 6.4: വരണ്ട മൺഡി

ഉപരിതലത്തിന്റെ അടിഭാഗത്തെക്കു പോകുന്നതുണ്ട് കാൽസൈറ്റിൽ തോത് കൂടിവരുന്നതിനാൽ ഈ മൺഡിന്റെ താഴെയുള്ള മണ്ണാവത്തിൽ കക്കാർപാളി (Kankar) കളായിരിക്കും. കക്കാർപാളി രൂപപ്പെടുന്നത് ജലത്തിന്റെ അഭിച്ഛിറ്റാതെ തയ്യാറാം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സസ്യവളർച്ചകൾ ജലസേചന സൗകര്യം അനിവാര്യമാകുന്നു. വരണ്ട ഇപ്പെടുത്തിയുള്ള പട്ടണത്താൻ രജഞ്ചന നിലാണ് ഈ മൺഡി കൃടുതലായി രൂപപ്പെടുന്നത്. ജൈവാംശവും ജൈവപദാർഥങ്ങളും ഈ മൺഡിൽ വളരെ കുറവാണ്.

ലവണാമൺഡി (Saline Soil)

ഈ മൺഡിനെ ഉഖര (Usara) മൺഡി എന്നും വിളിക്കുന്നു. സോഡിയിം, പെട്ടാസൈറ്റ്, മഗ്നീഷ്യും എന്നിവയാരാളമായി ഈ മൺഡിൽ കാണപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഫലഭൗധിക്കരിച്ചയില്ലാത്തതും ധാത്രതാരു തരത്തിലുള്ള സസ്യവളർച്ചക്കും അനുയോധജമല്ലാത്തതും മാണ് ഈ മൺഡി ജലാംശത്തുകുറവും വരണ്ട കാലാവസരത്തിനും പൊതുവെ തുപം കൊള്ളുന്ന മൺഡിനിൽ.

അംശം കൃടുതലാണ്. വരണ്ട - ഭാഗികമായി വരണ്ട പ്രദേശങ്ങളിലും, വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ചതുപ്പ് നിലങ്ങളിലുമാണ് ഈ മൺഡി കാണപ്പെടുന്നത്. അടനാപരമായി ഈ മൺഡിൽ മണ്ണാല്പും പശിമമല്ലും കലർന്നു കാണപ്പെടുന്നു. നെടുച്ചുനാ കാൽസൈറ്റും ദുർബലഘാണ് ഈ മൺഡിൽ. പട്ടണത്താൻ ഗുജറാത്ത്, കിഴക്കൻ തീരപ്രദേശത്തെ ദൈൽഡികൾ, പശ്ചിമബംഗാളിലെ സുന്ദർബൻ എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഈ മൺഡി വ്യാപകമായി കാണപ്പെടുന്നു. റാഡി ദൈർക്കു പ്രദേശത്ത് തന്നെ പട്ടണത്താൻ മൺഡിസ് മണ്ണുടെ ഫലമായി ലവണ്ണാംശങ്ങൾ ഒഴുകിയെത്തുകയും അവ ഭാഗമായി തന്നെ നികേഷപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ദൈൽഡിപ്രദേശങ്ങളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന സമൂദ്രജല കയറ്റും ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇത്തരം മൺഡി ഉണ്ടാവാൻ കാണുന്നു. ജലസേചനസൗകര്യത്തോടു തീവ്രകൂഷി നടത്തി, ഹരിതവിപ്പവം നടന്ന പ്രദേശത്തോടു ഏകദേശം മൺഡി ലവണ്ണാംശം മാറി തിട്ടുണ്ട്. അമിത ജലസേചനവും വരണ്ട കാലാവസരയും കാപ്പില്ലാം പ്രവർത്തിത്തന്ത്രത്തിന് ആകാം കൃടുന്നു. ഈ ആ മൺഡിൽ ഉയർന്ന പാളികളിൽ ലവണ്ണാംശം വന്നിട്ടും കാണുന്നു. പഞ്ചാംശം, ഹരിയാന പോലെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇത്തരം മൺഡി ലവണ്ണാംശം വരുന്നതാണെന്നും ജീവംസം ചേർക്കുവാൻ കർഷകരും ഉപദേശിക്കാറുണ്ട്.

പീറ്റ് മൺഡി (Peaty Soil)

ഉയർന്ന മഴയും കൃടുതൽ ഇംഗ്ലീഷ്യുമുള്ള സംബന്ധം തീലാണ് ഈ മൺഡി കണ്ണുവരുന്നത്. ഇവിടെ സസ്യജാലങ്ങളും നന്നായി വളരുന്നു. ജൈവ-മൃതാവശിഷ്ടങ്ങൾ കൃടുതൽ ആളുവിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുന്നതുകാണം തുജോംശവും ജൈവപദാർഥങ്ങളുംകാണം സംബന്ധം നിലാണ് ഈ മൺഡി. 40 മുതൽ 50 ശതമാനംവരെ ജൈവപദാർഥങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ്യും കാണപ്പെടുന്നു. പൊതുവെ ദീർഘകാലം കൃടിയതും കറുത്തനിനിതിലുള്ളതുമാണ് ഈ മൺഡി. പല പ്രദേശത്തും ഈ മൺഡിന് കാണപ്പെടുന്നു. പൊതുവെ ദീർഘകാലം കൃടിയതും ഈ മൺഡിന് കഷാര സാഭാവമുണ്ട്. ബിഹാരിൽ ദീർഘകാലം ആശയാർഥി, ഉത്തരാവണിയിൽ തെരുവാർഥി, ഭാഗജാർഥി, പശ്ചിമബംഗാളിൽ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ, ദീർഘകാലം അഭിച്ഛിറ്റാതെ തയ്യാറാക്കുന്നു.

വനമൺഡി (Forest Soil)

പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ നന്നായി മഴ ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ തുപം കൊള്ളുന്ന മൺഡിനിൽ. പർവ്വതപരിസ്ഥിതിയെ ആശയിച്ചു ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷും ദീർഘകാലം തരിവലിപ്പത്തിലും വൃത്ത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നു. താഴവാദാഗണങ്ങളിൽ പശിമയാർന്ന മണ്ണാണ് കാണുന്നതും തെക്കിൽ ഉയർന്ന ചരിവുകളിൽ വലിയ തരികളുള്ളതും മണ്ണാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. മന്തുമുടിയ ഹിമാലയയം അനാവരണ പ്രക്രിയകൾ (Denudation) വിധേയമാകുന്നതിനാൽ ഈ മൺഡി അല്ലാശം കൃടുതലും ജൈവാംശം

കുറവുമാണ്. താഴ്വരകളിൽ ഈ മല്ലിനം ഫലഭൂതി ഷംതയുള്ളതാണ്.

മുകളിൽ വിവരിച്ചതുപോലെ ഓരോ മല്ലിനവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. സസ്യങ്ങളുടെ വളർച്ചയിലും മുള പൊട്ടുന്നതില്ലെങ്കിലും മല്ലിൻ്റെ അടങ്കയും ഗുണങ്ങളും വളരെ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. മല്ല ധമാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ജൈവവൃദ്ധിസ്ഥാനം മറ്റേതൊരു ജീവിതയും പോലെ മല്ല രൂപപ്പെടുകയും നശിക്കുകയും സമയം സമയങ്ങളിൽ ശത്രയായ പരിചരണം നൽകിയാൽ നാശത്തെ അതിജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മല്ലി നേരിപ്പിക്കുന്ന ആശാനത്താൽ പരിസരിത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രത്യാശാനത്താൽ ഏറ്റരായായിരിക്കും.

മല്ലിൻ്റെ അപചയം (Soil Degradation)

അശാസ്ത്രീയമായ ഉപയോഗവും മല്ലാലിപ്പും മുലം മല്ലിൻ്റെ പോഷകനിലവാരവും കനവും കുറയുന്നതിന്റെ ഫലമായി മല്ലിൻ്റെ ഫലപ്രശ്നം നഷ്ടമാകുന്നതാണ് മല്ലിൻ്റെ അപചയം. ഇന്ത്യയിലെ മല്ലിൻ്റെ നാശത്തിനുള്ള പ്രധാനകാരണം മല്ലിൻ്റെ അപചയമാണ്. മല്ലി നേരിപ്പിക്കുന്ന ആശാനത്താൽ പരിസരിത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രത്യാശാനത്താൽ ഏറ്റരായായിരിക്കും.


മല്ലാലിപ്പ് (Soil Erosion)

മല്ലിൻ്റെ ആവരണത്തിനുണ്ടാകുന്ന തകർച്ചയെ യാണ് മല്ലാലിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. മല്ല രൂപീകരണപ്രകിട്ടുകയും ഒഴുക്കുജലത്തിന്റെയും കാറ്റിന്റെയും അപരദനപ്രകിട്ടുകയും ഒരേ സമയം തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും പൊതുവെ ഈ രണ്ട് പ്രകിട്ടുകളും തെളിഞ്ഞു ഒരു സന്തുലിതാവസ്ഥ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. ഭൂമേഖലയിൽനിന്ന് നേർത്ത മണ്ഠൽകൾ നീക്കിക്കൊണ്ടുപോവുന്ന ആവേശ നിരക്കിൽത്തന്നെ മൺ ആവരണത്തിലേക്ക് മണ്ഠൽകൾ കൂടിച്ചേരിക്കപ്പെടുന്നുമുണ്ട്. എന്നാൽ ചില സമയങ്ങളിൽ നീക്കപ്പെടുന്ന മല്ലിൻ്റെ അളവ് കുടുമ്പോൾ ഈ സന്തുലിതാവസ്ഥ നഷ്ടപ്പെടുന്നു. പ്രകൃതിയുടെ പ്രവർത്തനമോ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രവർത്തനമോ കാരണമായിട്ടാണ് ഈ സംഭവിക്കുന്നത്. പലപ്പോഴും വർത്താതിലുള്ള മല്ലാലിപ്പിന്റെ പ്രധാന ഉത്തരവാദിത്തം മനുഷ്യൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. ജനസംഖ്യ ഉയരുമ്പോൾ ഭൂമിയുടെ ഫലപ്രദത്തു ആവശ്യകതയും കുടുമ്പുണ്ട്. കാടും മറ്റ് നെന്നസർക്കിക സസ്യങ്ങളാണുള്ള കൂഫിക്കായും വാസനാലങ്ങൾക്കായും മുതലാണുടെ മേച്ചിൽപ്പുറങ്ങൾക്കായും മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായും മനുഷ്യൻ മാറ്റിയെടുക്കുന്നു.

മല്ലിനെ അടർത്തിമറ്റുന്നതിലും അവയെ വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോയി മറ്റൊരു സമലഭത് നിക്ഷേപിക്കുന്നതിലും കാറ്റിന്റെയും ജലത്തിന്റെയും പങ്ക് വളരെയെ ദീയാണ്. വരണ്ട - ഭാഗികമായി വരണ്ട പ്രദേശങ്ങളിൽ

കാറ്റിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളാലുള്ള അപരദനമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. മഴ കുടുതലായുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലും കുത്തനെയുള്ള ചരിവുകളിലും ഒഴുക്ക് ജലമാണ് മല്ലാലിപ്പിന്റെ പ്രധാന കാരണം. ഇതുയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ജലം നിഖിതമായുള്ള മല്ലാലിപ്പ് വ്യാപകമാണ്. സമതലപ്രദേശങ്ങളിൽ നല്ല മഴ പെയ്തതിനുശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന പാളികളായുള്ള അപരദനം അതു ശുഭിക്കപ്പെടാണ്. എന്നാൽ ഫലഭൂതിയായ മല്ലി ഒപ്പുകൂടിയും പാളികളാണ് വലിപ്പിച്ചും കുടുമ്പും തുടർന്നു അപരദനമാണ്. മഴ പെയ്തുന്നതിനുസരിച്ച് പാളികളുടെ വലിപ്പിച്ചും കുടുമ്പും തുടർന്നു അപരദനമാണ്. അപരദനയും പാളികളും കുടുമ്പും തുടർന്നു അപരദനമാണ്.

അശാസ്ത്രീയ ചാലുകളുള്ള ഭൂപദേശത്തെ നിശ്ചില ഫലഭൂതി എന്ന് വിളിക്കുന്നു (Badland Topography). ഇതരം വലിയ ചാലുകൾ വ്യാപകമായുള്ള സബലമാണ് ചാലുകൾ താഴ്വര. തമിഴ്നാട്ടിലും പശ്ചിമഭാഗം തീരും ഇതരതരത്തിലുള്ള സമലഭങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നു. ഓരോവർഷവും 8,000 ഹെക്ടർ ഭൂമിയാണ് ഇങ്ങനെ ചാലുകളായുള്ള ഭൂമിയായി മാറ്റപ്പെടുന്നത്. ഏതുതരം ഭൂപദേശങ്ങളാണ് ചാലുകൾിലുള്ള അപരദനത്തിന് വിധേയമാകുന്നത്?



ചിത്രം 6.5 : മല്ലാലിപ്പ്

ഇന്ത്യൻ കാർഷിക മേഖലയിലെ ഒരു ഗുരുതരപ്പെ ശനമാണ് മല്ലാലിപ്പ്. ഇതിന്റെ പ്രതികുലപരാഗങ്ങൾ മറ്റു മണ്ഡലങ്ങളിലും കണ്ണൂരുതുങ്ങങ്ങളിൽക്കൂടുന്നു. നദികൾ വഹിച്ചുരക്കാണ്ടുപോവാനുള്ള അപരദനപാർമ്മങ്ങൾ നദികളുടെ ഒഴുക്കിക്കൊണ്ടുപോവാനുള്ള ശേഷി കുറയ്ക്കുകയും ഇത് ഇടയ്ക്കിടക്കുള്ള വൈള്ളപ്പാക്കത്തിന് കാരണമാവുകയും കൂഫിക്കുമിക്ക് കാര്യമായ നാശം വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

വന്നുശീകരണമാണ് മല്ലാലിപ്പിനുള്ള പ്രധാന കാരണം. മരങ്ങളുടെ വേഗുകൾ മല്ലിനെ പിടിച്ച് നിർത്തുന്നത് കൊണ്ട് മല്ലാലിപ്പിനെ തെയ്യുന്നു. മരങ്ങൾ ഇലപൊഴിക്കുന്നതുകൊണ്ടു തന്നെ മല്ലിലേക്ക് ജൈവാംശവും കൂടിച്ചേർക്കെപ്പുടുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വന്നുശീകരണം നടക്കുന്നു. കുന്നിൻ ചരിവുകളിലാണ് വന്നുശീകരണം മല്ലാലിപ്പിന്റെ ആകാം കൂടുന്നത്.

അഖിത ജലസേചനംകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ വലിയാരു ഭാഗം ജലസേചനഭൂമിയും ലവണ്യത്വം കൂടിയ ഭൂമിയായി മാറുന്നു. മല്ലിന്റെ താഴ്ന്ന വിതരണങ്ങളിലൂള്ള ലവണ്യാംശം ഉപരിതലത്തിലേക്ക് വരികയും ഫലഭൂതി സ്ഥിത നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ജൈവവള്ളങ്ങൾക്ക് പകർക്കം രാസവള്ളങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതു മല്ലിന് നാശമുണ്ടാക്കുന്നു. മല്ലിന് ജൈവാംശം നൽകുന്നതിന് പകർക്കം രാസവള്ളങ്ങൾ മല്ലിനെ കൂടുതൽ ഉറപ്പുള്ളതാക്കുകയും ക്രമേണ മല്ലിന്റെ ഫലഭൂതിയിൽക്കൂടി കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ധരിതവിപുലവക്കൊണ്ട് നേട്ടം കൊയ്തു മുഴുവൻ നടത്തിക്കൂട്ടിക്കൂടുന്ന സാധ്യനുമേഖലകളിലൂം ഇല്ല പ്രവർത്തനം സാധാരണന്നുണ്ട്. ഓരോ വർഷവും മില്യുൺ കണക്കിന് ദണ്ഡ് മല്ലം പോഷകാംശങ്ങളും അപചയംകൊണ്ട് നശിക്കുന്നു. ഇത് ദേശീയ ഉർഭപാദനക്ഷമതയെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടുനെന്നു മല്ലിന്റെ വീണ്ടുംപ്പിനും മല്ല് സംരക്ഷണ തത്ത്വം അടിയന്തരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇടപെടുത്തുമാണ് വേണ്ടത്.

മല്ലിന്റെ സംരക്ഷണം

മനുഷ്യനാണ് മല്ലാലിപ്പിനും മറ്റും പ്രധാന കാരണക്കാരാനുണ്ട്. മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ് മല്ലിനെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതും. പ്രകൃതി സന്തുലനം നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ സമർപ്പിക്കുന്ന മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള നിരവധി അവസരങ്ങളാണ് പ്രകൃതി മനുഷ്യൻ നൽകുന്നത്. മല്ലിന്റെ ഫലഭൂതി



ചിത്രം 6.6 : മല്ലാലിപ്പ്

ഷംത നിലനിർത്താനും മല്ലാലിപ്പ് തെയ്യുന്നതിനും അപചയത്തിന് വിധേയമായ മല്ലിനെ മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു രീതിശാസ്ത്രമാണ് മല്ല് സംരക്ഷണം.

അശാസ്ത്രീയമായ കുഷിരിതികളാണ് മല്ലാലിപ്പിന് ആകാം കൂടുന്നത്. കുന്നിൻ ചരിവുകളിലെ തുറിസായ ഭൂമിയിൽ കുഷി ചെയ്യുന്നത് തെയ്യുക എന്ന താണ് ഇതിനുള്ള പരിഹാരത്തിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടം. 15 മുതൽ 25 ശതമാനവരെ ചരിവുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ കുഷി ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ ഇത്തരം പ്രദേശങ്ങളിൽ കുഷി അനിവാര്യമാണെങ്കിൽ ഭൂമി തട്ടുതട്ടുകളായി തിരിച്ച് കുഷി ഇരക്കുന്നതായിരിക്കും അഭിക്കമ്പം. അഖിതമായ കനുകകാലി മേയലും സാനാനാരകകു ശിയും ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രകൃതി ആവശ്യത്തെ നിലനിക്കുന്ന മല്ലാലിപ്പിനെയും കാരുമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ പ്രത്യാധാരങ്ങൾ ശരിയായ ബോധവൽക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ശ്രാമികൾ ജനത്തെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കോണ്ടൂർ തട്ടു നിർമ്മിതി (Contour bunding), നിയന്ത്രിത വനവൽക്കരണം, നിയന്ത്രിത കനുകകാലി മേക്കൽ, ആവശ്യനില പ്രവർത്തനം (Cover cropping), മിശ്രകുഷി, വിളപരിവൃത്തി എന്നിവയാണ് മല്ലു ലിപ്പ് കുറയ്ക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ.

നിർച്ചാരി മല്ലാലിപ്പ് (Gully erosion) രൂപപ്പെടുന്നത് തെയ്യാനും നിയന്ത്രിക്കാനും ശ്രമങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. തട്ട് കുഷിരിതിയിലൂടെ നേർത്ത ചാലുകൾ നമ്മുകൾ ഒഴിവാക്കാനുകൂടാം. നിയന്ത്രിത തെയ്യങ്ങൾക്ക് നിർമ്മിക്കുകവഴി വലിയ നിർച്ചാലുകളിലെ അപരദനതീവരതു കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് സാധ്യക്കും. നിർച്ചാലുകളുടെ തലക്കലെ അപരദനം നീഡപ്പെടുത്തുന്നതും പ്രയോഗം നിയന്ത്രിക്കാനും ശ്രമമാണും. ദേശീയ വരും മേഖല ഗവേഷണ ഇൻസ്റ്റിറ്യൂട്ട് (Central Arid Zone Research Institute - CAZRI) പട്ടണത്താറിൽ രാജസ്വാനിക്ക് മണ്ണത്തുകൂനവും പനം തെയ്യുന്നതിനും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുമായി നിരവധി പരിക്ഷണങ്ങളുണ്ട് നടത്തുന്നത്.

രാജുത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ മല്ല് സംരക്ഷണത്തിനായി വിവിധതരത്തിലൂള്ള പദ്ധതികളാണ് ഭാരത സർക്കാരിന്റെ കീഴിലുള്ള കേരു മല്ല് സംര

കഷണ ബോർഡ് (Central Soil Conservation Board) ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ജനങ്ങളുടെ സാമ്പദികാവസരം, ഭൂപരിശോധനയിൽ കിട്ടു, കാലാവസരം എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈ പദ്ധതികൾപൊല്ലും സമഗ്ര സ്വഭാവത്തോടുകൂടിയവയല്ല. സാധ്യാജീവ ഭൂവിനിയോഗ പദ്ധതികളാണ് ശരിയായ മണ്ണ് സംരക്ഷണത്തിന്

ആവശ്യം. ഭൂപരിശോധനയിൽ അതിശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടു തന്നെ ഭൂവിനിയോഗഭൂപടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയും ഭൂഖി ശരിയായ ആവശ്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയും വേണം. മണ്ണ് സംരക്ഷണത്തിൽ അതിമായ ഉത്തരവാദിത്തം ഇതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതും ഇതിൻ്റെ പ്രയോജനം സീക്രിക്കറ്റുന്നതുമായ ജനജ്ഞാനിലായിത്തീർന്നു.

ചോദ്യങ്ങൾ



1. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ശരിയായ ഉത്തരം തെരഞ്ഞെടുത്തുക.
 - (i) താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ എത്ര താൽത്തിലുള്ള മണ്ണാണ് എറുവും കുടുതലായി കാണപ്പെടുന്നതും കുടുതൽ ഉൽപ്പാദനക്കാർത്തയുള്ളതും?
 - (a) ഏകാൽ മണ്ണ്
 - (b) ചെങ്കൽ മണ്ണ്
 - (c) കറുത്ത മണ്ണ്
 - (d) വനമണ്ണ്
 - (ii) നിശ്ച മണ്ണ് എന്നത് എത്തിനാം മണ്ണിൽന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ്?
 - (a) ലവണ മണ്ണ്
 - (b) വരണ മണ്ണ്
 - (c) കറുത്ത മണ്ണ്
 - (d) ചെങ്കൽ മണ്ണ്
 - (iii) താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ എത്രാണ് ഇന്ത്യയിലെ മെർമ്മണ്ണ് ദശക്കാനുള്ള പ്രധാന കാരണം?
 - (a) കാർബൺ അപരദനം
 - (b) നാട്കളുടെ അപരദനം
 - (c) അമിത ഉംർന്മിജണൽ (Leaching)
 - (d) ഇന്ത്യാനുമല്ല
 - (iv) ഇന്ത്യയിലെ ജലസേചിത്തമായ കൃഷിഭൂമികളിൽ ലഘുവാസപ്പെടുത്തുന്ന കാരണം എന്ത്?
 - (a) ജീവസം ചേരുന്നതുകൊണ്ട്
 - (b) അഥവായി മുഗ്ധങ്ങളും മേര്ക്കൽ
 - (c) അമിത ജലസേചനം
 - (d) രാസവളംളുടെ ഉപയോഗം
 2. 30 വാക്കിൽ ഉത്തരമെഴുതുക
 - (i) മണ്ണ് എന്നാലെന്ത്?
 - (ii) മണ്ണിൽന്റെ രൂപീകരണത്തെ സാധാരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്രകാരങ്ങൾ എന്തെല്ലാം?
 - (iii) മണ്ണിൽന്റെ പരിചേരങ്ങിൽന്റെ മുൻ മണ്ഡലങ്ങൾ എവ?
 - (iv) എത്രാണ് മണ്ണിൽന്റെ അപചയം?
 - (v) വാദർ, ഭാഗർ എന്നിവ തയ്യാറാക്കുന്ന വൃത്ത്യാസമെഴുതുക.
 3. 125 വാക്കിൽ കവിയാരെ ഉത്തരമെഴുതുക.
 - (i) എത്രാണ് കറുത്ത മണ്ണ്? ഇതിൽന്റെ രൂപീകരണവും സവിശേഷതകളും എഴുതുക.
 - (ii) മണ്ണ് സംരക്ഷണം എന്നാലെന്ത്? മണ്ണ് സംരക്ഷണത്തിനുള്ള പ്രധാനപ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർണ്ണാക്ക.
 - (iii) ഒരു പ്രത്യേകതം മണ്ണ് ഫലഭ്യിഷ്ഠമാണോ അല്ലെങ്കാണ് എന്ന് എങ്കെന്ന മനസ്സിലാക്കും? സാഹചരിക ഫലഭ്യിഷ്ഠതയും മനസ്സുനിർമ്മിത ഫലഭ്യിഷ്ഠതയും തമിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എവ?
- പദ്ധതി/പ്രവർത്തനങ്ങൾ**
1. നിജങ്ങളുടെ പ്രദേശത്ത് കാണപ്പെടുന്ന വിവിധയിനം മണ്ണിനങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയും റിഫ്ലോർട്ട് തയാറാക്കുകയും ചെയ്യുക.
 2. താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന മണ്ണിനങ്ങൾ വ്യാപകമായി കാണപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ രൂപരേഖയിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുക.
 - (i) ചുവന്ന മണ്ണ്
 - (ii) ചെങ്കൽ മണ്ണ്
 - (iii) ഏകാൽ മണ്ണ്

യുണിറ്റ്

IV

പ്രക്രियക്കാണോള്വും ദുരന്തങ്ങളും;
കാരണങ്ങൾ, പത്രാജ്വാതങ്ങൾ, പരിപാലനം

ഈ യുണിറ്റിൽ ചർച്ചചെയ്യുന്നത്

- പ്രഖ്യാപനം വിശദീകരിക്കും
- ഭൂകമ്പവും സൗന്ദര്യവും
- വികസനങ്ങൾ
- ഉദ്യോഗങ്ങൾ



H5Y7L4

പ്രകृതിക്കേൾവാൻമാളും പ്രകृതിദുരന്തവാൻമാളും

କାନ୍ଦିଲଙ୍କରୁ ମାତ୍ରା ଏହାର ପାଇ ଆଶିଷନ୍ତିବଳେ
ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଯିବାକୁଣ୍ଟି ବିଶ୍ଵାସରୀପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବ୍ୟକ୍ତି
ପାଞ୍ଚଟଙ୍କର ଅଟିବ୍ୟାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତିରେ ଥିଲା । ଯକ୍ଷତିରେ
ବୁନ୍ଦିରେଣ୍ଟି ପରିଚ୍ଯାକର, ମାତ୍ରା ଏହାର ର୍ଯ୍ୟାନାଦୀରେ
ହିଂମରୁଦ୍ଧ କାହାରେ ଉପରୁପାଇଁ କାହାରେକିମ୍ବିଳ ମାତ୍ରା

ମାତ୍ର କୁଳପତିଙ୍କ ଅଧିକାରୀଙ୍କରେଣ୍ଟ ହେଲାନ୍ତିର ଜ୍ଞାନକାରୀଙ୍କରେ, ଏହା
ଅଭିଭାବିତ ପାଦପଥରେ ଯୁଦ୍ଧକାରୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧକାରୀଙ୍କ
ପାଦପଥରେ ଯୁଦ୍ଧକାରୀଙ୍କ ବାହ୍ୟକାରୀଙ୍କ ପାଦପଥରେ ଯୁଦ୍ଧକାରୀଙ୍କ
ପାଦପଥରେ ଯୁଦ୍ଧକାରୀଙ୍କ ବାହ୍ୟକାରୀଙ୍କ ପାଦପଥରେ ଯୁଦ୍ଧକାରୀଙ୍କ

କୁଳାଳ ରହିଥିଲା ନିରାମିତିଙ୍କ ପିଲାକାଳୀମତ୍ତେ
ପିଲା ଦୂରର ପାହାଦିନିରୀତି ରଖୁଣ କରିବା
ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପିଲା କୁଳାଳ
କାହାରେ ପିଲା ରହିଥିବା ଯାହାରେ ପିଲାକାଳୀମତ୍ତେ
ଫୁଲାଳ କାହାରେ ପିଲାକାଳୀମତ୍ତେ ରହିବାର କାହାରୁଙ୍କ
ଉପରେ ମର୍ଦ୍ଦାଲ୍ପର ରାଜ ଏକିକ ରାଜାକାଳୀମତ୍ତେ

© 2012 SAGE Publications

କୁଳପାତ୍ର ନିରାକାରମାନଙ୍କରେ ପାଦପାଦିକ
ଅନ୍ଧାରିକିମୁଣ୍ଡଲରେ କରାଯାଇଥାଏ ଅନ୍ଧାରିକିମୁଣ୍ଡଲ
କାହାରେ ଛିନ୍ନିବୁ ସମ୍ଭାବିତ ହେଉ ଉପରେକୁ
ନାହାଇବାରେ ବ୍ୟାହାରାବେ. ଆମେହାଜୀବିଜ୍ଞାନୀ
ନିରାକାରମାନଙ୍କରେ ପାଦପାଦିକ ନାହାଇବାରେ
ଅନ୍ଧାରିକିମୁଣ୍ଡଲରେ କରାଯାଇଥାଏ ଅନ୍ଧାରିକିମୁଣ୍ଡଲ
କାହାରେ ଛିନ୍ନିବୁ ସମ୍ଭାବିତ ହେଉ ଉପରେକୁ
ନାହାଇବାରେ ବ୍ୟାହାରାବେ.

നവ്, ജലമലിനീകരണം, വായുമലിനീകരണം, മൺ മലിനീകരണം, ശബ്ദമലിനീകരണം തുടങ്ങിയ ദുരന്തങ്ങൾ ഒള്ളം മനുഷ്യരെ പ്രവർത്തിക്കൂത്തിരുത്തുന്നവയാണ്. എന്നാൽ മറ്റൊരിലൂം മനുഷ്യപ്രവർത്തനങ്ങൾ പരോക്ഷമായി ദുരന്തസാധ്യതയെല്ലാം അതിരെ തീവ്രതയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.

വന്നുവരുന്ന അശാസ്ത്രീയമായ ഭൂവിനിയോഗം, ആർബലപ്രവേശങ്ങളിലെ നിർമ്മാണപ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവ കാരണമായുണ്ടാകുന്ന ഉരുൾപ്പെടുത്തലും വെള്ളപ്പൂക്കവും മനുഷ്യരെ പരോക്ഷപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമാണ്. നിഞ്ചാരുടെ വിടിക്കുന്നയും സ്കൂളിക്കുന്നയും പരിസ്ഥലപ്രവേശങ്ങളിൽ മനുഷ്യപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാണ് സമീപദാവിഭിരിൽ സംഭവിച്ചുക്കാവുന്ന ദുരന്തങ്ങളെ തിരപ്പിരിയാൻ കഴിയുമോ? ഇതിനെന്തെങ്കിലും പരിഹാരമാർജ്ജനങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കാനാകുമോ? മനുഷ്യജന്മമായ ദുരന്തങ്ങളുടെ എല്ലാവും തീവ്രതയും അടുത്ത കാലത്തായി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഇവ തെരുന്നതിനും തീവ്രത കൂറയ്ക്കുന്നതിനുമുള്ള ക്രിയാത്മകമായ ഇടപെടലുകൾ ആവശ്യമാണ്. ദുരന്തങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് വളരെ കുറവും സാധ്യത മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പ്രകൃതിദ്വരിത ലാല്പുകരണത്തിനും നിവാരണത്തിനും മാണ് കൂടുതൽ ഉറന്നൽ നൽകേണ്ടത്. ഇന്ത്യയിലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്�ൂട്ട് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിക്ട് മാനേജ്മെന്റ് സിഗ്പിക്കൽ, 1993-ലെ ബ്രസിലിൽ നിയോജി ജനീറോയിൽ നടന്ന ഒന്മുഖക്കോടി, ജപ്പാനിലെ ഡോക്കോഹാമയിൽ 1994 മെയിൽ നടന്ന അന്താരാഷ്ട്ര ദുരന്തനിവാരണ കോൺഫറൻസ് തുടങ്ങിയവ ഇന്ത്യയിൽ മുന്നിൽക്കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള നടപടികളാണ്.

പ്രകൃതിക്കേശാഭം (Natural Hazards), പ്രകൃതിദ്വരിതം (Natural Disaster) എന്നിവ പലപ്പോഴും ഒരു അർമ്മത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചുകാണാറുണ്ട്. പരിസ്വരം ബന്ധിതമെക്കിലും ഇവ തികച്ചും വൃത്തി നേരം ആണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇവ ഉണ്ടാകുന്നതിനും വേർത്തിരിച്ചു മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ജീവനും സത്തിനും ഭീഷണിയുണ്ടതുന്നതിന്റെ പ്രാപ്തമായ സാഹാരിക പരിസ്വിതിയിൽ ഉല്ലഘക്കുന്ന ചില സാഹചര്യങ്ങളാണ് പ്രകൃതിക്കേശാഭങ്ങൾ (Natural Hazards). ഇവ ഒരു പ്രാത്യുക പരിസ്വിതിയിൽ സറി മായുള്ളതോ അവിചാതിതമായി ഉണ്ടാകുന്നതോ ആയ മാറ്റങ്ങളാകാം. സമുദ്രജലപ്രവാഹങ്ങൾ, കൂതരാനെയുള്ള ചരിവ്, ഹിമാലയത്തിലെ അസാറിമായ ദുപ്രകൃതി, മരുഭൂമിയിലേയും ഹിമാനിപ്രവേശങ്ങളിലേയും അതിതീവ്രമായ കാലാവസ്ഥ തുടങ്ങിയവ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്.

അതേസമയം വളരെ പെട്ടുന്ന സംഭവിക്കുന്നതും ജീവനും സത്തിനും ചുറ്റുപാടിനും സാരമായ നാശം

വിതയ്ക്കുന്നതുമായ പ്രകൃതിപ്രതിഭാസങ്ങളാണ് പ്രകൃതിദ്വരിതങ്ങൾ. വർത്തോതിൽ നാശംവിതയ്ക്കുന്ന ഏതൊരു പ്രതിഭാസത്തെയും ദുരന്തമായി പരിഗണിക്കാം.

ലോകജനതയുടെ അനുഭവങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദുരന്തങ്ങളെ സാമാന്യവൽക്കരിക്കാമെങ്കിലും ഓരോ ദുരന്തവും വ്യത്യസ്തവും താരതമ്യങ്ങൾക്കും താഴുമാണ്. പ്രാദേശിക, സാമൂഹിക-പാരിസ്ഥിതിക ഘടകങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം, അതുകൊണ്ടുനിന്നും സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്വം, ആ ദുരന്തത്തെ എങ്ങനെയാണ് ഓരോ സമൂഹവും സമീക്ഷക്കുന്നത് എന്നതിനെന്നെല്ലാം ആശുപിച്ചു കൊണ്ടുതന്നെ ഓരോ ദുരന്തവും വേറിട്ടരാണ്. എന്നിരുന്നാലും മേരിപ്പൂർണ്ണവും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മുൻ കാര്യങ്ങളാണ്.

തീവ്രതയും വ്യാപ്തിയും ആവുതിയും ദുരന്തങ്ങളുണ്ടാക്കുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങളും ഓരോ വർഷവും വർധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

ദുരന്തങ്ങൾ സൂഷ്ടിക്കുന്ന ആശലാതം ലാല്പുകൾക്കുന്നതിനും ഇതിലും ജനങ്ങളുടെ ജീവനും സത്താവിലുമുണ്ടാകുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനുംവേണ്ട ജാഗ്രത ഇന്ന് ലോകമെമ്പാടും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിരെ മലമായി പ്രകൃതിദ്വരിതങ്ങളെല്ലാം ലാല്പുകൾക്കുന്നതിന് മുക്കാക്കുന്നുണ്ട്.

പ്രകൃതിക്കോഭരതയും പ്രകൃതിദ്വരിതത്തെയും സമീപിക്കുന്ന രീതിയിലും മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് മുമ്പ് പ്രകൃതിക്കോഭരവും പ്രകൃതിദ്വരിവും പരസ്പരബന്ധിതപ്രതിഭാസങ്ങളായിട്ടുന്നു കണക്കിരുന്നത്. പ്രകൃതിക്കോഭരാധ്യതാ പ്രവേശങ്ങൾ പ്രകൃതിദ്വരിതങ്ങൾക്കു കൂടി സാധ്യതയുള്ളതു പ്രവേശങ്ങളും പ്രകൃതിദ്വരിതങ്ങൾക്കുന്ന അന്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആവാസവ്യവസ്ഥയിൽ സത്തുലിതാവസ്ഥകൾ വിജയാതംവരുത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽനിന്ന് മനുഷ്യൻ വിട്ടുനിന്നിരുന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ ദുരന്തങ്ങൾ ആയ വിനാശകാരിയായി രൂപീക്രിച്ചു. എന്നാൽ സാങ്കേതികവിദ്യ മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിക്കുമേൽ കൂടുതൽ ഇടപെടാനുള്ള ശക്തി നൽകി. അതിനാൽ പ്രകൃതിദ്വരിതസാധ്യതാ പ്രവേശങ്ങളിൽപ്പോലും മനുഷ്യൻ തെരെ ഇടപെടലുകളുടെ തീവ്രത വർധിപ്പിച്ചുപോരുന്ന സാഹാരികമായും പ്രകൃതിദ്വരിതങ്ങൾ സാധ്യതയും വർധിച്ചു. നബികളുടെ പ്രളയസമതലങ്ങളിലേയുള്ളതു വ്യാപക ക്രൈസ്തവം, മുൻബന്ധം, ചൈനൈ പോലുള്ള തീരങ്ങൾ വൻകിടഞ്ഞങ്ങളുടെയും തുറമുഖപട്ടണങ്ങളുടെയും വികാസം, ദുർഘടനയിലെ വില വർധന മുലം തീരങ്ങളിൽപ്പോലുമുണ്ടായ കടന്നുകരയ്ക്കും തുടങ്ങിയവ ഇല്ല പ്രവേശങ്ങളിൽ ചുക്കവര്ത്തനകൾ, കൊടുക്കാറുകൾ, സുന്നാമികൾ തുടങ്ങിയവ മുലമുണ്ടാക്കാവുന്ന ദുരന്തങ്ങൾക്കും സാധ്യത വർധിപ്പിച്ചു.

പട്ടിക 7.1-ൽ നൽകിയിട്ടുള്ള ലോകത്തിലെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ 30 വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ സംഭ

പട്ടിക 7.1 - 1948 മുതലുള്ള ഫീല പ്രകൃതിദ്വാരാന്തങ്ങൾ

വർഷം	സ്ഥലം	തരം	മത്തൊം
1948	അംഗവിയർ യുണിയൻ (ഹന്നത്തെ റഷ്യ)	ഭൂക്കമ്പം	110,000
1949	ചെച്ചൻ	വൈള്ളപ്പോക്കം	57,000
1954	ചെച്ചൻ	വൈള്ളപ്പോക്കം	30,000
1965	കിഴക്കൻ പാകിസ്ഥാൻ (ഹന്നത്തെ ബംഗ്ലാദേശ്)	ഉൾഖണ്ടമേഖല ചൂഴലിക്കാറ്റ്	36,000
1968	ഹാറി	ഭൂക്കമ്പം	30,000
1970	ചെറു	ഭൂക്കമ്പം	66,794
1970	കിഴക്കൻ പാകിസ്ഥാൻ (ഹന്നത്തെ ബംഗ്ലാദേശ്)	ഉൾഖണ്ടമേഖല ചൂഴലിക്കാറ്റ്	500,000
1971	ഹാറ്റ്	ഉൾഖണ്ടമേഖല ചൂഴലിക്കാറ്റ്	30,000
1976	ചെച്ചൻ	ഭൂക്കമ്പം	700,000
1990	ഹാറി	ഭൂക്കമ്പം	50,000
2004	ഹഡ്രാനേഷ്യു, ഗ്രീലക്ക, ഹാറ്റ് തുടങ്ങിയവ	സുനാമി	500,000*
2005	പാകിസ്ഥാൻ, ഹാറ്റ്	ഭൂക്കമ്പം	70,000*
2011	ജപ്പാൻ	ഭൂക്കമ്പം	15,842*

അവലോം * യുണൈറ്റഡ് എൻഡീസിഓം ആഫുഡാ (UNESCAP), 1991

നാമാഖ്യം ഇൻസ്റ്റിറ്റ് ഫോർ ഡീസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് വാർത്താവിപ്പോർട്ട്, ഭാരത സർക്കാർ, ന്യൂഡൽഹി

വിച്ച 12 തീവ്യപ്രകൃതിദ്വാരാന്തങ്ങൾ മേൽപ്പറഞ്ഞ നിരീ ക്ഷണങ്ങൾ ശരിവയ്ക്കുന്നതാണ്.

പ്രകൃതി ദ്വാരാനക്കാണ്ട് ജീവിത്വം സ്വത്തിന്റെ വ്യാപകനാശമുണ്ടാകുന്നു എന്നത് പട്ടികയിൽനിന്ന് വ്യക്തമാണ്. ഈ അവസ്ഥയെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതിനായി പലതരത്തിലുള്ള ക്രിയാരഥക്കമായ ഇടപെടലുകൾ സജീവമാണ്. പ്രകൃതിദ്വാരാന്തങ്ങൾക്കാണഡ്വാകുന്ന നാശാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽനിന്നും രാഷ്ട്രീയങ്ങൾക്ക് വ്യക്തിഗതമായി കരകൗണ്ടിക്കുന്ന കൂടുതലുകൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതിനും ആശീര്യമാണ്. ഈ ചിന്തയിൽ നിന്നുമാണ് 1989-ൽ ഏകുദാഷ്ട്രസഭയുടെ ജനറൽ അസംബിയിൽ ഇതു പ്രസ്താവിക്കാൻ ഉത്തരവും അഭിമുഖീകരിക്കാൻ ആശീര്യമാണ്. ഈ ചിന്തയിൽ നിന്നുമാണ് 1994 മെയ് മാസത്തിൽ ജപ്പാനിൽ യോക്കോഹാമയിൽ വച്ച് പ്രകൃതിദ്വാരാ മാനേജ്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്താരാഷ്ട്ര സംഘമാവും നടന്നു. ഇതിനു യോക്കോഹാമ സ്റ്റെറ്റോജി & പ്ലാൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഫോർ എസ്പർ വേർഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

പ്രകൃതിദ്വാരാന്തങ്ങളുടെ വർഗ്ഗീകരണം

ദോക്കത്താകമാനമുള്ള മനുഷ്യർ വ്യത്യസ്തതരം തരിത്ര പ്രകൃതിദ്വാരാന്തങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദുരന്തലാപ്യകരണരീതിയിൽ അഭിമുഖീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദുരന്തങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന തിനായി ഫലപ്രാപ്തവും ശാസ്ത്രീയവുമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ ദുരന്തങ്ങളെ തിനിച്ചുറിയലും അവയുടെ വർഗ്ഗീകരണവും അഭിവാര്യമാണ്. പ്രകൃതിദ്വാരാന്തങ്ങളെ പെട്ടെന്ന് നാലുയിരുന്നിൽക്കൂടി പ്രകൃതിദ്വാരാന്തങ്ങളിൽ എറിയപ്പെടുന്നതു ഒരു രാജ്യമാണ് ഹാറ്റ്. ഓരോ വർഷവും ആയിരക്കണക്കിൽ ജീവഹാസിയും ദശലക്ഷങ്ങളായി രൂപയുടെ മുല്യമുള്ള സ്വത്തുനാശവും പ്രകൃതിക്കോൺജീലും ഹാറ്റുയിലുണ്ടാകുന്നുണ്ട്. പ്രകൃതിദ്വാരാന്തങ്ങളുടെ പ്രക്രിയയിൽ വ്യാപകനാശങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവയെ കുറിച്ചാണ് ഈ പാഠാഗം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്.

പട്ടിക 7.2 - പ്രകൃതിദ്വാരാന്തങ്ങളുടെ വർഗ്ഗീകരണം

അന്തരീക്ഷജന്തു	ഭൂമജന്തു	ജലജന്തു	ജീവജീവന്തു
ഹിമക്കാറ്റ് ഹടകിനിനലാടുകുട്ടിയ മഴ ഹടകിനിനൽ ടൊർണാഡാ ഉൾഖണ്ടമേഖല ചൂഴലിക്കാറ്റ് വരശ്ച ആലിപ്പുമഴ ഹിമം, ഉൾഖണ്ടരംഗം അഭിവാര്യം മുതലായവ	ഭൂക്കമ്പം അംഗവിയർ സംഫോട്ടന ങ്ങൾ ഉൾഖണ്ടപാട്ടൽ അവലാമൈസ് അവലാമൈസ് മല്ലാലിപ്പ്	വൈള്ളപ്പോക്കം അവലിംഗരൂതരംഗം സമുദ്രജലപ്രവാഹം കടലോട്ടു സുനാമി	തിനായിവളരുന്ന സംസ്കാരം സ്വീജാലാജാർ (ബെക്കുകിളി തുടങ്ങിയവ). കീടബാധ- ഫംഗസ്, പക്ഷിപ്പുനി, ബൈക്കി തുടങ്ങിയ ബാക്ടി- റിയ-ബൈറാസ് ജന്മരോഗ ങ്ങൾ

യോക്കോഹാമ സ്റ്റാറ്റിസ്യൂ അതാരഫ്റ്റ പ്രക്രതിസ്വന്തമല്ലെങ്കണ അകവും സ്വരക്ഷിത ലോകത്തിനായുള്ള യോക്കോഹാമ തൃപ്പിവും പ്രവർത്തനവേയും

**(Yokohama Strategy and International Decade for Natural Disaster Reduction (IDNDR)
Yokohama Strategy and Plan of Action for a Safer World)**

ലോക ഉച്ചകാഴ്ചയിൽ പ്രകൃതിയും ലഹരിക്കണ്ണത്തിനായി ഏടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ:

1990-2000 പ്രകൃതിസ്വന്തര ലഭ്യകരണ അക്കമായി കൺവെൻഷൻ പ്രവൃത്തിച്ച് (International Decade for Natural Disaster Reduction (IDNDR))

ഇന്ത്യയിലെ പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങളും പ്രകൃതിക്ഷാമവും

ഭാതികസ്വിശേഷതകളിലും സാമുഹിക-സാംസ്കാരിക സവിശേഷതകളിലും വൈവിധ്യമുള്ള വിസ്തൃതമായ ഭൂപദ്ധണമാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് മുൻപാഠാഗത്ത് പർച്ചു ചെയ്തതാണ്. വിശാലമായ പ്രദേശരേതു പാരിസറിക വൈവിധ്യങ്ങളും സാംസ്കാരിക വൈവിധ്യങ്ങളുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയെ ‘ഉപഭൂവണ്യം’ എന്നും ‘നാനാതത്തിൽ എക്കരു’ പുലർത്തുന്ന നാട് എന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഭൂപദ്ധണ വിശാലതയോ കൊപ്പുംതന്നെ ഇന്ത്യയുടെ റീജി കോളനിരേണ്ടതിന്റെ ഭൂതകാലചത്രത്വം, ഇപ്പോഴും തുടരുന്ന വിവിധതയ്ക്കിലുള്ള സാമുഹിക വിവേചനങ്ങളും, ഉയർന്ന ജനസംഖ്യയുമെല്ലാം പ്രകൃതിദുരന്തത്തിന്റെ സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങളെപ്പറ്റി മഹാസ്ഥാനങ്ങളായ മേരിപ്പുരങ്ങ വസ്തുതകൾ സാറിരിക്കിക്കണ്ണാക്കാം.

ഭൂക്കണ്ടം (Earthquakes)

ണിക് പ്രവർത്തനപരമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഭൂകമ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിനാശകരിയ്ക്കുന്ന വലിയ പ്രദേശത്തെ സ്ഥാപിന്നിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഭൂവർക്കെന്തിൽ ടെക്നോണിക് പ്രവർത്തനപരമായി പെട്ടെന്ന് ഉള്ളിൽജം പൂറി തൊക്കുവരികയും ഉത് പിന്നീട് ഭൂപരാന്തരാളുടെ തുടർച്ചകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ടെക്നോണിക് ഭൂകമ്പങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്നോൾ ഭൂകമ്പത്തോടൊപ്പം തന്നെയുണ്ടാകുന്ന അഗ്നിപർവ്വതസ്ഥലോടും, ഉരുൾപ്പെടുത്തിൾ, ശില്പാത്തരം, വനന്പരദേശങ്ങളിലും അണാക്കെടുകൾക്ക് സമീപത്തുമുള്ള ഉത്പത്തനം എന്നിവ വളരെ കൂറച്ച് പ്രദേശത്ത് മാത്രമേ നാശനാശം മുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്.

ଓରେ ପରିଷ୍ଵେତୁ ରେ ଶୈଳୀମୀର୍ଦ୍ଧ ଏଣ ତୋତିଲେ
ହୃଦୟମହଲକଂ ପଦକୋଟୁଂ ପଦକୁକିଶକ୍ ତିଶ୍ୟ
ଲେଖୁଣ୍ଠ ନୀଜେବେଳେଣ୍ଟୁଂ ପଦକୁଭାଗତତ୍ ଯୁଗେ
ଷ୍ଟୁର୍ମହଲକଂ ହୁଏ ପଲାତତିଳ ତଥରୁମକୁଣ୍ଡବେଳୁଂ
ରଣାମରତ ପାଠତିଲେ ସ୍ଵଚ୍ଛପ୍ରିୟିକ୍ରୂଣ୍ଟ. ଉତିର୍ବେ ପଲ
ମାଯି ହୃଦୟମହଲକଣ୍ଠୁଂ ପରିପ୍ରତ ରେତରୁକିମେପ୍ରକୃତ
ତିରେଣତ୍ରୁଦଳିନ୍ ଉର୍ଦ୍ଧବ ପଲାମରଣାତ୍ମିତ କେବେଇକ
ରିକମେପ୍ରକୁଣ୍ଡ ଉର୍ଦ୍ଧବତିର୍ବେ ହୁଏ ଅଭିରକ୍ଷେତ୍ରକିରଣୀ
ଶିଲାପାତ୍ରିକାତିର୍ବେ ସମ୍ମରମ୍ଭଣାକଣ୍ଟକୁଣ୍ଡ ଉତିର୍ବେ

ഹലമായി ശിലാപാളികൾ പൊതുനിഞ്ചുന്നതോടെ ഉത്തർജ്ജമോചനമുണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നതുകാണാണ് ഹിമാലയത്തിനുകളിൽ ഭൂകമ്പങ്ങൾ സുഷ്ടിക്കുന്നത്. ജമുകാശമീറ്റ്, ഹിമാചൽപ്പറ്റേൾ, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, സിക്കിം, യാർജിലിൻഗ്, പശ്ചിമഖാനാലിലെ ഒരുഭാഗം, ഏഴ് വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ എന്നിവയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും ഭൂകമ്പസാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ.



ചിത്രം 7.1: ഭൂകമ്പമുഖ്യമായ തകർന്ന കെട്ടിടം

ഇന്ത്യകൂടാതെ ഇന്ത്യയിലെ മധ്യ-പട്ടണത്താർ ദാഗത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഗുജറാത്തിലും (1819, 1956, 2001-ലെ ഭൂകമ്പം), മഹാരാഷ്ട്രയിലും (1967, 1993-ലെ ഭൂകമ്പങ്ങൾ) കനത്ത ഭൂകമ്പമാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കംചെന്നതും സ്ഥിരവുമായ ഉപദീപിയും പ്രദേശത്തുണ്ടാകുന്ന ഭൂകമ്പങ്ങളുള്ളിച്ച് വിവരിക്കാൻ ഭൂമശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് ഏറ്റവും വേണ്ടിവന്നു. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ലാത്യൂറിനും ഓസ്മാനബാദിനും സമീപം ഭീമാനി പ്രതിനിധിയാം ചെയ്യുന്ന ഭോഗ്രേവയുടെ ആവിർഭാവവും തുടർന്നുണ്ടായ ഇന്ത്യൻഹലകത്തിന്റെ പൊതുതകരല്ലും ഇന്ന് പ്രദേശത്തെ ഭൂകമ്പത്തിനുള്ള കാരണമായി സമീപകാല ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് ചുണ്ടിക്കാം കുന്നു. (ചിത്രം 7.2)

നാഷണൽ ജീയോഫിസിക്കൽ ലാബോറട്ടറി, ജീയോളജിക്കൽ സർവ്വ ഓഫ് ഇന്ത്യ, ഭാരത സർക്കാരിന്റെ കാലാവസ്ഥാവകുപ്പ്, നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്�ൂട്ട് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിക്ഷൻ മാനേജ്മെന്റ് എന്നിവ കഴിഞ്ഞ നിരവധി വർഷങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയിൽ സംഭവിച്ച 1200-ലധികം ഭൂകമ്പങ്ങളുള്ളിച്ച് വിശകലനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ത്യയെ അഞ്ച് ഭൂകമ്പമേഖലകളാക്കി തംത്തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

- (i) വളരെ ഉയർന്ന വിനാശ സാധ്യതാമേഖല (Very high damage risk zone)
- (ii) ഉയർന്ന വിനാശ സാധ്യതാമേഖല (High damage risk zone)
- (iii) മിതമായ വിനാശ സാധ്യതാമേഖല (Moderate damage risk zone)

iv) കുറവെ വിനാശ സാധ്യതാമേഖല (Low damage risk zone)

v) വളരെ കുറവെ വിനാശ സാധ്യതാമേഖല (Very low damage risk zone)

ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു മേഖലകളിലും അതിനീകരം യൂകമ്പങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ, ദക്ഷിണശ്രീല വടക്കുഭാഗം, ബീഹാറിലെ ഇൻഡ്യോ-നേപ്പാൾ അതിർത്തിയോട് ചേർന്ന അരാറി, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, പടിഞ്ഞാറൻ ഹിമാചൽപ്പറ്റേൾ (യർമഹാലക്ഷ്മി ചുറ്റും), ഹിമാലയത്തിലെ കാർശ്മീരി താഴ്വര, കച്ച് (ഗുജറാത്ത്) എന്നീ പ്രദേശങ്ങൾ ഭൂകമ്പത്തിന് വളരെ ഉയർന്ന സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളാണ് (ചിത്രം 7.2). അതുപോലെ ജമുകാശമീരിയിൽ ബാക്കിഭാഗങ്ങൾ, ഹിമാചൽപ്പറ്റേൾ, വടക്കൻ പഞ്ചാബ്, കിഴക്കൻ ഹരിയാന, ധാരിഹരി, പടിഞ്ഞാറൻ ഉത്തർപ്പറ്റേൾ, വടക്കൻ ബീഹാർ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങൾ ഉയർന്ന വിനാശസാധ്യതയുള്ള മേഖലകളാണ് (High damage risk zone). ഇന്ത്യയുടെ ബാക്കിഭാഗങ്ങൾ മിതമായ വിനാശസാധ്യതമേഖലകളിലോ വളരെകുറവെ വിനാശസാധ്യത അഥവാക്കളിലോ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഡക്കാൻ പീഠഭൂമിപ്രദേശമാണ് ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ സമലമായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത്.

ഭൂകമ്പത്തിന്റെ സാമൂഹിക-പാർശ്വപരിത്വിക പ്രത്യാശാത്മകൾ

യാതൊരു വിവേചനവുമില്ലാതെ ഭൂമുഖത്ത് വിനാശം വ്യാപിപ്പിക്കുന്ന ഭൂകമ്പത്തെ അതിന്റെ തീവ്രതക്കാണ്ടും താരിത സ്ഥാവരംകാണ്ടും വ്യാപ്തിക്കാണ്ടും ഏപ്പോഴും ദിതിയോടെയാണ് മനുഷ്യൻ വീക്ഷിക്കുന്നത്. ഉയർന്ന ജനസാദ്ധ്യതയുള്ള സ്ഥലത്ത് ഭൂകമ്പം സംഭവിക്കുന്നോളാണ് അതൊരു ആരക്കമായി മാറുന്നു.

വാസസ്ഥലങ്ങൾ, കെട്ടിടങ്ങൾ, വ്യവസായശാലകൾ, വാർത്താവിനിമയബന്ധങ്ങൾ, മറ്റ് വികസനപ്രവർത്തന നങ്ങൾ, അടിസ്ഥാനസ്ഥാകര്യങ്ങൾ എന്നിവയുടെ തകർച്ച മാത്രമല്ല ഒരു ഭൂകമ്പംകാണ്ട് സംഭവിക്കുന്നത്. തലമുകളായി സംരക്ഷിപ്പിച്ചവരുന്ന സാമൂഹിക-സാംസ്കാരിക നേട്ടങ്ങൾ കൂടിയാണ് തകർന്ന മണ്ണടിയുന്നത്. ഭൂകമ്പമുഖ്യമായ വൈനാഹിതരാജ്യപ്പെടുന്ന ആയിരങ്ങൾ വികസനരാജ്യങ്ങളിലെ പിന്നാക്കംനിൽക്കുന്ന സമ്പദവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അഭിരുചി സമർദ്ദവും ആലപാതവുമാണ്.

ഭൂകമ്പത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ

വിനാശകരമായ ഫലങ്ങളാണ് ഭൂകമ്പം സംഭവിക്കുന്ന പ്രദേശത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത്. ചിലത് താഴെ കൊടുക്കുന്നു (ചട്ടിക 7.3).




Figure 7.2: Study: Examining the evidence

പട്ടിക 7.3 : ഭൂതനാമങ്ങൾ പദവാദർ		
ഭൂതനാമങ്ങൾ	മനസ്തുന്നിപ്പിൽത്തി കുമ്ഭമണ്ഡലം	ജ്വലനിൽക്കുന്ന മണി
വിളംബുകൾ, വാസനയാദരം ഉരുൾപ്പടച്ചി	ഹോട്ടലുകൾ തെന്തിനിങ്ങൾ തലക്കിഴായി മാറകൾ	തിരുഹാല ജ്വലനമർദ്ദം സുനാമി
ചെളിയായി ഫാറൻ ഭൂതലത്തിലെ സമൂഹം തൃടക്കപലന പദവാദർ	കുട്ടിച്ചുംളി കുകർന്നാടികൾ	തൃടക്കപലന പദവാദർ
	തൃടക്കപലന പദവാദർ	

இதிடையும் கூக்கும் தீர்மானமாலும் நீண்டு
நிதிக்குடும் சூழ்வதற்கும் பாரிசுபிதிக் குறையாலும்
ஓய்வு ஸ்பெஷ்டிக்குடும். கூவத்தைத்திலே உயர்ந்தப்பட்டு
களித் தூக்குவதற்காகச் சூப்பெஷ்டிக்குடும் விழுதுகளுக்குளி
லுடை ஜலவும் மத் பார்மான்தும் மூக்களிலேக்கு உயர்ந்த
வதிக்கும் ஸமீபப்படுவதற்குலேக்கு வழாவிக்கும்கும்
செறுமை உடுத்திவெட்டலிடையும் தூக்கும் காரணமாக்கும்.
இத் தொழிலையும் நாக்களிலையும் சாலைகளிலையும்
ஏதுக்கு தகைப்புடைத்துக்கும் இதிலுடை ஜலாயிரண்டில்
ஒப்புக்கும்கும் செறுமை தூக்குவதையும் சிறப்புகளை
நிதி சிறப்புகள் நடவடிக்கை மானிக்குடும்பத்துப்படியை

ടൈക്കാർഡുരന്ത ലഹരുകരണം **(Earthquake Hazard Mitigation)**

മുട്ട് ദുരന്തങ്ങളെപ്പോലെ ഭൂകമ്പവും വിനാശകരമാണ്. ഗതാഗത-വാർത്താവിനിമയ ബന്ധങ്ങൾ തകരാറിലാവുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ദുരന്തബാധയിൽക്കും യുദ്ധം സമയം രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ നൽകുന്നതിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നു. ഭൂകമ്പത്തെ തടയാനാവില്ല. ഏറ്റവും പ്രധാനമുഴുവൻ ദുരന്തത്തെ നേരിട്ടാൻ ജനത്തെ ഒരുക്കലാം ദുരന്തലാഘകരണവുമാണ്.

- (i) നിരന്തരിക്ഷണത്തിനും ഭൂകമ്പസാധ്യതയും അഗ്രഞ്ജമുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് സൂചിപ്പാനു വിവര അർഹർ നൽകുന്നതിനുമല്ലാതെ ഭൂകമ്പിക്കിഷ്ടങ്ങൾക്ക് ദേശാർഥ (Seismological centres) സഹാപിക്കുക. ടെക്നോണിക് ഫലകങ്ങളുടെ ചലനങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിന് ജ്യുഗ്രഹിക്കൽ പൊസിഷൻ സിസ്റ്റ് (GPS) തിരിക്കേണ്ട സാധ്യത ഉപയോഗപ്പെട്ടു തന്നെ.
 - (ii) ഭൂകമ്പസാധ്യതാപദ്ധതികൾ നിർബന്ധിക്കുകയും ഇത് മുതൽക്കൂടം പ്രദേശങ്ങളും പ്രദേശങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുകയും അവരെ ഭൂകമ്പത്തൊക്കുനിച്ചും ഭൂരിതലാവുകരണപ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുനിച്ചും ബോധവത്കരിക്കുകയും ചെയ്യുക.
 - (iii) ഭൂരിസാധ്യതാ പ്രദേശങ്ങളിൽ വീടുകളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും നിർമ്മാണ മാതൃകകളിൽ

ମାର୍ଗବରୁତ୍ତୁକୁ, ବୁଝୁଣିଲାକେଟିଇଅଳ, ବର୍କି ଚାପୁପରାଯ ସଂରକ୍ଷଣଳ, ବଲିଯ ନରରେଖା ଓ ଏକି ଏକିବ ଲୁହରର ଦୁରତିଶାୟତାପ୍ରଦେ ଶାତ୍ରାତ୍ମିତ ନିର୍ମିକଣ୍ଟ ନିର୍ମାତାଙ୍କରିପ୍ରକୃତ୍ୟାକୁ.

- (iv) ഭൂരണസാധ്യത പ്രക്രിയാളിൽ നിർമ്മാണ അംഗങ്ങൾക്ക് ഭൂകമ്പപ്രതിരോധ മാതൃകകൾ അവ ലംബിക്കുകയും കനംകുറഞ്ഞ നിർമ്മാണ സാമ്പ്രദായികൾ ഉപയോഗവും നിയമപരമായി നിർബന്ധിച്ച് മാറ്റുക.

സുനാമി (Tsunami)

പൊതുവെ ഭൂക്കണ്ടരഹണങ്ങൾ ഒറ്റ ലംബതരംഗമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പക്ഷേ തുടക്കത്തിലെ സമുദ്രജല താഴീസ്ഥി അണം റിഫ്ളൈ അവസ്ഥ തുടർച്ചലുന്നങ്ങളുടെ ഒരു നിരതനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഇതുമൂലമുണ്ടാകുന്ന പ്രക്ഷുഖ പ്രവർത്തനം തിരാശിവാത്തിനും തിരാതകത്തിനും മിടയിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആഘോഷനം ജലനിർപ്പ് പുനരുപയോഗിക്കുന്നതുവരെ തുടരുന്നു.

ജലത്തിന്റെ ആഴത്തിനെ ആശയിച്ചാണ് സമുദ്രജ
ലത്തിലെ തരംഗങ്ങളുടെ വേഗത. സമുദ്രത്താഴ്ചകളിലേ
തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വേഗത ആശം കുറവെന്നെ സമുദ്ര
ഭാഗങ്ങളിലായിരിക്കും. ഇതുകാരണം സുനാമിയുടെ
പ്രത്യോലാത്തങ്ങൾ സമുദ്രത്തിൽക്കൂറവും തീരപ്രദേശ
അള്ളോടടുത്തു എറ്റവും കൂടുതലുമായിരിക്കും. തീര
പ്രദേശത്ത് ഇത് വന്നതോടിൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ക് കാര
ണമാകുന്നു. സമുദ്രത്തിലുള്ള ഒരു കപ്പലിൽ സുനാമി
വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നില്ല. ആഴക്കടലിൽ
സുനാമിയെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാതെപോകുന്നതും
ഇതിനാവാണ്. ആഴക്കടലിൽ സുനാമിയുടെ തരംഗ
വൈദ്യുതി കൂടുതലും തരംഗ ഉന്നതി കുറവുമായിരി
ക്കും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒന്നോരേണ്ടാ മീറ്റ്
ഉയരത്തിൽ മാത്രമെ കപ്പലിൽ തിരുമാലകൾ അടിക്കു
ന്നുണ്ടു്. ഇതുതന്നെ മിനിറ്റുകൾ എടുത്തതിനുശേഷ
മാണ് സംഭവിക്കാനുത്.

എന്നാലിതിന് വിപരീതമായി ആഴം കുറഞ്ഞ ഭാഗ അളവിലേക്ക് സുനാമി പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ തരംഗ ദൈർഘ്യം കുറയുകയും തരംഗത്തി വർധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ചിലപ്പോൾ 15 മീറ്ററോ അതിൽക്കൂടുതലോ ഉയരത്തിലാകാം. തീവ്രപ്രവേശാങ്ഗളിൽ വ്യാപകനാശന ഷട്ടജാർക്ക് മുതാ കുറുത്തിരുമാലകൾ കാരണമാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ആഴംകുറഞ്ഞ ഭാഗങ്ങളിലെ

തിരുമാല എന്നർത്ഥമംവരുന്ന ഷാലോ വാട്ടർ വേവ്സ് (Shallow water waves) എന്നു വിളിക്കുന്നു. പസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ തീ വലയമേഖലയിൽ, പ്രത്യേകിച്ചു് അല്ലാം സ്ക്രാഡ് തീരപ്രദേശങ്ങൾ, ജൗം, ഹിലിപ്പേപ്പൻസ്, തെക്ക്-കിഴക്കനേഷ്യയിലെ മറ്റ് ഭീഷ്മകൾ, തുനോനേ ഷ്യൂ, മലേഷ്യ, മധ്യാഫ്രിക്കൻ, ശ്രീലങ്ക തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലും സുനാമി ഇടയ്ക്കിടെ സംഭവിക്കുന്നു. മുത്തു യിലും സുനാമിയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.



ചിത്രം 7.3 : സുനാമിബാധിത്ത്വദേശം

ତୀର୍ପେଣେଶେତରତତ୍ତ୍ଵାନ୍ ସ୍ଥାନାମି ତରହଙ୍ଗରେ ଆବ୍ୟିତ ସାଂକେତିକପ୍ଲେଟିକ୍‌ରୁଷ ବଲିଯ ଉତ୍ତରଜଗତ ପ୍ରାଚୀତ ଜ୍ଞାନତୋରେ ଜଳଂ ଡୀକରମାଯ ଆବଶ୍ୟକିତ ତୀର୍ପେଣେଶ ଅନୁଭବକିମ୍ବାକୁ କର୍ଯ୍ୟାନ୍ ତୀର୍ପେଣେଶରୁ ତ୍ୟାଗମ୍ୟବ ତେର୍ଯ୍ୟାନ୍ ପରିଣାମରେତ୍ତୁରୁ କେନ୍ଦ୍ରିତଙ୍କରେତ୍ତୁରୁ ତକରିକୁ କର୍ଯ୍ୟାନ୍ ଚେତ୍ୟୁଣ୍ୟ. ଲୋକତାକମାନମୁକ୍ତ ତୀର୍ପେଣେଶ ଏବଂ ଉତ୍ସର୍ଗ ଅନୁସଂବ୍ୟାଧିତ୍ୱରୁ ବର୍ଣ୍ଣତୋତିରେ ମନୁଷ୍ୟ ହିତପରିଲ୍ୟକର୍ତ୍ତ ନାକକୁଣ ପରେଶାଣାତ୍ୟମାଣୀ ଏକାତିକାରୀ ତୀର୍ପେଣେଶଙ୍କର୍ତ୍ତ ମରେତ୍ ପ୍ରକୃତିଭୂର ନରତକାଳୀନ କ୍ଷୁଦ୍ରତରେ ଜୀବିଷକାନ୍ତିରୁ ସପତ୍ତୀନ ଷ୍ଟର୍ଵ୍ୟା ଉତ୍ସର୍ଗକୁଣର ସ୍ଥାନାମିକିତୁଣ୍ୟ. ବେଳେ ଅଛେ ଯିତି (ଲୁଣୋନେଷ୍ୟ) ସାଂଖ୍ୟିତ୍ୱ ସ୍ଥାନାମିତ୍ୟତତିରେ ଯୁଧାପତି କାଣିମିକୁଣ ଚିତ୍ରଙ୍କାଶ ଭୁମିଶାଳୀଙ୍କରତତିରେ ପ୍ରାକ୍ତିକରେ ଫୁଲ୍ଲତକାରିତିର (Part I - NCERT) କାଣ୍ଠି ଛିଟ୍ଟିଣକ. ଲୁତିତିକିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନାମିକର ସ୍ପଷ୍ଟକିମୁଣ୍ଡ ନାଶନଷ୍ଟଙ୍କରୁଣ ଯୁଧାପତି ମନ୍ତ୍ରୀଲାକାରୀଙ୍କାନାଙ୍କ.

വുപ്പകനാശനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ടു തന്നെ മറ്റ് പ്രക്രിയയിൽനിന്നും നേരിട്ടുന്ന ലാഘവ തന്നോടെ സൃഷ്ടാമിരയ നേരിട്ടാവില്ല. ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന് എറ്റക്ക് നേരിട്ടാവുന്നതിലുമ്പൂരുമാണിത്. മുന്ന് ലക്ഷ താഴിയിക്കം ജീവനെടുത്ത 2004 ഡിസംബർ 26 ന് സംഭവിച്ച സൃഷ്ടാമിരയ നേരിട്ടരിതിയിൽ അന്താരാഷ്ട്രതല താഴിലുള്ള സാധ്യക്കത്തായ തുടർപ്പലുകളുണ്ട് സൃഷ്ടാമിരയ നേരിട്ടുന്നതിന് ആവശ്യം. 2004-ലെ സൃഷ്ടാമിദ്വൈ തയ്യാറിന്നുണ്ടോ അന്താരാഷ്ട്ര സൃഷ്ടാമി മുന്നറയില്ല

പദ്ധതിയിൽ (International Tsunami Warning System) ഉള്ളതും അംഗമാണ്.

ഉഷ്ണമേഖലാ പ്രക്രിയകൾ (Tropical Cyclone)

30° വടക്ക്, 30° തെക്ക് അക്ഷാംശങ്ങൾക്കിടയിൽ
അന്തരീക്ഷത്തിൽ രൂപംകൊള്ളുന്ന അതിശക്തമായ
നൃസ്ഥിതിയോടു കൂടി ഉഷ്ണമേഖലാ ചക്രവാത്
ഞാൻ. ഇവിടെ അതിശക്തമായ കാറ്റുകൾ വീശുന്നു.
തിരഞ്ഞീറൽ താഴ്വരയിൽ 500 മുതൽ 1000 കിലോമീറ്റർ വാദിലൂപ്പം ലഭിക്കുന്നതിൽ ദുരിതം എന്നു
ഒരു പാടം
12 മുതൽ 14 കിലോമീറ്റർ വരെയും തുടർച്ചയായി വൃഥാപിച്ചുകാ
ണാറുണ്ട്. സമുദ്രങ്ങൾക്കും കടലുകൾക്കും മുകളിലൂടെ
സംബന്ധിക്കുന്നുണ്ട് കാറ്റ് ആഗ്രഹിക്കാനു ചെയ്യുന്ന മൂലപ്പൂ
ശനിഭാവിക്കുന്നതിലൂടെ സ്വതന്ത്രമാകുന്ന ലൈന്
താപമാണ് ഉഷ്ണമേഖലാ ചക്രവാതഞാൻ അപിവാ
ഹരിക്കേരയന്നുകൾ (Hurricanes) കു പ്രവർത്തന ഉണ്ടാണ്.
ഉഷ്ണമേഖലാ ചക്രവാതഞാൻ അപിവാ
കാരണം സംഖ്യയിൽ ശാസ്ത്രപരമായ മുടയിൽ
വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.
ഉഷ്ണമേഖലാ ചക്രവാതഞാൻ രൂപംകൊള്ളുന്നതിന്
ആവശ്യമായ ചില സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് ചുവടെ:


- (i) വൻതോതിൽ ലീന്റഹം സ്വത്ത്രമാക്കാൻ കഴിയുന്ന മൂലമുപ്പുംനിറങ്ങേ ഉൾപ്പെടെയുവിന്റെ തുടർച്ചയായ ലഭ്യത.
 - (ii) നൃസ്ഥാന്തരം വായുക്കാണ്ഡു നിറയുന്നതിനെ തന്ത്യുന്ന ശക്തമായ കൊറിയോലിന് ബലം (ആമധ്യാദിവൈദ്യക്ക് സമീപം കൊറിയോലിന് ബലം തന്നിരുന്നു അഭാവം ദുർഘടം എന്നുള്ളതു അക്ഷാംശങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ വലാചക്രവാതഞ്ചാളുടെ രൂപീകരണത്തെ തന്ത്യുന്നു)
 - (iii) പ്രാദേശിക അസ്ഥാനമതകൾക്കു ചുറ്റുമായി ചക്രവാഹം വികാസം പ്രാപിക്കുന്ന ട്രോഫോസ്പിയറിലെ അസ്ഥിര സാഹചര്യങ്ങൾ
 - (iv) ശക്തമായ വായുപ്രവാഹങ്ങളുടെ അഭാവംമുലം ലീന്റഹാപത്രിന്റെ കുത്തനെയുള്ള വ്യാപനത്തെ തന്ത്സപ്തടുത്തുന്ന സാഹചര്യം

ഉഷ്ണമേഖലാചക്രവാതങ്ങളുടെ ഫലനം

(Structure of Tropical Cyclone)

வலிய மஞ்சளிவாள் உச்சனமேவுப்பகுவாடை ஆக ஈவிஷேஷத் தெனுள்ள ஆக்காஸ்வீர பொறுவை உச்சனவையு உழக்குமாய நூகமந்தமாயிரிக்கூங பகு வாதத்தின்றி கேட்டுக்கொண்டு. முதினை பகுவாதக்கண்ட் (Eye of the storm) என்று விழிக்கண்டு.

പൊതുവെ സമമര്ത്തവൈകളുടെ അടക്കത്തായുള്ള സഹംഗം ഉയർന്ന മർദ്ദപരിവിനെ സൃച്ചിപ്പിക്കുന്നു. സാധാരണഗതിയിൽ തുടർന്ന് 100 കിലോമീറ്റർ ദൂരം 14 - 17 മില്ലിബാർ വരെയായിരിക്കും. എന്നാൽ ചില സമയങ്ങളിൽ തുടർന്ന് 60 മില്ലിബാർ/100 കി.മീ. വരെയായി ഉയരരാജാണ്.



കാർ വിസുഗാ മേഖല ചുക്കവാതമ്പയ്യമുത്തിനും 10
മുതൽ 15 കിലോമീറ്റർ വ്യാപ്തിയിൽവരെ ആകാശം.
ഇന്നുവരിലെ ട്രഷ്ടണമേഖലംചുക്കവാതമേള്ളു
സാമുകളും പിരംബം

உபயிப்பு முறையுடன் கிடைக்கும்யான்தையில் எண்ணால் உத்திரவும் படினொரு சமயத்தை என்று பிரயாத சமயம் என்றிலும் முறையில் உத்திரவும் படிவுத்தையைச் சூபங்களுடையது. இதே படிவுத்தையைத் 10' முதல் 15' வரை வகுக்க வேண்டுமென்றாலோயின் நீர்மாநால்கூட உண்ணால் முனைக்கும்போதைகிலூம் சமயம் ஒத்திரவும் மூல பொழுதுவ கீர்த்தனை, நாவங்கள் மூலமாகிலும் சூபங்களுடையது. முதிரை மூல 92' கிடங்களே வேலாமல் விடிர் படினொருத்தை 10' முதல் 20' வரை வகுக்க வேண்டுமென்றாலோயின் சூபங்களுடையது. ஆகவே மூலமாக மூட வேண்டுமென்றும் உணவு பிரயாத 10' கிடங்கள் அவையும் விடிர் படினொருத்தை 10' வகுக்க வேண்டுமென்றாலோயின் சூபங்களுடையது என்றும் விடிர் வைத்துப்போதையைச் சொன்னு, பதிக 7.4 முறை யிலூ படிவுத்தைக்காரணமாகிலும் மதியூம் காலங்கு நினைவு நினைவு நிறைவேண்டுமோ.

പരീക്ഷ 7.4 : ഇന്ത്യൻ കൂർഷികളുടെ വിവരങ്ങൾ

காலாந்தூர்	விரும்பு இடங்கள்	காலாந்தூர்
காஷாவி	4 (1.3)*	2 (2.4)
குப்பியங்கி	1 (0.3)	0 (0.0)
காஷி	4 (1.30)	0 (0.0)
நெடுங்கிளி	18 (5.7)	5 (6.1)
ஈழை	28 (8.9)	13 (15.9)
ஏஞ்சாலி	34 (10.8)	13 (15.9)
ஏஞ்சாலி	38 (12.1)	3 (3.7)
ஏஞ்சாலி	25 (8.0)	1 (1.2)
ஏஞ்சாலோஙி	27 (8.6)	4 (4.8)
ஏஞ்சாலோஙி	53 (16.9)	17 (20.7)
ஏஞ்சாலோஙி	56 (17.8)	21 (25.6)
ஏஞ்சாலோஙி	26 (8.3)	3 (3.7)
ஏஞ்சாலோஙி	314 (100)	82 (100)

* මෙයින් සාම්පූහ්‍ය තෙකුණුකළුව යොමු කිරීමේ නිසු පෙනෙන මෙහෙයුම් මෙහෙයුම් මෙහෙයුම් මෙහෙයුම්

இங்காமேவாய்க்குவட்டுத்தோறுதை
புதியாலுக்குப்


கிடைவதற்கு வருமானம் படித்துக்கொண்டுள்ள முனையுக்கட திருப்பகுதிகளில் கடுகாட்சியானத். தான் நூல்யானதானால் காலி நினைவுப்போன் கடவுள்களின் நடவடிக்கையை.

കു, കുൻ, വായി എന്നിവയുടെ പാഠപ്രക്രിയയോളം മലയാളം കുവാറ്റ് (Kuvar) ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ വളരെ ഉത്തമം നിരവധി കർമ്മപരിപാലി സ്ഥാപിക്കുന്നതു പ്രമേയം ആക്രൂക്കി എന്നിവയുടെ ഉപാധിയുള്ള ഏകദാനം ഭാഷാ ഗൃഹിക്കുവാനു പാലക്കാട്ടാജി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. കുന്നു മാ, തൊക്കു കാട് എന്നിവയാണോപ്പു കുവാറ്റപ്രകാരം മലയാളത്തു മാറ്റപ്രകാരമാണ്.

രബ്രാഹ്മഗംഡക്കണ്ണ



Figure 7.5 : سیاست‌گذاری اقتصادی و این‌چهار راه برای کنترل اقتصادی



Фигура 7.6 – Сърцево-съдовата система

നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന കനത്ത മഴ, മണ്ണതുരുകൾ, മൺഡി ലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ജലത്തിന്റെ കുറവ്, മണ്ണാലിപ്പ് തുട അന്തരവരെയും വെള്ളപ്പുകാം ഉണ്ടാക്കുന്നു. ലോക തത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇടയ്ക്കിടെ വെള്ളപ്പുകാം സംഭവിക്കുകയും കനത്ത നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തെക്ക്, തെക്കുകിഴക്കൻ, കിഴക്കൻ ഷൂൾ രാജ്യങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ചു ചെതന, ഇന്ത്യ, ബംഗ്ലാ ദേശ എന്നിവിടങ്ങളിൽ കനത്ത നാശംവിതയ്ക്കുന്ന വെള്ളപ്പുകാംങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്.

മറ്റ് പ്രകൃതിദ്വാരംജാളിൽനിന്നും വൃത്യുന്നതമായി പ്രധാനമായും മനുഷ്യരെ പ്രവർത്തിന്നാണ് വെള്ളപ്പുകാംത്തിന്റെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന അതിന്റെ വ്യാപനത്തിനും കാരണമാകുന്നത്. വന്നാണോക്കരാം, അശാന്തതയായ കുഷിരിതികൾ, സ്വാഭാവിക നീരെഞ്ചുകളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന തക്കുങ്ങൾ, നിന്തേരിങ്ങളും പ്രളയമാർത്തലങ്ങളും കയ്യേറി പാർപ്പിടിക്കുന്നും മറ്റ് നിർമ്മാണപ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തുന്നതുമെല്ലാം വെള്ളപ്പുകാംത്തിന്റെ തീവ്രതയും വ്യാപ്തിയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.

ഇടയ്ക്കിടെയുണ്ടാക്കുന്ന വെള്ളപ്പുകാം കാരണം ഇന്ത്യയിലെ വിവിധസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ജീവത്തും സ്വത്തിനും കനത്ത നാശമാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. “രാഷ്ട്രീയ ബാധ ആയോഹ്” (ദേശീയ വെള്ളപ്പുകാംകമ്മീഷൻ) രാജ്യത്ത് 40 ദശലക്ഷം ഹെക്ടർപ്പരേശം പ്രളയബാധിപ്പരേശമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചിത്രം 7.6-ൽ രാജ്യത്തെ വെള്ളപ്പുകാം ബാധിതപ്രദേശങ്ങളെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. അസൂഡ, പശ്ചിമബഹാർ, ബിഹാർ എന്നിവയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രളയബാധിതമായ സംസാരങ്ങൾ. ഈ കൂടാരതെ ഉത്തരവേ തുറന്ന് സംസാരങ്ങളിലെ പ്രത്യേകിച്ച് പഞ്ചാബ്, ഉത്തർപ്പരേശ് എന്നിവിടങ്ങളിലും ഒഴുകുന്ന മിക്ക വാറും നദികളും ഇടയ്ക്കിടെയുള്ള വെള്ളപ്പുകാംത്തിന് സാധ്യത കൂടുതലുള്ളതുവരുണ്ട്. മിനിസ്പ്ലാഫ്ലോഡ (Flash flood) കാരണം കഴിഞ്ഞ പതിറ്റാണ്ടുകളായി രാജി സ്ഥാൻ, ഗുജറാത്, ഹരിയാന, പഞ്ചാബ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നിരവധി പ്രദേശങ്ങൾ വെള്ളപ്പുകാംത്തിനിരീക്കിയാവുന്നു. മൺസൂണിൽ മഴയിലെ ഏറ്റുകൂറപ്പിലുകളും നദികളുടെയും അരുവികളുടെയും സ്വാഭാവിക ഒഴുക്കിനെ തടഞ്ഞുനിർത്തുന്ന മനുഷ്യരെ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളുമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വെള്ളപ്പുകാംത്തിന് കാരണം. മൺസൂണിന്റെ പിൻവാങ്ങരികാലത്ത് നവംബർ-ജനുവരി മാസങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിലും വെള്ളപ്പുകാംമുണ്ടാക്കാറുണ്ട്.

വെള്ളപ്പുകാംത്തിന്റെ അനന്തരപ്രലാഭങ്ങളും വെള്ളപ്പുകാം നിയന്ത്രണവും


അസൂഡ, പശ്ചിമബഹാർ, ബിഹാർ, കിഴക്കൻ ഉത്തർപ്പരേശ് (പ്രളയനിക്കൽ), കൈസയുടെ തീരപ്രദേശം, ആസ്സാപ്രദേശം, തമിഴ്നാട്, ഗുജറാത് (ചട്ടവാ

രം), പഞ്ചാബ്, രാജസ്ഥാൻ, വടക്കൻ ഗുജറാത്, ഹരിയാന (മിനാർപ്പള്ളം) എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇടയ്ക്കിടെയുണ്ടാക്കുന്ന വെള്ളപ്പുകാം കാരണം കുഷിസംബന്ധങ്ങളും വാസസ്ഥലങ്ങളും വെള്ളത്തിനീളിലൊരു നൂറ്റാം ഗുരുത്വരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളാണ് ദേശീയസ്ഥലങ്ങൾ വുകയും വ്യവസ്ഥയിലും സമൃദ്ധതയിലും ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഓരോ വർഷവും വിലപിടിപ്പുള്ള കാർഷികവിളകൾ മാത്രമല്ല വെള്ളപ്പുകാം കാരണം നശിക്കുന്നത്. ഓഡ്, റെയിൽ, പാലങ്ങൾ, വാസസ്ഥലങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഭൗതികാടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്കും ദുരിച്ചുണ്ട്. ഓരോവർഷവും പ്രളയം ഫലാക്ഷണം മായ പൊടിമൺ (silt) കുഷിയിടങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു. ബേഹമപ്പുതന്ത്രിയുടെ വാർഷികപ്രളയത്തിനുശേഷം മികച്ച നെല്ലുംപുാദനം നടക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദീജന്തുവിപായ മജുലി (അസാ) ഇതിന് ഏറ്റവും നല്ല ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ. വൻതോതിലുള്ള നാശനഷ്ടങ്ങളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നേണ്ട ഇവ നേട്ടം ആവാനമാണ്.

ഓരോ വർഷവും പ്രളയമുണ്ടാക്കുന്ന ഭീഷണിയെ കുറിച്ച് ഇന്ത്യാരാജ്യവും സംസാരഭരണകൂടങ്ങളും തീർത്തും ബോധവാന്നരാണ്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഭരണകൂടങ്ങൾ പൊതുവേ വെള്ളപ്പുകാംതോട് പ്രതികരിക്കുന്നത്? പ്രളയബാധിതപ്രദേശങ്ങളിൽ പ്രളയസംരക്ഷണത്തിനിക്കൽ നിർമ്മിക്കുക, അണക്കെട്ടുകൾ നിർമ്മിക്കുക, വനവൽക്കരണം, പ്രളയമുണ്ടാക്കുന്ന നദികളുടെ ഉയർന്ന ഘട്ടത്തിൽ നിർമ്മാണപ്രവർത്തനങ്ങൾ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുക തുടങ്ങിയ നടപടികൾ അടിയന്തരപ്രായത്തിൽ ഏറ്റവും കയ്യേറുങ്ങൾ ഒഴിപ്പിക്കൽ, പ്രളയസമതല പ്രദേശങ്ങളിൽനിന്ന് ജനങ്ങളെ ഒഴിപ്പിക്കൽ എന്നിവ ഇന്ത്യമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് ഇടപെടലുകളാണ്. മിനാർപ്പള്ളം അസൂഡപ്പെടുന്ന രാജ്യത്തിന്റെ പട്ടണങ്ങൾ, വടക്ക് ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ചു ഇത് സാധ്യവുമാണ്. തീരപ്രദേശങ്ങളിലെ ചട്ടവാത നിരീക്ഷണക്കേരിങ്ങൾ കടലേറ്റത്തിന്റെ ആഘാതതാം മാലൂക്കരിക്കാൻ സന്നദ്ധമാക്കണം.

വരഷച്ചുകൾ (Droughts)

മഴയുടെ അപര്യാപ്തത, അമിതവാഷ്പീകരണം, ഭൂഗർഭജലമടക്കം ജലഭ്രംഗാതസ്യകളിലെ ജലത്തിന്റെ അമിത ഉപയോഗം എന്നിവകാരണം സാധ്യരണ



கீழ்க்கண்ட பிரச்சினைகளுக்காக விடையளிப்பாரா?



Digitized by srujanika@gmail.com

ஸ்ரீவைந்திரன் வரலாற்றுக்கு முன்னால் உள்ளத்தோடு இப்பு சமயம்பிரபுவுடைய வாழ்வைப் பற்றி வாணிக்கும்போது உடலும் கல்லாறு.

காலாவாயை வீரத்தெய்க்காடு என்றால், கால-களில் காலாய், கால-களில்கொடி-காலாய், காலாய், கூறுவதை முறைப்பு, சுங்காடு-தூஷாவிடவாற்காக, காலிலி தீவால், மாதுக்கூழூ ஏதுவாறிருக்கான் பழங்காலி நூற்றுவில்லை, சுங்காடு-சுங்காநாலைப்பெற்று வாய்ப், மூக்காநாலையிட சுங்காவாழு ஏதுவாக்கால காலாலை துங்காநாலையா பாக்கிரீதமாக கால பூநி வாய்வான் வாய்த்து.

വിവിധത്തിനു വകുപ്പുകൾ

காலாபாசுவம் வகீப்பு (Metereological Drought): காலாபாசுவம் என்ற காலாபாசு வகீப்பை நூற்று முதல் மின்சாலங்களில் கருதும் நூற்று காலாபாசுவம் வகீப்பு என்று அழைக்கப்படுகிறது.

கால்கிளைத்துப்பு (Agricultural Drought): முனிவெ
ஸ்டீல்க் குறைபாடுகளைப் பூர்த்தி விடுவதற்காக, விடு
கால்கிளைத்துப்பு என்று விடுகின்றன. விடு
கால்கிளைத்துப்பு என்றால் குறைபாடுகளை
குறைவான் முனிவெஸ்டீல்களைப் பூர்த்தி விடுவதைக் குறிக்கின்றது. விடுகால்கிளைத்துப்பு என்றால் குறை
வாட்டும்பாடு முறையைக் குறைத்துமுலை விடுகின்ற
கால்கிளைத்துப்பு என்று விடுகின்றது. விடுகால்கிளைத்துப்பு என்றால் குறை
வாட்டும்பாடு முறையைக் குறைத்துமுலை விடுகின்றது.

എക്യോളാഗിക്കൽ ഡ്രൗട്ട് (Ecological Drought):

അംഗീകാരം നൽകിയാൽ അവന്തിയാണ് പാലമ്പാടി സംബന്ധിക്കുന്നത്.

ଭ୍ରାତୁମୁଖ ପିଲିଯାନାନ୍ଦୀର କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଯାଇ ଓ ନାହିଁ ଏହାର ପାଇଁ
ପିଲିଯାନା ଭ୍ରାତୁମୁଖ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଯାଇଲେ ଏହାର ପାଇଁ
ପିଲିଯାନା ଭ୍ରାତୁମୁଖ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଯାଇଲେ ଏହାର ପାଇଁ

കൂട്ടുകയിലെ വകുപ്പിലുണ്ടായുതാ പ്രദേശങ്ങൾ

അനിശ്ചയവല്ലത്തു നാട്യത്വപരമായ (Extreme Drought Affected Areas): കാര്യമാനിക്കേ ആശാഹം-പ്രദശങ്ങളും പ്രദ്യുമിക്ക് അവധിക്കുന്നകളുടെ വരീ-സാഹിത്യ പ്രകാശഭാവം, മുന്താലി, മാനുഷാനിലെ കൃപാ-പ്രദശങ്ങൾ എന്നിവ മൂല വികാസാന്വയിക്കുന്നതു പിന്തും 7.8-ൽ ദിനർ വ്യക്തമാണ്. വാർഷിക ഗാഡിൽ ഒരു ദിന വിവരിച്ചിട്ടും നാട്യാഭാസം മനുഷ്യൻ മരുപ്പിൽനിന്നും സംരക്ഷിക്കാൻ, സാമ്പത്തിക ആവശ്യകതയാണ്.

துக்கவானில் செய்திதழுதல் நிலம் (Severe Drought Prone Area): கிழக்கு இங்஗ாராங்கி நிலமாக, முழுப்புதலைக்கு வழிகாலாப்படியானால், கூறுவதற்கு முக்கிய கிழக்காங்கி நிலமாக, ஆறுபாலைகளில் உபரிமை நிலம், கந்தோக்காப்பிரினால், தலித்தாலில் வருதல் உபரிமை நிலம், மொஷவளமிலை தெருக்களாகவும், வெளிமுதல் உபரிமை நிலம் என்று கூறுகிறோம்.

ମିଥ୍ୟାକାରୀତିପ୍ରଭାସରେତର (Moderate Drought Affected Area): ରାଜ୍ୟାଳୋଦ୍ଧର୍ମ ବନ୍ଦର୍ମିଳାରେ
କାର୍ଯ୍ୟ, ପାନିରେ, ଉତ୍ତରପ୍ରାଚୀନରେ ଏବଂ ଶିଖିତରେ କ୍ଷେତ୍ରରେ,
ଶୁଭଗାନ୍ଧିରେ ବ୍ୟାଲିଙ୍ଗରେ, କାକଣରେ ଓ କିମ୍ବା
ଯୁଦ୍ଧ ମହାକାଶରେ, ଶ୍ୟାମପାତାମ୍, ଅଶ୍ଵିନୀପ୍ରିଯାଲେ ଏବଂ
ବାନନ୍ଦରେ ପିଠାରୀ, କର୍ମନାକର୍ମରେ ଉତ୍ସବରେ ଏବଂ
ଫୁଲାପାଇଁ ହାତ ପିଲାବାନରେ ଉତ୍ସବରେ ହାତ୍ୟାହୃଦ
ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତରେ କୌଣସିରେ ବନ୍ଦିପ୍ରକାଶରେ ଏବଂ
ଶାକଲୁହାରେ ବନ୍ଦିପ୍ରକାଶରେ କୃତିକାରୀ ପ୍ରଭାସରେ ଏବଂ
ଅନ୍ୟାନ୍ୟରେ।

വയസ്സ് പ്രധാന അനുഭവങ്ങളോട്

പാരിസ്വന്ത്രിക്കും നമ്മുടായിന്തും വാൻപ്രഹ്യന്റെ
ക്ഷേമ പ്രത്യോഗിക്കുന്നതുവരെ തിരഞ്ഞെടുക്കാണ്. വിദ്യുതം, തുക്കുക്കാശത്തിനുമുക്കും (ബാക്കാർ), കാവിത്താറു തുക്കാശത്തിനുമുക്കും (ക്രീക്കാർ), അപ്പരൂപത്തുമുള്ള ഒരു അക്കാദമിനുമുക്കും (അൺകാർ) എത്തില്ലോ. മുഖ്യം മുന്നോട്ടുവരുന്നതിന്റെയും സ്വഭാവായ അക്കാർ (ക്രീക്കാർ) ഏറ്റവും വിനാശകരമാണ്. കാഞ്ചകാലിക്ക്രമങ്ങൾ മുഖ്യം മുന്നോട്ടുവരുന്നതും വാൻപ്രഹ്യന്റെയും കാണാം. ദൈർഘ്യം എന്തിലും വളർത്തുവും ഗണ്യമായും കൂടിവരുന്നു ഫ്രാൻസ് വാൻപ്രഹ്യന്റെ പ്രധാനമായും ദൈർഘ്യം F-200; അക്കാദമി വാൻപ്രഹ്യനു ഉപയോഗിക്കാണ് കാണുന്ന നിർവ്വാസ്ത്വരഹിതമാണ് ഒരു ദൈർഘ്യം, മാറ്റപ്രകാരം, ഉദ്ദേശ്യം മാറ്റുവാൻ കാണുന്നതും ഒരു ദൈർഘ്യം പുനരുപയോഗിക്കാണ്.

காலாட்சி-உடனிக் புரோட்டெஸ்டில் ஹைசெதிஸ்வ
காலாட்சிலியூட் பிரைவேகமைத் தமிழ்நாள் வகுப்பு
ஒன்று உணவாகப்படுகின்றன. அதைகாலன் இதிகாலம்
குடி பறிமளிப்புகளில்களை வசீப்புத் தொடர்பாக
நூல்பூதானபவளிகள் உடனடிகளான். ஶுவகாலி
காலனானினாட்சு காலாட்சி, வசீப்புகாலியினால்
நூன் விடுவதோ, காருகாலிகளின் காலாட்சியை
வெட்டுவதோ, ஏற்கங்கிடத்தால் நயவான் கூடுகிறதையும்
நூல்பூதையும் முடித்தொன்றிப்புகளை துடன்னிடவ வது
ஏனென்று நெண்ண ஒருபொருள்க்குள்ளான். ஆகை
லாங்கோ (Aquifers) எனிலும் குப்பனிலியூட் இலை
நூலி நிலப்பிரிவுக், நிலைப் பயிக்கொண்டு நால்
நூலிக்கும் காலாட்சியைகளைக் கொடுக்கப்படுக்,
நீரிழுப்பையை பயன்கிடுக் கூடியாக்கும் கண்ணல்
ஒத்து நிர்விகூக் குடாக்கியைகளுக்கிட்டு சூல்வூலி
நூலாப்பிள்ளைகளுக்க் கிழவானாலையை உபரி-
பிரதைத்து ஒப்புக்கூடிப்புக்கால் நிலக்குடும் நூல்கள்
காலனாயுதக்குடும் ஜூலைக்கூடியும் நிலப்பிரிவானு
நூலிலை.

வாய்மூலப்பாரிசுவை விழுக்காட்டுக்களுடைய அமைப்பு முறையை வடியஷ்ட் கலைஞர்களை ஏதிலோவை பூர்வீகரணம் ஆகிறார்ஜனங்கள் திரிவூக்காட்டுவின் வழி படி

ലാലുക്കരമ്പത്തിനായി നടപ്പാവുന്ന മാർഗ്ഗങ്ങൾ. വലശപ്പയുടെ ഒരു ലഭ്യതാ കൂറയ്ക്കുന്നതിന് മാറ്റവേദി രഹാധിനിം പലപ്പോഴും ദിനില്ലാൻ.

କାନ୍ଦିଗ୍ରେ ପ୍ରମାଣନ୍ତ ହେଲାଏବା କାନ୍ଦିଗ୍ରେ
ପାଇଁ ଯାଇଲେବୁଥା ହେଲାଏବା ଯାଇଲେବୁଥାରେ
କାନ୍ଦିଗ୍ରେକୁ ଦୂର କାନ୍ଦିଗ୍ରେ ଯାଇପାରାଯାଏ
କାନ୍ଦିଗ୍ରେରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହେଲାଏବା କାନ୍ଦିଗ୍ରେ

ഉറ്റുപിണ്ടാട്ടൽ (Landslides)

ପ୍ରଦୀପରେଣିମହାନ୍ତବ ବାଯକାଳେମାତ୍ର ତଥାକୁଳପ୍ରତିଷ୍ଠାନି
ରାଜକୁଳିମୟୁଁ ରାଜକୁଳାଙ୍କ ଲାଭିଲେବା ରାଜକିଳି ଯାଏଁ
କୁଳୁଁ ବିଶାଖାକୁଳାଙ୍କରିଙ୍କ ଲାଭିଲେବାକିମ୍ବା ତଥାକୁଳପ୍ର
କୁଳିଲୋକଙ୍କିମ୍ବୁଳାଙ୍କରାଜୁଙ୍କ ବାରିକାଳେ ରାଜିଲେ
ଏହିମୟୁଁରାଜକୁଳିମୟୁଁ ବାଯିପ୍ରକୃତିରେବା ଉତ୍ସବରେବା
ଭୂତିରେ କାଳେବା ବାନ୍ଧିଲେବା ପରିଚ୍ଛାନ୍ତରେ ତଥାକି ଗାନ୍ଧୀ
ଗାନ୍ଧୀରେ ଉତ୍ସବରେବାରି.

କୁଳମୂଳ, ଦୟାରାଜୀ, ଅଶ୍ଵପିଲିବାନୀରୁଥିବାରେ, ଏହିକି
ବାବାଙ୍ମ ଗ୍ର୍ୟାନ୍ଟ୍‌ରେଫାର୍ମେସନ୍‌ରୁ ଉପରେ କରାଯାଇଲୁଛିଲୁବୁ
ଉତ୍ତରପିଲିବାନ୍‌ରୁ (ପାର୍କ୍‌ମ୍ୟୁନିଚିଲିଙ୍ଗ୍ ଓ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଶବ୍ଦରେଖାବାବାମ
ରୀତିରୁ ଗ୍ର୍ୟାନ୍ଟ୍‌ରେଫାର୍ମେସନ୍‌ରୁ ଉପରେ ଉପରେକଣ୍ଠା
ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାକରଣରେ ଉପରେକଣ୍ଠାରୁ ପ୍ରମାଣାର୍ଥମାତ୍ର ଲୁହ ବାବାଙ୍ମ
ରେଫାର୍ମେସନ୍‌ରୁ ସାମନ୍ଦିରଗ୍ର୍ୟାନ୍ଟ୍‌ରୁ ପ୍ରମାଣାର୍ଥମାତ୍ର ବାବାଙ୍ମ
ବାବାଙ୍ମରେ ଫେରିପାଇ ଆପିନ୍‌କିନ୍‌ରେତ୍ରରୁଥିବାରେ, ଏହାରେ
ଉତ୍ତରପିଲିବାନ୍‌ରୁ ତାକୁମୁଖୁ ପାର୍କ୍‌ମ୍ୟୁନିଚିଲିଙ୍ଗ୍‌ରୁଥିବାରେ ତାକୁ
କୋରିବାରେ, ଆତ୍ମକାରୀଗ୍ର୍ୟାନ୍ଟ୍‌ରୁ ବିବରିବାରେବେଳାବୁ
ଉତ୍ତରପିଲିବାନ୍‌ରୁରେ କାମ୍ପାର୍ଟମେନ୍‌ଟ୍ ପାର୍କ୍‌ମ୍ୟୁନିଚିଲିଙ୍ଗ୍‌ରୁଥିବାରେ ତାକୁରେ
କାମ୍ପାର୍ଟମେନ୍‌ଟ୍ ପାର୍କ୍‌ମ୍ୟୁନିଚିଲିଙ୍ଗ୍‌ରୁଥିବାରେ ଏହିବାରେତ୍ରରୁ
ବାବାଙ୍ମ



வினாக்கள் 7.9 : இந்துக் கலைகளை

ആൻപദമാക്കിയും മുൻകാല അനുഭവങ്ങളുടെയും ഉരുൾപ്പെട്ടിരുന്ന ആവർത്തനതയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലും ഇന്ത്യയെ വിവിധ ഫോറേജുകളായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഉരുൾപ്പെട്ടിടൽ - ദുർബലമേഖലകൾ (Landslide Vulnerability Zones)

വളരെ ഉയർന്ന ദുർബലമേഖല (Very High Vulnerability Zone): അങ്ങനെയറ്റം അസാധികരിക്കുന്ന പ്രായംകുറത്തെ ഹിമാലായപർവതപ്രദേശങ്ങൾ, ആൻഡിമാൻ നികോഓബാർ ദീപുകൾ, കുതാന ചതിവും ഉയർന്ന മഴലഭിക്കുന്നതുമായ പശ്ചിമാലാട്ടു, നീലഗിരി, വടക്കുകിഴക്കൻ ഫോറേജുകൾ, തുകർച്ചുയായി ഭൂചലനു അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫോറേജുകൾ എന്നിവിടങ്ങളും വ്യാപകമായി മനുഷ്യൻ നിർമ്മാണപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളും, പ്രത്യേകിച്ചു റോഡ്, അണക്കെട്ട് നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങളും ഈ ഫോറേജുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ഉയർന്ന ദുർബലമേഖല (High Vulnerability Zone): വളരെ ഉയർന്ന സാധ്യതാമേഖലകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങളുടെ ഏകദേശരാം അന്തേ അവസ്ഥയാണ് ഈ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലും കാണുന്നത്. ഉരുൾപ്പെട്ടലുണ്ടാക്കുന്ന ഘടകങ്ങളുടെ തീവ്രത, ആവൃത്തി എന്നിവയിലുള്ള വ്യത്യാസം മുതൽമാണ് ഈ രണ്ട് ഫോറേജുകൾ തമിലുള്ളത്. എല്ലാ ഹിമാലയൻ സംസ്ഥാനങ്ങളും, അസം സമതലം ഒഴികെയ്യുള്ള എല്ലാ വടക്കുകിഴക്കൻ പ്രദേശങ്ങളും ഈ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നു.

ഉരുൾപ്പെട്ടിടൽ സാധ്യത നിരോധനയോ ആയ ഫോറേജുകൾ (Moderate to Low Vulnerability Zone): കുറവു തോതിൽ മഴലഭിക്കുന്ന ട്രാൻസ്-ഹിമാലയൻപ്രദേശങ്ങളായ ലഡാക്ക്, സ്വിറ്റി (ഹിമാചൽപ്രദേശം), ഉയർച്ചതാഴ്ചകളുള്ളതുമുണ്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ, അരാവലി, പശ്ചിമ ഘട്ടത്തിലെയും പുർവ്വലാട്ടത്തിലെയും മഛനിൽപ്പെടെ ശങ്കൾ, ധക്കാൻ പീഠഭൂമി തുടങ്ങിയ സാലങ്ങളിലും ഇടയ്ക്കിടുന്ന ഉരുൾപ്പെട്ടിടൽ സംഭവക്കുന്നു. വനവും അവതലനവും (subsidence) കാരണം ത്യാർവണ്ണ, ദശിഷ, ചരതീനിന്റെ, മധ്യപ്രദേശ്, മഹാരാഷ്ട്ര, ആന്ധ്യാപദാർ, കർണ്ണാടക, തമിഴ്നാട്, ശ്രീവ., കേരളം എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഉരുൾപ്പെട്ടിടൽ സാധ്യതാബന്ധം വരുന്നു.

മറ്റൊപ്പോരേജുകൾ: ഇന്ത്യയുടെ മറ്റൊരുണ്ടാക്കുന്ന ദുർബലങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ചു രാജസ്ഥാൻ, ഹരിയാന, ഉത്തർപ്രദേശ്, ബീഹാർ, പഞ്ചിമബാംഗാർ (ഡാർജിലിംഗ് ജില്ല ഒഴികെ), അസാം (കാർബി ആഞ്ചലാൻ ജില്ല ഒഴികെ) ദക്ഷിണതൈപ്പൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ തീരപ്രദേശങ്ങൾ എന്നിവ ഉരുൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് സുരക്ഷിതമേ ഫോറേജും.

ഉരുൾപ്പെട്ടിടലിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങൾ

പ്രാദേശികമായുള്ളതും താരതമ്യേന ചെറുതുമായ സംബന്ധിക്കുന്ന ഉരുൾപ്പെട്ടിടലിനു കാരണമാകുന്നത് എന്നാൽ റോഡ് തെസ്തുപ്പെട്ടുക, റെയിൽവേലെ നുകളുടെ തകർച്ച, ശിലാപിച്ചചയത്തുടർന്ന് നീരെല്ല ശുക്ക് തെസ്തുപ്പെട്ടുക എന്നിവ ദുരവൃഥാപകപ്പത്തുംാലുതെ ഔർക്ക് കാരണമാകുന്നു. ഉരുൾപ്പെട്ടിടലിനെ തുടർന്നുള്ള നിന്തകളുടെ ശത്രിമാറ്റം പ്രായത്തിന് കാരണമാവുകയും ജീവനും സത്തിനും നാശം വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾ തമിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ തെസ്തുപ്പെടുന്നതും, അപകടസാധ്യതയുടെ ചെലവും ചെലവേറുന്നതും ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെ വികസനപ്രവർത്തനങ്ങളെ ദോഷകരമായി വായിക്കുന്നു.

ലഭ്യകരണം

ഉരുൾപ്പെട്ടലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രാദേശികനുസൂത്രപരിഹാരനിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. റോഡ്, അണക്കെട്ട് തുടങ്ങിയ നിർമ്മാണപ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും വികസനപ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും നിയന്ത്രണം, മിതമായ ചരിവുകൾവരെ മാത്രം കൂഷി പരിമിതപ്പെടുത്തുക, ഉയർന്ന അപകട സാധ്യതാ ഫോറേജുകൾ വരുത്തുകയും നിയന്ത്രണം തുടങ്ങിയവ പ്രധാനമാണ്. തുടിനോടൊപ്പം വനവർക്കരണം ഫലത്തി വ്യാപകമാക്കുകയും ജലത്തിന്റെ ശുക്ക് കുറയ്ക്കുന്നതിനായി തകയണിക്കിരിക്കുന്നങ്ങളും നടത്തണം. രൂപീംഗൾ (ബെൽചൂട്ട് കൂഷി) ഇല്ലോഴും നിലനിൽക്കുന്ന വടക്കുകിഴക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ തട്ടകൂഷി (Terrace Farming) പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെണ്ണം.

ബുരനനിവാരണം (Disaster Management)

ചട്ടവാതം മുലമുണ്ടാക്കുന്ന ദുർബലങ്ങൾപോലെയല്ല ആക്കന്ന, സുന്നമി, അശ്വിപരിവർത്തനപ്പോടനും ഏന്നിവ വമുലമുണ്ടാക്കുന്നത്. ഈ ഉണ്ടാകുന്ന സമയവും സാലവും കുടുതൽ പ്രവചിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സഹായത്താൽ ചട്ടവാതാളുടെ സംഭാവന, തീവ്രത, ഗതി, വ്യാപ്തി എന്നിവ നിരീക്ഷിക്കാനും ഇന്ന് ചട്ടവാതദുരന്തങ്ങളെ തരണം ചെയ്യുന്നതിന് സാധ്യക്കുന്നുണ്ട്. ചട്ടവാത ഷഡ്ട്രൂകൾ നിർമ്മിക്കുക, മൺതിട്ട് നിർമ്മാണം, ചിറകട്ടുക (dykes), സംഭരണികളും വനവർക്കരണവും തുടങ്ങിയവ കാറ്റിന്റെ വേഗത കുറക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതോടൊപ്പം ദുരന്തങ്ങളുടെ തീവ്രതയും കുറയ്ക്കുന്നു. ഇന്ത്യ, ബംഗാളാഡേശ്, മ്യാൻമാർ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലെ തുകർച്ചുയായിട്ടുള്ള കൊടുക്കാറുകളിൽപ്പെട്ട് ഏറെ പേരുകൾ ജീവനും സത്തിനും ഹാനി സംഭവിക്കുന്നതും അപകടസാധ്യതാ ഫോറേജുങ്ങളുടെ തീരുമാനിപ്പാർക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്.

**ദുരന്തവാദം ബിൽ - 2005
(Disaster Management Bill, 2005)**

പ്രകൃതിദത്തമോ മനുഷ്യനിർമ്മിതമോ ആയ കാരണങ്ങൾക്കാണ് സംഭവിക്കുന്ന ഏതൊരു അത്യാഹിതവും നിർഭ്യാഗ്രഹിച്ചും അവ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഏത് പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ദുരന്തവും കൊടുവായിരുന്നു നാണ്ട് 2005-ലെ ദുരന്തവാദം ബിൽ ദുരന്തങ്ങളെ നിർവ്വചിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപൂർത്തിക്കൾത്തോടു കൂടി അപൂർത്തിക്കൾ സംഭവിക്കുന്നവും പാരിസ്ഥിതിക തകർച്ചയും സംഭവിക്കുന്നവും, അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ വ്യാപ്തിയാണ് കഴിയുന്നതിനുമ്പുംവുംഖായിരിക്കും.

ഉപസംഹാരം

മുകളിലൂടെ ചർച്ചകളിൽനിന്ന് ദുരന്തങ്ങൾ പ്രകൃതിദത്തമായോ, മനുഷ്യ ഇടപെടൽ മൂലമോ ആണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. എല്ലാ പ്രകൃതിക്കോണങ്ങളും ദുരന്തങ്ങളാണെങ്കിൽ, പ്രത്യേകിച്ചു പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങളെ ഒഴിവാക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇവിടെ ദുരന്തങ്ങളുടെ ലഭ്യത്വം സാവധാനം മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുമാണ് വേണ്ടത്. മുന്ന് ഘട്ടങ്ങളാണ് ദുരന്തവാദം നിന്നും ലഭ്യകരണത്തിനും വേണ്ടത്.

(i) ദുരന്തപൂർവ്വവനിവാദം (Pre-disaster Management): ദുരന്തങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ വേണ്ടത്. മുന്ന് ഘട്ടങ്ങളാണ് ദുരന്തവാദം നിന്നും ലഭ്യകരണത്തിനും വേണ്ടത്.

കൂകുക എന്നതുമാണ്. കുടാതെ ദുരന്തവാദം ആസൃതം, തയാറാട്ടുള്ള പ്രതിരോധം എന്നിവയാണ് സാധ്യതാമേഖലയിൽ എടുക്കേണ്ട മറ്റ് നടപടികൾ.

- (ii) ദുരന്തസമയത്ത് (During Disaster): രക്ഷാ-ദുരിതാശാലാസ്ഥാപനം പ്രധാനപ്പെട്ടത്. ഇന്ന് ദുരന്ത സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒഴിപ്പിക്കുക, ദുരിതാശാലക്കൂദാശയുള്ള ദുരന്തം അഭ്യന്തരിക്കാൻ ശേഷി കൈവരിക്കാൻ പ്രാപ്തരാക്കുന്നതിനും ശേഖരിക്കാനും ദുരന്താന്തരം ലഭ്യമാക്കുക.
- (iii) ദുരന്താന്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ (Post-disaster Operations): ദുരന്താശയിതര പുനരധിവസ്തിപ്പിക്കുകയും കാണാതായാവര കണ്ണടത്തുകയുംചെയ്യുക എന്നതാണ്. ഭാവിയിൽ ഉണ്ടായെങ്കാബുന്ന ദുരന്തം അഭ്യന്തരിച്ചുള്ള പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ശേഷി കൈവരിക്കാൻ പ്രാപ്തരാക്കുന്നതിനും ശേഖരിക്കാനും ദുരന്താന്തരം ലഭ്യമാക്കുക.

മുന്നിൽഡിക്ക് ദുപ്രദേശവും അതുതന്നെന്ന ജനസംഖ്യയും ദുരന്തസാധ്യതാ മേഖലകളിലാണ് എന്നതുകൊംബുതന്നെ ഇന്ത്യയെപ്പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഉത്തരത്തിലുള്ള ദുരന്തനിവാരണ നടപടികൾക്ക് പ്രത്യേക പ്രാധാന്യമുണ്ട്. 2005-ലെ ദുരന്തവാദം ബിൽ, അശീയ ദുരന്ത നിവാരണ ഇൻസ്റ്റിറ്യൂട്ട് എന്നിവ ഈ മേഖലയിൽ ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റിന്റെ ക്രിയാത്മകമായ ഇടപെടലുകൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ്.

ചോദ്യങ്ങൾ



1. താഴെക്കാടുത്തിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ശരിയായ ഉത്തരം തെരഞ്ഞെടുത്താണെന്നുള്ളതുക്.
 - (i) ഇടയ്ക്കിരെ പ്രളയം സംഭവിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമെന്ത്?
 - (a) ബിഹാർ
 - (b) പശ്ചിമബംഗാൾ
 - (c) ആസ്സാം
 - (d) ഉത്തർപ്രദേശ്
 - (ii) മാർപ്പ ഉരുൾപ്പെടുത്തി ഉത്തരാവണ്ണിലെ ഏത് ജില്ലയിലാണ് നടന്നത്?
 - (a) ഓറോവർ
 - (b) ചെന്നാൻ
 - (c) അൽമോറ
 - (d) വിനേതാറാൻ
 - (iii) ചെന്തുമാസങ്ങളിൽ പ്രാളും അനുഭവപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം ഏത്?
 - (a) ആസ്സാം
 - (b) പശ്ചിമബംഗാൾ
 - (c) കേരളം
 - (d) തമിഴ്നാട്
 - (iv) മജൂലി നദീജന്തുപിപ്പ് ഏത് നദിയിലാണ്?
 - (a) ശംഗ
 - (b) ശ്രീഹമ്പ്പുത്ര
 - (c) ശോദാവി
 - (d) സിന്ധു
 - (v) ഹിമകാട്ട് (ബീസാർഡ്) ഏത് പ്രകൃതിദുരന്തവിലാഗത്തിലാണ് പെടുന്നത്?
 - (a) അന്റാർക്കിഷണ്ട്ര
 - (b) ജലജന്യം
 - (c) ഭാമജന്യം
 - (d) ജൈവദുരന്തങ്ങൾ

2. താഴെ പറയുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് 30 വാക്കിൽ ഉത്തരമെഴുതുക.
- എപ്പോഴാണ് ഒരു പ്രകൃതിക്കൊള്ളാം ഒരു ദൂരത്തായി മാറുന്നത്?
 - പിമാലയത്തിലും വടക്കുകിഴക്കൻ മേഖലയിലും എന്തുകൊണ്ടും കുടുതൽ ഭൂകമ്പങ്ങൾ അനുബവിച്ചുന്നത്?
 - ചുക്കവാതം മുച്ചപ്പെടുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാന അടക്കങ്ങൾ എന്തെല്ലാം?
 - കിഴക്കൻ ഇന്ത്യയിലെ പ്രാഥമ്യജീവികൾക്കിന് പടിഞ്ഞാറൻ ഇന്ത്യയിലെ പ്രാഥമ്യങ്ങൾ എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
 - ഇന്ത്യയുടെ മധ്യഭാഗങ്ങളിലും പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗങ്ങളിലും എന്തുകൊണ്ടും കുടുതൽ വരൾച്ച അനുഭവപ്പെടുന്നത്?
3. താഴെ പറയുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് 125 വാക്കിൽ കുടാതെ ഉത്തരമെഴുതുക.
- ഇന്ത്യയിലെ ഉത്തരവൈദിക്കൽമേഖല തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഇതിശേഷ കാരണങ്ങളും ദൂരതലയുകൾ മാർത്തങ്ങളും നിർദ്ദേശിക്കുക.
 - എന്താണ് ദുർബലപദ്ധതിങ്ങൾ? ഇന്ത്യയിലെ വരൾച്ചാപ്രകൃതിയുടെ ദുർബലമേഖലകളെ തുറന്നിരിച്ച് വരൾച്ചാ ലാല്യുകരണാത്മകനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്തുകും?
 - വികസനപ്രവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ദൂരത്തെക്കുറഞ്ഞ കാരണമാകുന്നത്?

പദ്ധതി/പ്രവർത്തനം

താഴെക്കാടുത്തിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളിലേക്കെതക്കിലും കമ്മീറേറ്റുന്നതിലും ഫോജക്ക് റിപ്പോർട്ട് തയാറാക്കുക.

- | | |
|---------------------------------------|--|
| (i) മാർപ്പ ഉത്തരവൈദിക്കൽ | (v) തെഹർതി അസാക്കേട്ട്/സർവ്വാർ സാരോവർ |
| (ii) സുന്നാൾ | (vi) ദുഃഖി/ലാതത്തുർ ദൂകമ്പങ്ങൾ |
| (iii) ദയിപ്പ, ഗുജറാത്ത് ചുക്കവാതാങ്ങൾ | (vii) ദയൻറ്റാപ്രദേശങ്ങൾ ജീവിതം/നദീജന്തുവിപ്പ |
| (iv) നദീസംരക്ഷണം | (viii) മെരിക്കുര മഴവെള്ളക്കായ്ക്കാഞ്ഞിശേഷ മാതൃക തയാറാക്കുക |

കേരളം



സംസ്ഥാനത്തിൽ, അവധിക്ക നിയമനാദിക്ഷാമംഗൾ, വിജ്ഞാപ്യം ആയും, വിജ്ഞാപ്യം നിലനിൽക്കുന്നവർ

ക്രെഡിറ്റ് നം.	സ്ഥാനത്തിൽ	അവധിക്ഷാമംഗൾ	വിജ്ഞാപ്യം ആയും എണ്ണം	വിജ്ഞാപ്യം നിലനിൽക്കുന്നവർ (ചിത്രം)	കൊതുക്കൽ
1.	കേരളസംസ്ഥാനിന്മാൻ**	കേരളസംസ്ഥാനിന്മാൻ	23	2,75,045	8,45,80,777
2.	കേരളസംസ്ഥാനിന്മാൻ	കേരളസംസ്ഥാനിന്മാൻ	16	83,743	13,83,727
3.	കോട്ട	കോട്ട	27	78,436	3,12,05,576
4.	കോട്ട	കോട്ട	38	94,163	10,40,99,452
5.	കോട്ടിന്മാൻ	കോട്ടിന്മാൻ	18	1,33,192	2,55,45,198
6.	കോട്ട	കോട്ട	2	3,702	14,38,543
7.	കുമാരാഭ്യർഷി	കുമാരാഭ്യർഷി	26	1,96,244	6,04,39,692
8.	കുമാരാഭ്യർഷി	കുമാരാഭ്യർഷി	21	44,212	2,53,51,462
9.	കുമാരാഭ്യർഷി	കുമാരാഭ്യർഷി	12	55,673	68,64,602
10.	കുമാരാഭ്യർഷി	കുമാരാഭ്യർഷി	15	2,22,236	1,25,41,302
11.	കുമാരാഭ്യർഷി	കുമാരാഭ്യർഷി	24	79,716	3,29,88,134
12.	കുമാരാഭ്യർഷി	കുമാരാഭ്യർഷി	30	1,91,791	6,10,95,297
13.	കുമാരാഭ്യർഷി	കുമാരാഭ്യർഷി	14	38,852	3,34,06,601
14.	കുമാരാഭ്യർഷി	കുമാരാഭ്യർഷി	50	3,08,252	7,26,26,806
15.	കുമാരാഭ്യർഷി	കുമാരാഭ്യർഷി	35	3,07,713	11,23,74,333
16.	കുമാരാഭ്യർഷി	കുമാരാഭ്യർഷി	9	22,327	28,55,794
17.	കുമാരാഭ്യർഷി	കുമാരാഭ്യർഷി	7	22,429	29,66,889
18.	കുമാരാഭ്യർഷി	കുമാരാഭ്യർഷി	8	21,081	10,97,206
19.	കുമാരാഭ്യർഷി	കുമാരാഭ്യർഷി	11	16,579	19,78,502
20.	കുമാരാഭ്യർഷി	കുമാരാഭ്യർഷി	30	1,55,707	4,19,74,218
21.	കുമാരാഭ്യർഷി	കുമാരാഭ്യർഷി	29	50,362	2,77,43,338
22.	കുമാരാഭ്യർഷി	കുമാരാഭ്യർഷി	33	3,42,239	6,85,48,437
23.	കുമാരാഭ്യർഷി	കുമാരാഭ്യർഷി	4	7,096	6,10,577
24.	കുമാരാഭ്യർഷി	കുമാരാഭ്യർഷി	32	1,30,060	7,21,47,030
25.	കുമാരാഭ്യർഷി	കുമാരാഭ്യർഷി	5	10,486	36,73,917
26.	കുമാരാഭ്യർഷി	കുമാരാഭ്യർഷി	13	53,483	1,00,86,292
27.	കുമാരാഭ്യർഷി	കുമാരാഭ്യർഷി	71	2,40,928	19,98,12,341
28.	കുമാരാഭ്യർഷി	കുമാരാഭ്യർഷി	19	88,752	9,12,76,113

Source: <http://india.gov.in> as on 02.11.17

* Census 2011

**കുമാരാഭ്യർഷി: കേരളസംസ്ഥാനിന്മാൻ സംബന്ധിച്ച കുമാരാഭ്യർഷി സംബന്ധിച്ച കുമാരാഭ്യർഷി സംബന്ധിച്ച കുമാരാഭ്യർഷി

കേരളം



കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മന്ദിരങ്ങൾ തന്നെ സ്ഥലങ്ങൾ, വിനാറ്റിക്കേണ്ട അവസ്ഥയ്

ക്രമ നം	സ്ഥലനാമം	ജില്ലാ നാമം	ഭാഗ്യകര്ത്താ സ്ഥലം	വിനാറ്റിക്കേണ്ട ഫോൺ	ബന്ധംപെട്ട
1.	ആദിമധ്യാധി & കാർഷികവകുടി വീഡ്യുലി	കൊച്ചി വൈദ്യുതി	3	8,249	3,80,581
2.	കാർഷികവകുടി	കാർഷികവകുടി	1	114	10,55,450
3.	കാർഷിക മാന്ദാ	കാർഷികവകുടി	1	491	3,43,709
4.	കാർഷിക & വൈദ്യു	കാർഷികവകുടി	2	112	2,43,247
5.	NCT മാന്ദാ	കാർഷികവകുടി	9	1,483	1,67,87,941
6.	കാർഷികവകുടി	കാർഷികവകുടി	1	32	64,471
7.	പിംഗൽപുരി	പിംഗൽപുരി	4	492	12,47,953

Source: <http://maha.gov.in> on 02.11.17

* Census 2011

കോഡുകൾ

III

നേരപ്പെടുത്തണമെന്നതോടു

ക്രമ സဉ.	നേരപ്പെടുത്തണമെന്നതോടു അനുസരിച്ച് ഉപയർ	നേരപ്പെടുത്തണമെന്നതോടു (ആഗ്രഹിയോടും സ്വന്തമായി)
1	സിനാ (സാമ്പത്തികവാദം)	73.31
2	(a) റാബറ് (b) ട്രാൻസ്ഫോർമർ, എഞ്ചിനീയർ, എഞ്ചിനീയർ	525.02 585.60
3	ശൈലാധികാരി	110.54
4	കുമ്ഹാര	78.12
5	കാമ്പാനി	21.36
6	രബ്ലോറ്റ്	6.32
7	ഷാന്തിപ്പാളി, റബ്ലോറ്റുമുഖ്യമായ കൗൺസിൽക്കു നിന്മിക്കുന്ന കാമ്പാനിയോടും അടിശീൽ	92.51
8	സബ്സൈറ്റേഴ്സ് കാപ്പിടിക്കുന്നതിനും ഏലപ്പെട്ട കാമ്പാനിയോടും അടിശീൽ നിന്മിക്കുന്ന	16.46
9	മാപ്പാടി	66.88
10	ശൈലാധികാരിയും ഒപ്പുവെച്ചായിരുന്നു	28.48
11	സുഖവിഭാഗം	12.17
12	സാമ്പാദി	3.81
13	ഘാർ	11.02
14	കുപ്പിലോറ്റ് പരിപാലനാഭാഗ്രഹിക്കുന്ന നിലിക്കുന്ന കുപ്പി, സാമ്പാദി എന്നിവയും മാറ്റിക്കു	15.10
15	ത്രാജ്	45.64
16	ഘാർപ്പാടി	14.88
17	സാ-പണി വൃത്താം അല്ലാവാനയുള്ള പരിപാലനാഭാഗ്രഹിക്കുന്ന നിലിക്കുന്ന	87.41
18	ഗുട്ടി മുതൽ കാപ്പിടിക്കുന്നതും പരിപാലനാഭാഗ്രഹിക്കുന്ന നിലിക്കുന്ന	113.53
19	ബാക്കുനാൾ മാറ്റുമെന്നും ഉദ്ദീഷ്ടാം ദീര്ഘകാലം മാറ്റുമെന്നും (പ്രകാരം വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്)	N.E.G
20	സബ്സൈറ്റേഴ്സ്, മുതൽമാർ നിന്നുന്നിരിക്കുന്നുമെന്നും കുപ്പി നിലിക്കുന്നുമെന്നും	31.00
ആകെ		1869.35

Source: <http://mowr.gov.in> on 02/11/17

കേരളം

IV

മുന്തിരാ/ഭാഗം കൈമകാളിപ്പാലിക്കുട്ടു്, മനോഹരത്തു്
(വിവർജ്ജിപ്പണം, പ്രശ്നാ വിഭാഗം ശൃംഗം)

സ്വന്തമാര്പ്പണം/ കൈമകാളിപ്പാലി	ഭൂമിപ്പയറ്റൽ	2013-ലെ കാനക്കാലി (മനോഹരത്തു്)			
		അനുബന്ധ	സാമ്പത്തിക ഉദ്ദേശ്യം	മൊത്തം	ഭൂമി
അനുബന്ധം*	273,069	330	26,979	19,187	46,116
അനുബന്ധം/ഭാഗം	83,743	20,828	31,414	15,079	67,321
ഒന്നാം	78,438	1,444	11,345	14,882	27,671
ഒന്നാം	94,163	247	3,380	3,664	7,291
മാനന്തിരം	135,191	4,193	34,865	16,603	55,621
മാനന്തിരം	1,483	6,76	49,38	123,67	179,81
അനുബന്ധം	3,702	543	385	1,091	2,219
അനുബന്ധം	196,022	376	5,220	9,057	14,653
അനുബന്ധം	44,212	27	453	1,106	1,586
അനുബന്ധം/ഭാഗം	53,673	3,224	6,381	5,078	14,683
അനുബന്ധം/ഭാഗം	222,236	4,140	8,760	9,538	22,538
അനുബന്ധം	79,714	2,387	9,667	11,219	23,473
കുടുംബക്ക	191,791	1,777	20,179	14,176	36,132
കുടുംബക്ക	38,863	1,329	9,401	6,992	17,922
അനുബന്ധം	308,245	6,632	34,921	35,960	77,522
അനുബന്ധം	307,713	8,720	20,770	21,142	50,632
അനുബന്ധം	22,327	728	6,094	10,168	16,990
അനുബന്ധം	22,429	449	9,689	7,130	17,288
അനുബന്ധം	21,081	138	5,900	13,015	19,054
അനുബന്ധം	16,579	1,298	4,736	7,010	13,044
അനുബന്ധം	155,707	7,042	21,298	22,007	50,347
അനുബന്ധം	50,362	0	736	1,036	1,772
അനുബന്ധം	342,239	72	4,424	11,590	16,086
അനുബന്ധം	7,096	500	2,161	697	3,358
അനുബന്ധം	130,058	2,948	10,199	10,597	23,844
അനുബന്ധം	10,486	109	4,641	3,116	7,866
അനുബന്ധം	240,928	1,623	4,550	8,176	14,349
അനുബന്ധം	53,483	4,785	14,111	5,612	24,508
അനുബന്ധം	88,752	2,971	4,146	9,688	16,805
അനുബന്ധം & ഒന്നാം					
അനുബന്ധം	8,249	3,754	2,413	544	6,711
അനുബന്ധം	114	1,36	9,66	6,24	17,26
അനുബന്ധം & ഒന്നാം	491	0	114	99	213
അനുബന്ധം & ഒന്നാം	12	0	1,87	7,4	9,27
അനുബന്ധം	32	0	17,18	9,88	27,06
അനുബന്ധം	480	0	35,23	14,83	50,06
മൊത്തം	3,287,263	83,502	3,18,745	2,95,651	6,97,898

Source: India State of Forest Report, 2013

*Note: Telangana became the 29th state of India in June 2014.

കേരളം,

V

മൊത്തത്തിൽ നാലു വർഷത്തിലെ മുഴുവൻ സ്ഥലത്തോട് അനുസരിച്ചുള്ള കുറവുകൾ

ക്രെഡിറ്റ് നം.	സ്ഥലത്തോട് അനുസരിച്ചുള്ളുള്ള പുനരുപയോഗം	ബഹുമാനപ്പെട്ട വ്യാപാരം	വന്മാരിയിൽ സ്ഥലത്തോട് അനുസരിച്ചുള്ളുള്ള കുറവുകൾ	സ്ഥലത്തോട് അനുസരിച്ചുള്ളുള്ള കുറവുകൾ	സ്ഥലത്തോട് അനുസരിച്ചുള്ളുള്ള കുറവുകൾ
1.	മുന്തിരിപ്പാട്ട്	0	21	0	0
2.	മുന്തിരിപ്പാട്ട്	2	11	0	0
3.	മുന്തിരി	5	18	0	0
4.	മുന്തിരി	1	12	0	0
5.	മുന്തിരിപ്പാട്ട്	3	11	0	0
6.	മുന്തിരി	1	6	0	0
7.	മുന്തിരിപ്പാട്ട്	4	23	1	0
8.	മുന്തിരി	2	8	3	0
9.	മുന്തിരിപ്പാട്ട്	5	32	3	0
10.	മുന്തിരിപ്പാട്ട്	4	15	33	0
11.	മുന്തിരിപ്പാട്ട്	1	11	0	0
12.	മുന്തിരി	5	27	8	1
13.	മുന്തിരി	6	17	0	1
14.	മുന്തിരിപ്പാട്ട്	9	25	0	0
15.	മുന്തിരിപ്പാട്ട്	6	37	2	0
16.	മുന്തിരി	1	3	0	0
17.	മുന്തിരി	2	3	0	0
18.	മുന്തിരി	2	8	0	22
19.	മുന്തിരി	1	3	0	0
20.	മുന്തിരി	2	18	0	0
21.	മുന്തിരി	0	13	1	2
22.	മുന്തിരി	5	25	10	0
23.	മുന്തിരി	1	7	0	0
24.	മുന്തിരി	5	29	1	0
25.	മുന്തിരി	2	4	0	0
26.	മുന്തിരിപ്പാട്ട്	1	23	0	0
27.	മുന്തിരിപ്പാട്ട്	6	7	4	0
28.	മുന്തിരിപ്പാട്ട്	6	15	0	0
29.	മുന്തിരിപ്പാട്ട് & നീരുപ്പുകൾ	9	96	0	0
30.	മുന്തിരി	0	2	0	0
31.	മുന്തിരി & നീരുപ്പുകൾ	0	1	0	0
32.	മുന്തിരി	0	1	0	0
33.	മുന്തിരി & നീരുപ്പുകൾ	0	1	0	0
34.	മുന്തിരി	0	1	0	0
35.	മുന്തിരി	0	1	0	0
	മൊത്തം	103	535	66	26

Source: Annual Report 2015-16, Forest Survey of India

நினைவுகள் (Glossary)

എല്ലാം പ്രകാരം (Alluvial Plain): ദ്വീപ് വർഷിയുടെ മുൻപുനാഡിയിൽ നിന്ന് തോറ്റത്തിൽ ശൈലാവാസികളുടെ സ്ഥാപനം നിന്ന് ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട പ്രദേശമാണ് എല്ലാം പ്രകാരം.

അപീളപ്പാലോ (Archipelago): സാമ്പത്തികവാദി രംഗത്തിൽ ചെറുപ്പാണ് ഒരു കൂടുതൽ വിവരം.

உறவுகளை (Arid), ஏ குவையானதை எல்லாகிடீ கொவை ஸப்புவதுமிகு வருடாவிட்டுக்கூடும் ஏ வளிக்குறை பிரச்சனைகளுமிருந்து, காவையோசுகளுமிருந்து ஸுப்பிளிக்கும்.

കായൻ (Backwater): ഒരു അലൂപിക്കുന്ന പ്രധാന നീത്വാലൂപ്പക്കുളിൽനിന്നും വഴിമറിയുന്ന ഏറ്റവും അതിനോടു പേരുന്നില്ലെന്നും അലൂപിക്കുളം മുഖിൽ വലും കുറഞ്ഞ ദൊക്കിൾ സ്ഥലങ്ങൾ നീത്വാലൂപ്പക്കുളംവരുന്നു.

గැමෙන්තුව (Bedrock): නොගිරු සංප්‍රේක්ෂණීය පදනමෙන් වාස්තුවක් කිහිපයේ තුළ මූල්‍ය තුළ තුළ තුළ තුළ තුළ

ജീവഭ്രംശ റിസർവ്വേറ്റ് (Biosphere Reserve): ഒരു സാമ്പത്തികവാദജീവി അവധിയുടെ ആവാസിവ്യവസ്ഥയിൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടുള്ള റിസർവ്വേറ്റ് നാമത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച മുൻസിപ്പാലിറ്റി ദ്രോഗണം ആണ്. (i) ഉന്നതിക്കവലിന്റെതിരാലെ സാമ്പത്തികവാദജീവി മുൻസിപ്പാലിറ്റി പ്രക്രിയ ഒപ്പുചെയ്യാൻ കൂടി പ്രമൂഖമായും വൈവിധ്യമുണ്ട്; (ii) പാരിസ്ഥിതിക സംരക്ഷണത്തിനു പരിനയിക്കി പഠിപ്പാലന്നാൻ കൂടി മുൻസിപ്പാലിറ്റിയും ഗവൺമെന്റും പ്രാഥംഗികപ്പെട്ടു; (iii) വിദ്യാഭ്യാസം, സ്വാധാരണക്കും, പിഡിക്കുന്ന ഏന്തരിക്കേണ്ട സംവിധാനങ്ങളും കൂടി.

ബുംഗിംഗ് (Bunding): വിജ്ഞ പരമ്പരയ്ക്ക് ഇല സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും അല്ലെങ്കിൽ മുളാം തല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് വരുത്തുകയും തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത്.

കാർക്കാറസ് (Calcareus): ഉദരിന്തെ പ്രസാമ്പ് അടഞ്ഞിയിട്ടുള്ളത്

വയർഷിക്കോരാ (Catchment Area): ഒരു പ്രമുഖ നദിയും അതിന്റെ പൊതുപ്രവാചകതയും വൈദിക നദിയും കൂടാനുള്ള പ്രദേശം.

കാലാവസ്ഥ (Climate): ഒരു നിയമിത്ത കാലാവസ്ഥയിൽ (നാല്പത്തിഞ്ചും ഒരു വർഷം) ഉണ്ടാവുന്നതിലെ ഒരു വിശദമായ പ്രക്രിയയാണ് മാറ്റം കിട്ടുന്ന വരീതി.

கோடு (Coast): கடற்கரை கால்வாய் என்றிருப்பது கால்வாயினாலேயும் கடலிலெடுத்து விடுவதை கால்வாய் என்றும் கூறுகிறார்கள்.

തീരസ്ഥലം (Coastal Plain): ഉയർന്ന ഉല്ലംബൻ കുളങ്ങളിൽനിന്ന് തീരത്തിനുമുകളിലെ ഒരു സ്ഥലമാണ് തീരസ്ഥലം.

സംരക്ഷണം (Conservation): പരമ്പരാഗതീയ പാര്ക്കുന്നിവിനെയും അനുസരിച്ചേണ്ട ഒരു സംരക്ഷണ മാനുംകൾ, ദേശപ്രദേശങ്ങളും (Landscape) ഫോറസ്റ്റുകൾ വാന്നേന്നും പ്രജനനവും ആവാന്ത്രികമായ രീതിയിൽ നിർമ്മിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ്.

സാമ്പിൾ (Coral): മുഴ കൂറണ്ട ഉംഗണമുത്താൻ കാണപ്പെടുന്ന പോളിപ് ഫൂഡ് ചെരുവാം.

സ്വപ്നക്രിയ (Depression): കാലാവസ്ഥാ ശാന്തിക്രിയകളാം സ്വാത്യരൂപ വിഭിന്നങ്ങളാം ഒരു പ്രധാനമായി കാണപ്പെടുന്ന താത്ത്വക്യത്തിനു അനുസരിച്ചുള്ള ക്രാഖണ അല്ലെങ്കിൽ അനുബന്ധമായി കാണപ്പെടുന്ന ക്രാഖണാം.

അഴിമുഖം/നദീമുഖം (Estuary) : മുഖജലവും ലവണ്യജലവും തമ്മിൽ കൂട്ടി കലരുന്ന നദിയുടെ വേദിമുഖം.

ജന്തുജാലം (Fauna) : ഒരു നിശ്ചിത സ്ഥലത്തോ നിശ്ചിത സമയത്തോ കാണപ്പെടുന്ന ജന്തുജാലങ്ങൾ.

മടക്ക (Fold) : ഭൂവർഷിക്കൽബന്ധം എന്ന ഭാഗം സമർദ്ദത്തിന് വിധേയമാകുന്നതിന്റെ ഫലമായി ശിലാപാളികൾ വരുത്തുന്നത്.

ഹിമാനി (Glacier) : വിശാലവും ചെകുത്തായതുമായ താഴ്വരകൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് സാവധാനം നീണ്ടിയകല്ലുന്ന ഹിമത്തിന്റെയും ഹിമക്കടകളുടെയും വലിയ സഞ്ചയം.

നയിസ്സ് (Gneiss) : പർവതരൂപികരണവും അഗ്നിപർവത സ്ഥേഠനവും സംബന്ധമായി വലിയ തോതിൽ താപവും മർദ്ദവും ചെലുത്തപ്പെടുന്നോൾ രൂപപ്പെടുന്ന പാളികളായ ഘടനയുള്ള പരുക്കൻ തരികളോടുകൂടിയ കാണ്യാന്തരിതമാണ്.

ഗീരിക്കുന്നം (Gorge) : ചെകുത്തായ ശിലാപാർശ്വങ്ങളോടുകൂടിയ ആഴമേറിയ താഴ്വരകൾ.

ഗള്ളി അപരദം (Gully Erosion) : ഉപരിതല നീരെടുക്കിൾക്കും കേന്ദ്രീകരണം മുലം മണ്ണിനും ശിലകൾക്കും അപരദം സംഭവിച്ച് ചാലുകൾ രൂപപ്പെടുന്നത്.

ജൈവാംശം (Humus) : മൺഡലം ജൈവാംശിഷ്ടം.

അഗ്നി (Island) : ഭൂവണ്യത്തോക്കാൾ ചെറുതും വെള്ളത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതുമായ ഭൂഭാഗം.

ജേറ്റ് പ്രവാഹം (Jet Stream) : ഭൂഭാഗങ്ങളിൽ തൊട്ട് താഴെയായി സ്ഥിരതയോടെ വീഴുന്ന ശക്തമായ പശ്ചിമക്കാറുകൾ.

തടക്കം (Lake) : കരയാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഭൗമോപരിതലത്തിലെ ഗർത്തത്തിൽ ജലം നിറഞ്ഞ് രൂപപ്പെടുന്ന ജലാശയം.

ഉരുൾപ്പെട്ടൽ (Landslide) : ഒരു തെന്തി നീണ്ടാൽ തലത്തിലൂടെ ഭൂഗ്രഹത്തിന്റെ സ്വാധീനം ലഭായി ശിലാവശിഷ്ടങ്ങളും മറ്റും അതിവേഗം താഴ്വാരങ്ങളിൽ നീണ്ടുന്ന തരം പ്രവൃത്തികൾ.

വക്രവലയം (Meander) : നദിയുടെ ഒരുക്കിൽ നീർച്ചൂലിനുണ്ടാകുന്ന പ്രകടമായ വക്രവലയാണ്.

മണ്ണസ്വംഭവം (Monsoon) : ജനുവരേജോളിലേക്കു നയിക്കുന്ന ഒരു വിശാലമായ പ്രദേശത്തെ കാറ്റിന് സംഭവിക്കുന്ന നേർബിപരീത ദിശയിലുള്ള മാറ്റം.

ദേശീയോദ്യാനം (National Park) : വനവൽക്കരണം (Forestry), കാലിമേച്ചിൽ, കൂഷി എന്നിവ അനുബദ്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത വന്യജീവി സംരക്ഷണത്തിന് മാത്രമായി നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രദേശമാണ് ദേശീയോദ്യാനം.

പുരം (Pass) : ഒക്കാൾ അല്ലെങ്കിൽ വിടവിൽന്ന് ദിശ വിർത്തുകരുന്ന പർവതനിരയിലുടെയുള്ള പാത.

ഉപരിപ (Peninsula) : കടലിലേക്ക് തുറിന്നിരക്കുന്ന കരഭാഗം.

സമതലം (Plain) : നേരിയ ഉയർച്ച താഴ്ചയോടുകൂടിയതോ നിരപ്പായതോ ആയ വിന്തുത പ്രദേശം.

പാഠഭൂമി (Plateau) : താരതമേന്ന നിരപ്പായ ഭൂഭാഗത്തിലെ വിന്തുതമായ ഉയർന്ന പ്രദേശം.

പ്ലായ (Playa) : ഉൾനാടൻ നീരെടുക്കുകൾ നിലനിൽക്കുന്ന നിരപ്പാർശ്വ തടത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ.

സംരക്ഷിത വനം (Protected Forest) : മുന്താൻ വന ആക്ക്, സംരക്ഷണമുറപ്പാക്കുന്ന വനപ്രദേശം. നിയന്ത്രണങ്ങളേർപ്പുകൂതാരായ ഏല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും മുതൽ വനങ്ങളിൽ അനുവദനീയമാണ്.

ചെറുജലപാതം (Rapids) : കാറിന്തുമേറിയ ശിലകളുടെ സംബന്ധിയും മുലം നദീതലപ്പം പോട്ടുനേര കൂത്തതനെയാകുന്ന ഭാഗങ്ങളിലെ അതിസ്വീതമായ നീരെടുക്ക്.

റিসർവ് വനം (Reserved Forest) : ഇന്ത്യൻ വന ആക്ക്, സംസാരം വന ആക്ക് എന്നിവ പ്രകാരം പുർണ്ണസംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കുന്ന വനപ്രദേശം. മുൻകൂട്ടി അനുവാദം നൽകിയിട്ടുള്ളവ യല്ലാത്ത ഒരു പ്രവർത്തനവും ഈ വനങ്ങളിൽ നടത്താനാവില്ല.

വന്യജീവി സങ്കേതം (Sanctuary) : വന്യജീവികളുടെ സംരക്ഷണത്തിനു വേണ്ടി മാത്രമായി നീക്കി വച്ചിട്ടുള്ള പ്രദേശം. മരം മുറിക്കൽ, ലാലുവനോൽപ്പന്ന ശേഖരണം തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വന്യജീവികളെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കാതെ വിധത്തിൽ ഇവിടെ അനുവദനിയമാണ്.

മണ്ണിൻ്റെ പരിപ്രേക്ഷാം (Soil Profile) : ഭരമോഹരിതലം മുതൽക്ക് മാതൃഗ്രിലെ വരെയുള്ള മണ്ണിൻ്റെ പാംബതല ചേരു ദൃശ്യം.

ഉപഭൂവന്യം (Subcontinent) : വർക്കരയുടെ ഇതരലഭങ്ങളിൽ നിന്നും വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന വലിയ ഭൂമിശാഖയ്ക്കു യുണിറ്റ്.

ടെറായ (Terai) : ഏകരീവിഗറികളുടെ ചുവട് ഭാഗത്തായി കാണപ്പെടുന്ന സസ്യജാലങ്ങൾ നിറക്കുന്ന പത്രപ്പും മേഖലാ.

ടെക്ടോണിക് (Tectonic) : ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിൽ രൂപം കൊള്ളുന്നതും ഭൂരൂപങ്ങൾക്ക് വ്യാപക മായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നതുമായ ശക്തികൾ/ബലങ്ങൾ.

തരം തിരികപ്പെടാത്ത വനം (Unclassed Forest) : സംരക്ഷിത വനങ്ങളുടെയോ റിസർവ് വനങ്ങളുടെയോ കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തതും വനമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതുമായ പ്രദേശം. ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇവയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും.